

CATÁLOGO DE ESPECIES POR FAMILIAS (mayo 2018)

Acanthaceae

Acalypha wilkesiana Müll. Arg. = *A. tricolor* Seem., Acalifa. Islas del Pacífico.

Acanthus mollis L., Acanto. C, E Región mediterránea.

Aphelandra squarrosa Nees, 'Dania' *Acanthaceae*. Afelandra. Origen hortícola

Barleria obtusa Ness, S África.

Brillantaisia ulugurica Lindau, *Acanthaceae*. Salvia gigante. C,S África.

Crossandra infundiliformis (L.) Ness Orange marmalade', Origen hortícola.

Dicliptera suberecta (André) Bremek. = *Jacobinia suberecta* André, Uruguay.

Eranthemum pulchellum Andrews = *E. nervosum* (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult., India.

Eremomastax speciosa (Hochst.) Culod, África.

Hypoestes phyllostachya Baker, Madagascar.

Justicia adhatoda L. = *Adhatoda vasica* Ness, India, Sri Lanka.

Justicia aurea Schltldl., México a Panamá.

Justicia brandegeana Wassh. & L. B. Sm = *Beloperone guttata* Brandege. México.

Justicia carnea Lindl., Sudamérica.

Megaskepasma erythrochlamys Lindau, Venezuela.

Odontonema tubaeforme (Bertol.) Kuntze = *O. strictum* (Ness) Kuntze. C América.

Pachystachys lutea Ness, Perú.

Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin =
Pseuderanthemum atropurpureum (W.Bull) Radlk., Malasia, India,
Sri Lanka.

Pseuderanthemum laxiflorum (A. Gray) F.T. Hubb. ex L.H. Bailey,
Flor de estrella. C América.

Ruellia rosea (Ness) Hemsl., México.

Ruellia simplex C.Wright, Petunia mejicana. México.

Ruellia tweediana Griseb., México.

Thunbergia coccinea Wall., India.

Thunbergia erecta (Benth) T. Anderson = *Meyenia erecta* Benth,
África Tropical.

Thunbergia grandiflora (Roxb. & Rottler) Roxb., Tumbergia. N
India.

Acoraceae

Acorus gramineus Aiton 'variegatus', Origen hortícola.

Adiantaceae

Adiantum capillus-veneris L. Subcosmopolita.

Adiantum raddianum C. Presl = S América, México.

Adoxaceae

Viburnum odoratissimum Ker Gawl., Viburnum dulce. Asia.

Viburnum tinus L., Durillo. Región mediterránea.

Agavaceae

Beschorneria yuccoides K.Koch., México.

Hesperaloe parviflora (Torr.) J.M. Coult., Texas (EEUU).

Aizoaceae

Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, Diente de dragón. Uña de león. Sudáfrica.

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., S África.

Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus, Sudáfrica.

Delosperma lehmannii (Eckl. & Zeyh.) Schwantes ex H.Jacobsen = *Schonlandia lehmannii* (Eckl. & Zeyh.) L. Bolus, Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Drosanthemum hispidum (L.) Schwantes, Namibia, S África.

Glottiphyllum depressum (Haw.) N.E., Br., Sudáfrica.

Glottiphyllum difforme (L.), N.E.,Br., Sudáfrica.

Lampranthus aurantiacus Schwantes. Uña de gato. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Lampranthus aureus N. E. Br., Uña de gato. S África.

Lampranthus emarginatus N.E. Br., Uña de gato. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Lampranthus spectabilis (Haw.) N. E. Br., Uña de gato. S África.

Lampranthus deltoides (L.) Glen ex Wijnands = *Oscularia deltoides* (L.) Schwantes. S África.

Lithops wernerii Schwantes & H. Jacobs. Namibia.

Mesembryanthemum cordifolium L. f. = *Aptenia cordifolia* (L.f.) Schwantes. Rocío. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Mesembryanthemum crystallinum L., Escarcha. África, Asia occidental, Europa.

Pleiospilos nelii Schwantes. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Smicrostigma viride (Haw.) N. E. Br., S África.

Alliaceae

Allium ampeloprasum L., Euroasia, N África.

Allium neapolitanum Cirillo, Región mediterránea, Portugal.

Allium rouyi Gaut., Sierra bermeja de Estepona (Málaga). España.

Tulbaghia violacea Harv., S África.

Aloaceae

Haworthia angustifolia Haw., S África.

Haworthia batesiana Uitew., S África.

Haworthia chloracantha Haw., S África.

Haworthia coarctata Haw. = *H. resendeana* Poelln., S África.

Haworthia cymbiformis (Haw.) Duval ,S África.

Haworthia fasciata (Willd.) Haw., S África.

Haworthia limifolia Marloth ,. S África.

Haworthia mucronata Haw., S África.

Haworthia pumila (L.) Duval = *H. margaritifera* (L.) Haw., S África.

Haworthia reinwardtii (Salm.-Dyck) Haw., S África.

Haworthia reticulata (Haw.) Haw., S África.

Alstroemeriaceae

Alstroemeria pelegrina L., Azuzena de Quito. Chile.

Altingiaceae

Liquidambar styraciflua L., De Conecticut a C América.

Amaranthaceae

Atriplex halimus L., Salado. Región mediterránea, S África.

Iresine herbstii Hook., S América.

Amaryllidaceae

Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. = *A. umbellatus* L`Hér. = *A. minor* Lodd., S África.

Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. 'Peter Pan', Agapanto, Lirio africano. Origen hortícola.

Clivia miniata (Lindl.) Bosse, Clivia. S África.

Clivia nobilis Lindl. = *Imantophyllum aitonii* Hook. f., Clivia. S África.

Crinum augustum Roxb., Sumatra (Indonesia).

Crinum asiaticum var. *pedunculatum* (R.Br.) Fosberg & Sachet
= *Crinum pedunculatum* R. Br., Australia.

Crinum x powellii Baker, Origen hortícola.

Hippeastrum vittatum (L`Her.) Herb., Argentina, Brasil.

Narcissus sp L., Región mediterránea, Europa.

Pancratium maritimum L., Azucena de mar. Región mediterránea, macaronesica, atlántica.

Anacardiaceae

Mangifera indica L., Mango. De N India a La Unión de Myanmar.

Mangifera indica L. `Irwin´, Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. `Tony Atkins´, Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. `Osteen´, Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. `Keitt´, Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. `Kent´, Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. var. *rosa*, Mango Rosa. Origen hortícola.

Mangifera indica L. var. *maya*, Mango Maya. Origen hortícola.

Mangifera indica L. var. *palmer*, Mango Palmer. Origen hortícola.

Operculicarya decaryi H. Perrier, S y SW Madagascar.

Pistacia atlantica Desf., Almácigo. Islas Canarias, S, E región mediterránea, Pakistán, Afganistán.

Pistacia lentiscus L., Lentisco. Región mediterránea.

Pistacia terebinthus L., Cornicabra. Región mediterránea.

Pistacia vera L., Pistacho. Asia occidental, Asia menor.

Rhus punjabensis J. L. Stewart ex Brandis, E Asia, Himalayas.

Rhus typhina L. f. *dissecta* Rehder, Origen hortícola.

Schinus molle L., Falso pimentero. C de Suramérica.

Schinus terebinthifolia Raddi, Cerezo de Navidad. Brasil.

Spondias mombin L. = *S. lutea* L., Jobo, Jobo amarillo. América tropical.

Annonaceae

Annona cherimola Mill., Chirimoyo. Andes peruanos y Ecuador.

Apiaceae

Astydamia latifolia (L. f.) Baill., Lechuga de mar, servilleta. Islas Canarias (España), NO África.

Bupleurum fruticosum L., Región mediterránea.

Bupleurum gibraltarium Lam., Península Ibérica, N África.

Bupleurum handiense (Bolle) G. Kunkel, Islas Canarias orientales.

Crithmum maritimum L., Región mediterránea, atlántica, macaronésica.

Daucus carota L., Europa, Asia, N África, Macaronesia.

Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García-Martín & Silvestre, S, E Península Ibérica.

Elaeoselinum foetidum (L.) Boiss., SO Península ibérica, NO África.

Eryngium maritimum L., Cardo marino. Región mediterránea, atlántica.

Foeniculum vulgare Mill. = *Foeniculum vulgare* subsp. *piperitum* (C.Presl.) Bég., Hinojo. O, C Europa, Región mediterránea, SO África, Macaronesia.

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. = *O. daucoides* L., Región mediterránea, Cáucaso, Azerbaiyán, N Irán, N Iraq.

Peucedanum officinale L. subsp. *brachyradium* García Martín et Silvestre, Sierra Bermeja (Ronda. Málaga).

Scandix pecten-veneris L., O, C, S Europa.

Torilis arvensis (Huds.) Link., C, S Europa, NO África, Macaronesia, SO Asia.

Apocynaceae

Acokanthera oblongifolia (Hochst.) Benth. & Hook. f. ex B. D. Jacks. = *A. spectabilis* (Sond.) Hook. f., SO África.

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult., De E África a S Arabia.

Asclepias curassavica L., N América.

Beaumontia grandiflora Wall., Trompeta blanca. E del Himalaya.

Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. = *C. grandiflora* (E. Mey.) A. DC., Apocynaceae. Cerezo del Natal. S África.

Cascabela thevetia (L.) Lippold = *T. peruviana* (Pers.) K. Schum., Oleandro amarillo. América Tropical.

Catharanthus roseus (L.) G. Don f., Madagascar.

Ceropegia dichotoma Haw. subsp. *krainzii* (Svent.) P. Bryuns, Cardoncillo. Tenerife, Gomera (Islas Canarias).

Ceropegia dichotoma Haw., Cordoncillo, Mataperros. Islas Canarias.

Ceropegia sandersonii Decne. ex Hook. f., Mozambique, Sudáfrica.

Ceropegia stapeliiformis Haw., S África.

Ceropegia woodii Schltr., Sudáfrica, Swazilandia, Zimbabwe.

Cynanchum marnierianum Rauh., Madagascar.

Dischidia vidalii Becc. = *D. pectenoides* H. Person, Islas Filipinas.

Duvalia pubescens N.E. Br., S África.

Fockea edulis (Thunb.) K. Schum., Namibia, Sudáfrica.

Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T. Aiton, Sudáfrica.

Gomphocarpus physocarpus E. Mey., SE África.

Hoya bella Hook., SE Asia, Australia.

Hoya carnosa (L. f.) R. Br., De S China a Australia.

- Hoya compacta* C.M. Burton 'Variegata', SE Asia, Australia.
- Hoya compacta* C.M. Burton, SE Asia, Australia.
- Hoya kerrii* Craib, Sian, Thailandia, Laos.
- Hoya lanceolata* Wall. ex D. Don subsp. *bella* (Hook.) D. H. Kent =
H. bella Hook, Burma.
- Hoya linearis* Wall. ex D. Don, Región del Himalaya.
- Hoya retusa* Warb., S India.
- Huernia lenewtonii* Plowes, Kenia.
- Huernia pendula* E.A. Bruce, Prov. Del cabo (Sudáfrica).
- Mandevilla laxa* (Ruiz & Pav.) Woodson, Jazmín chileno. Chile.
- Nerium oleander* L. 'Nana', Adelfa enana. Origen hortícola.
- Nerium oleander* L., Adelfa. De región mediterránea a Japón.
- Orbea variegata* (L.) Haw. = *Stapelia variegata* L., Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Pachypodium bispinosum* (L.f.) A. DC., Sudáfrica.
- Pachypodium geayi* Castantin & Bois, SE Madagascar.
- Pachypodium lamerei* Drake, S Madagascar.
- Periploca laevigata* Aiton, Región mediterránea.
- Plumeria obtusa* L., La Española, Cuba, Península del Yucatán (México).
- Plumeria rubra* L., Plumeria o Frangipani. De México a Panamá.
- Stapelia gigantea* N.E.Br., S África.
- Tabernaemontana divaricata* (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. = *T. coronaria* (Jacq.) Willd., India.
- Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. = *Rhynchospermum jasminoides* Lindl., Jazmín estrella. China.

Trachelospermum jasminoide (Lindl.) Lem. Mandianum'. Origen hortícola.

Vinca difformis Pourr., Vincapervinca. O Región mediterránea.

Vinca major L., Región mediterránea, Europa, Asia menor.

Vinca minor L., Vincapervinca. Europa.

Aquifoliaceae

Ilex canariensis Poir., Macaronesia.

Araceae

Alocasia lauterbachiana (Engl.) A. Hay, Indonesia. Nueva Guinea.

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don, Indomalasia.

Alocasia odora (Lodd.) Spach, Oreja de elefante. Asia Tropical.

Alocasia wentii Engl. & K. Krause, Brasil.

Alocasia zebrina Schott ex Van Houtte, Oreja de elefante cebrá. Asia.

Amorphophallus bulbifer (Roxb.) Blume, India.

Anthurium andraeanum Linden ex André, SO Colombia, NO Ecuador.

Anthurium coriaceum G. Don, Brasil.

Anthurium crassinervium (Jacq.) Schott, Colombia, Venezuela, Antillas.

Arisarum simorrhinum Durieu, Europa.

Colocasia esculenta (L.) Schott, Taro. SE Asia.

Colocasia gigantean (Blume) Hook. f., Oreja de elefante gigante.
Asia tropical y subtropical.

Epipremnum aureum (Linden & André) G.S. Bunting = *Pothos aureus* Linden et André, Islas Salomón.

Monstera deliciosa Liebm., Costilla de Adán. De México a Panamá.

Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. = *P. selloum* K. Koch,
Araceae. S Brasil.

Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott = *P. scandens* K.Koch &
Sello, Filodendro. C América, Caribe.

Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott, India, Sri Lanka, La
Unión de Myanmar.

Scindapsus pictus Hassk. 'Argyraeus', Origen hortícola.

Spathiphyllum wallisii Regel, Colombia.

Syngonium podophyllum Schott = *S. gracile* (Miq.) Schott,
Singonio. México, Brasil, Bolivia.

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng = *Calla aethiopica* L. =
Richardia africana Kunth, Cala, Lirio de agua. Provincia del Cabo,
Natal, Transvaal, Lesotho (Sudáfrica).

Zantedeschia aetiopica (L.) Spreng 'Callaifornia', Cala. Origen
hortícola.

Araliaceae

Hedera canariensis Willd. 'Gloire de marengo', Origen hortícola.

Hedera helix L., Europa, O Asia, N África.

Hedera helix L. 'Glacier', Origen hortícola.

Schefflera actinophylla (Endl.) Harms = *Brassaia actinophylla*
Endl., Árbol de los paraguas. Australia, S Nueva Guinea.

Schefflera arboricola (Hayata) Merr. = *Heptapleurum arboricolum*
Hayata, Cheflera. Isla de Formosa (Taiwan).

Schefflera arboricola (Hayata) Merr. 'Gold Capella', Origen hortícola.

Schefflera elegantissima (Veitch ex Mast.) Lowry & Frodin =
Dizygotheca elegantissima (Veitch ex Mast.) R. Vig. & Guillaumin =
Aralia elegantissima Veitch ex Mast., Falsa aralia, Planta araña.
Nueva Caledonia, Polinesia.

Araucariaceae

Agathis microstachya J.F. Bailey & C.T. White, N Queensland (Australia).

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, S Brasil, Argentina.

Araucaria araucana (Molina) K. Koch = *A. imbricata* Pav., Pino de Chile. Chile.

Araucaria bidwillii Hook, Araucaria. SE Queensland (Australia).

Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. = *A. excelsa* (Lamb.) R. Br., Pino de Nueva Caledonia. Nueva Caledonia.

Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco, Pino de pisos, Pino de Norfolk. Isla de Norfolk (Australia).

Wollemia nobilis W.G.Jones, K.D.Hill & J.M.Allen, Nueva Gales del Sur (Australia).

Areceaceae

Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H. A. Wendl.) H. A. Wendl. ex Becc. = *Paurotis wrightii* (Griseb. et H. A. Wendl.) Brittonx ex Brittonx, Tasiste, Guano prieto. México, Belice, Bahamas y Cuba.

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart., Totaí, Macaúba. De México a Argentina.

Aiphanes minima (Gaert.) Burret = *A. erosa* (Linden) Burret., República Dominicana.

Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & Drude =
Ptychosperma alexandrae F. Muell., N Queensland (Australia).

Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & Drude
`Beatrice', Palmera escalonada. Queensland (Australia).

Archontophoenix cunninghamiana (H. Wendl.) H. Wendl. & Drude
= *Ptychosperma cunninghamiana* H. Wendl., Palmera de
Cunningham, Palmera rey Piccabeen. Nueva Gales del Sur,
Queensland (Australia).

Areca catechu L., Palmera de la nuez de Betel, Palma catechu.
Malasia, Filipinas.

Arenga engleri Becc., Palmera de Formosa. Isla de Formosa e Islas
Ryu-Kyu.

Bismarckia nobilis Hildebr. & Y. H. Wendl., Palmera de Bismarck.
Madagascar.

Brahea armata S. Watson = *B. roezlii* Linden = *Erythea armata* (S.
Watson) S. Watson, Baja California y Sonora (NO México).

Brahea brandegeei (Purpus) H. E. Moore = *Erythea brandegeei*
Purpus, NO México.

Brahea edulis (H. Wendl. & S. Watson) S. Watson = *Erythea edulis*
(H. A. Wendl. ex S. Watson) S. Watson, Palmera de Guadalupe. Isla
De Guadalupe (México).

Butia capitata (Mart.) Becc., Brasil, Uruguay.

Butia capitata (Mart) Becc. var. *strictor* L. H. Bailey, Butia. Brasil.

Butia yatay (Mart) Becc. = *Cocos yatay* Mart., Yatay, Palma yatay.
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Caryota mitis Lour. = *C. furfuracea* Blume ex Mart. = *C. griffithii*
Becc., Palmera cola de pescado con varios troncos. SE Asia.

Caryota obtusa Griff. = *C. gigas* Hahn ex Hodel, Caryota gigante de
Tailandia. Tailandia.

Caryota urens L., India, Isla de Sri Lanka, Unión de Myanmar, Península de Malaca.

Caryota urens L. `Himalaya´, Origen hortícola.

Chamaedorea castaricana Oerst., Pacaya De México a Panamá.

Chamaedorea cataractarum Mart. = *C. atrovirens* H. Wendl., México.

Chamaedorea elegans Mart., México, Guatemala, Belice.

Chamaedorea ernesti-augusti H. Wendl., México.

Chamaedorea metallica O. F. Cook. ex H. E. Moore, México.

Chamaedorea seifrizii Burret = *C. erumpens* H. E. Moore, México, Guatemala, Belice, Honduras.

Chamaedorea tepejilote Liebm., México

Chamaerops humilis L., Región mediterránea occidental.

Chamaerops humilis L. var. *argentea* André = *C. humilis* var. *cerifera* Becc., Marruecos, Sahara.

Chambeyronia macrocarpa (Brongn.) Vieill. ex Becc. = *Kentiopsis macrocarpa* Brongn., Nueva Caledonia (E Australia).

Coccothrinax crinita (Griseb. & H. Wendl. ex C.H. Wright) Becc., Palmera petate. Cuba.

Copernicia alba Morong, Caradá, Caranday. Brasil, Bolivia, N Argentina, Paraguay.

Copernicia macroglosa H. A. Wendl. ex Becc. = *C. torreana* Leon., Jata de Guanabacoa. Cuba.

Dictyosperma album (Bory) Scheff. = *Linoma alba* (Bory) O. F. Cook, Islas Mascareñas.

Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J. Dransf. = *Neodypsis decaryi* Jum., Palmera triángulo. Madagascar.

Dypsis decipiens (Becc.) Beentje & J. Dransf. = *Chrysalidocarpus decipiens* Becc., C Madagascar.

Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. =
Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl. = *Areca lutescens* Bory,
Madagascar.

Dypsis madagascariensis (Becc.) Beentje & J. Dransf. =
Chrysalidocarpus lucubensis Becc., Madagascar.

Gaussia maya (O. F. Cook) H. J. Quero & Read = *Opsiandra maya*
O. F. Cook, México, Belice, Guatemala.

Howea belmoreana (C. Moore & F. Muell.) Becc. = *Kentia*
belmoreana C. Moore & F. Muell., *Kentia*, *Kencia*. Isla de Lord
Howe (Australia).

Howea forsteriana (F. Muell.) Becc. = *Kentia forsterana* F. Muell.,
Isla de Lord Howe (Australia).

Hyophorbe lagenicaulis (L. H. Bailey) H. E. Moore = *Mascarena*
lagenicaulis L. H. Bailey, Palmera botella. Islas Mascareñas.

Hyophorbe verschaffeltii H. Wendl. = *Mascarena verschaffeltii*
(H. Wendl.) L. H. Bailey, Palmera fusiforme. Islas Mascareñas.

Hyphaene coriacea Gaertn., S África.

Jubaea chilensis (Molina) Baill. = *J. spectabilis* Kunth, Palmera de
Chile, palma de miel. C Chile.

Latania lontaroides (Gaertn.) H. E. Moore, Islas Reunión (Islas
Mascareñas).

Livistona australis (R. Br.) Mart., Livistona de Australia. E
Australia.

Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart., Livistona de China,
Palmera china de abanico. E China, Islas Ryu Kyu (Japón), Islas
Bonin.

Livistona decora (W. Bull) Dowe = *L. decipiens* Becc., Queensland
(Australia).

Livistona fulva Rodd, Queensland (Australia)

Livistona muelleri F. M. Bailey, Palmera abanico enana. NE Queensland (Australia).

Livistona nitida Rodd, C Queensland (Australia).

Livistona rigida Becc. = *L. mariae* F. V. Muell. subsp. *rigida*, Queensland (Australia).

Livistona saribus (Lour) Merr. ex A. Chev. = *L. hoogendorpii* Teijsm. et Binn. ex Miq., SE Asia.

Nannorrhops ritchieana (Griff.) Aitch. = *Chamaerops ritchieana* Griff., Palmera mazari, Palmito de Pakistán. Pakistán, Afganistán, Irán, Península de Arabia.

Parajubaea torallyi (Mart.) Burret, Bolivia.

Phoenix canariensis H. Wildpret, Palmera de Canarias. Islas Canarias (España).

Phoenix dactylifera L., Palmera datilera. N África, O Asia.

Phoenix reclinata Jacq., Palmera datilera del Senegal. África tropical y subtropical.

Phoenix roebelenii O' Brien, Palmera pigmea, Palmera datilera enana. Laos, Vietnam y SO China.

Phoenix rupicola T. Anderson, Datilera de las rocas. Himalaya (India), Butan.

Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Datilera silvestre. India y Pakistán.

Phoenix theophrasti Greuter, Palmera de Creta. Creta y Turquía.

Pritchardia hillebrandii Becc., Islas Hawai (EE UU).

Pseudophoenix sargentii H. A. Wendl. ex Sargent., Palmera bucanera. México, Belice, Florida, Bahamas, Cuba, La Española, Dominica.

Ptychosperma elegans (R. Br.) Blume = *Seaforthia elegans* R. Br., Palmera solitaria. E Queensland (Australia).

Ravenea glauca Jum. & Perrier, C y S Madagascar.

Ravenea rivularis Jum. et H.Perrier, Palmera majestuosa
Madagascar.

Ravenea xerophilla Jum., S Madagascar.

Rhapidophyllum hystrix (Fraser ex Thouin) H.Wendl. & Drude =
Chamaerops hystrix (Fraser ex Thouin) Pursh, Palmera con agujas.
SE EE UU.

Rhapis excelsa (Thunb.) Henry, Palmerita China. China.

Rhapis humilis Blume, China.

Rhapis multifida Burret, Palmera dedo. S China.

Roystonea borinquena O. F. Cook, Palma real. Puerto Rico,
República Dominicana, Haití, Islas Virginia.

Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook = *R. ventricosa* C. H. Wright =
R. jenmanii (C.H. Wright) Burret, Palmera real cubana. Cuba.

Sabal bermudeana L.H. Bailey, Bermuda palmeto. Islas Bermudas
(Reino Unido).

Sabal causiarum (O. F. Cook) Becc. = *S. haitensis* Becc. ex
Martelli, Palma de sombrero. S Isla La Española, Puerto Rico.

Sabal domingensis Becc., Palma cana. Isla la Hispañiola (Haiti y
Republica dominicana).

Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & H. Wendl. = *S. allenii* L.
H. Bailey, C México, Belice, N Guatemala, Honduras, Costa Rica,
Panamá, Colombia, Venezuela y Trinidad.

Sabal mexicana Mart. = *S. texana* (O.F.Cook) Becc., Palma de
sombrero, Palma llanera. México, S Tejas (EE UU).

Sabal minor (Jacq.) Pers., Palmito enano, Palmito de los pantanos.
SE EE UU.

Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult f., Palmito de
Florida. SE EE UU, Cuba.

Saribus rotundifolius (Lam.) Blume = *L. rotundifolia* (Lam.) Mart.,
Islas Filipinas, Islas Célebes, Islas Molucas.

Serenoa repens (W. Bartram) Small = *S. serrulata* (Michx.) Hook.f.
ex B.D.Jacks., Palmito aserrado. SE EE UU.

Syagrus amara (Jacq.) Mart., Pequeñas Antillas.

Syagrus coronata (Mart.) Becc., Licuri. Brasil.

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman = *Arecastrum*
romanzoffianum (Cham.) Becc., Palmera reina. De Brasil a
Argentina.

Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman = *Arikuryroba schizophylla*
(Mart.) L. H. Bailey, Aricuriroba. Brasil.

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. = *Chamaerops fortunei*
Hook., Palmito elevado, Palmito elevado chino, Palmera china de
abanico. N La Unión de Myanmar, C, E China.

Trachycarpus martianus (Wall. ex Mart.) H. Wendl. = *T. khasyanus*
(Griff.) H.Wendl., Palmito elevado de Martius. E Himalaya, N La
Unión de Myanmar.

Trachycarpus wagnerianus Becc., O Himalaya.

Trithrinax acanthocoma Drude, Carandaí. S Brasil y Paraguay.

Trithrinax campestris (Burmeist) Drude & Griseb., Saro, Caranday.
Argentina, O Uruguay.

Veitchia arecina Becc., Nueva Caledonia.

Veitchia merrillii (Becc.) H. E. Moore = *Adonidia merillii* (Becc.)
Becc., Palmera de Navidad. Islas Palawan (Filipinas).

Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary,
Palmera de abanico californiana, Palmera con enaguas. California,
Arizona (SO EE UU), Baja California (México).

Washingtonia robusta H. Wendl., Palmera de abanico mejicana.
Baja California y Sonora (NO México).

Wodyetia bifurcata A. K. Irvine, Palmera de cola de zorro. NE Queensland (Australia)

Aristolochiaceae

Aristolochia baetica L., *Aristolochia*. S Península Ibérica, N África.

Aristolochia gigantea Mart., Brasil.

Asparagaceae

Asparagus albus L., O, C Región mediterránea.

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop `Sprengeri`, Esparraguera basta. Origen hortícola.

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop `Myersii`, Esparraguera. Origen hortícola.

Asparagus falcatus L., De S, E África a India.

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop = *A. plumosus* Baker, Esparraguera fina. S África.

Agave americana L., México.

Agave americana L. 'Stricta', Origen hortícola.

Agave americana L. var. *mediopicta* Trel. 'Alba', México.

Agave americana L. var. *mediopicta* Trel., México.

Agave americana L. var. *marginata* Trel., México.

Agave attenuata Salm-Dyck, C México.

Agave bracteosa S. Watson ex Engelm., NE México.

Agave decipiens Baker, Falso sisal. Florida (EEUU).

Agave desmettiana Jacobi, Sinaloa (México).

Agave desmettiana Jacobi 'Marginata', Origen hortícola.

Agave filifera Salm-Dyck, México.

Agave fourcroydes Lem., Yucataán (México).

Agave geminiflora (Tagl.) Ker-Gawl., México.

Agave ghiesbreghtii Lem. ex Jacobi = *A. purpusorum* A. Berger, SE México, Guatemala.

Agave guadalajarana Trel., Jalisco (México).

Agave guiengola Gentry, Oaxaca (México).

Agave horrida Lem. ex Jacobi subsp. *perotensis* Ulrrich, Perote, Veracruz, Zacatepec (México).

Agave karwinskii Zucc., C México.

Agave macroacantha Zucc., México.

Agave mitis Mart. var. *albidior* (Salm-Dyck) B.Ullrich, Hidalgo (México).

Agave montana Villareal, Nuevo León (México).

Agave nigra

Agave nizandensis Cutak, México.

Agave ovatifolia G.D. Starr & Villareal, Nuevo León (México).

Agave parrasana A. Berger, N, C, México.

Agave potatorum Zucc. = *A. potatorum* var. *verschaffeltii* 'Minor' (Lem. ex Jacobi) A.Berger Zucc., Mexico.

Agave pumila De Smet ex baker, México.

Agave pygmaea Gentry, Chiapas (México).

Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck var. *ferox* (K.Koch) Gentry, México.

Agave stricta Salm-Dyck, México.

Agave univittata Haw., E México.

Agave utahensis Engelm var. *eborispina* (Hester) Breitung,
California (EEUU).

Agave victoria-reginae T. Moore, México.

Agave vivipara L. = *A. angustifolia* Haw., Costa Rica, México.

Agave weberi J.F.Cels ex J.Poiss., México.

Beaucarnea recurvata Lem. = *Nolina recurvata* (Lem.) Hesml.,
México.

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques = *C. sternbergianum*
Steud. = *Anthericum comosum* Thunb., Cintas. S África.

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques var. *variegatum*, Origen
hortícola.

Chlorophytum filipendulum subsp. *amaniense* (Engl.) & A.D.
Poulsen = *C. amaniense* Engl., E África.

Cordyline australis (G. Forst.) Endl., Nueva Zelanda.

Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. = *C. terminalis* (L.) Kunth, E asia
Tropical a Polinesia.

Cordyline indivisa (G. Forst.) Endl. = *Dracaena indivisa* G. Forst.,
Nueva Zelanda.

Dasyilirion longissimum Lem, Junquillo, varacuate. México.

Dracaena cinnabari Balf.f., Arch. Socotra en Yemen.

Dracaena draco (L.) L., Drago de Canarias. Tenerife (Islas
Canarias), Madeira.

Dracaena marginata Hort., Madagascar.

Dracaena reflexa Lam. = *Pleomele reflexa* (Lam.) N. E. Br.,
Madagascar, Islas Mauricio (Islas Mascareñas).

Dracaena tamaranae Marrero Rodr., R.S. Almeida & Gonzales.-
Martin, Islas Canarias (España).

Furcraea foetida (L.) Haw., Caribe, C América.

Furcraea selloa K. Koch, Falso ágave. México, Guatemala, Colombia.

Furcraea selloa K. Koch, var. *marginata*, Falso ágave. Origen hortícola.

Hesperaloe parviflora (Torr.) J.M. Coult., Texas (EEUU).

Hesperoyucca whipplei (Torr.) Trel. = *Yucca whipplei* Torr., S California, baja California.

Ledebouria socialis (Baker) Jessop = *Scilla socialis* Baker = *Scilla violacea* Hutch., S África.

Liriope muscari (Decne.) L. H. Bailey = *L. graminifolia* (L.) Baker var. *densiflora* Maxin. ex Baker = *Ophiopogon muscari* Decne., China.

Liriope muscari (Decne.) L. H. Bailey var. *variegata* (Bailey) H. Hara, China, Japón.

Ophiopogon jaburan (Siebold) Lodd. `Vitatus`, Origen hortícola.

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl., Hierba de las turquesas. China, Corea, Japón.

Ophiopogon planiscapus Nakai, Japón.

Ophiopogon planiscapus Nakai `Niger`, Origen hortícola.

Ornithogalum narbonense L., S Europa.

Ruscus aculeatus L., Rusco, Brusco. Región mediterránea, O Europa.

Ruscus hypoglossum L., Aureolas. De Italia y República Checa a Turquía.

Sansevieria cylindrica Bojer ex Hook., Angola.

Sansevieria raffillii N.E.Br., África tropical.

Sansevieria trifasciata Prain var. *laurentii* (de Willd.) N.E.Br., África.

Scilla peruviana L., Jacinto del Perú. Región mediterránea.

Veltheimia capensis (L.) DC., E Sudáfrica.

Yucca aloifolia L. 'Variegata', Origen hortícola.

Yucca aloifolia L., Yuca, Yuca pinchona, Bayoneta española.
México.

Yucca baccata Torr., Banana yuca. So EE UU.

Yucca brevifolia Engelm., Árbol de Joshua. De California a Utah
(EEUU).

Yucca carnerosana (Trel.) Mckelvey, Daga española. NO México,
O Texas.

Yucca faxoniana Sarg., Bayoneta española. O Texas, N México.

Yucca filifera Chabaud, Palma chica, Izote. Centroamérica, México.

Yucca gigantea Lem. = *Y. guatemalensis* Bak., Yuca fina, Pata de
elefante. México, Guatemala.

Yucca gloriosa L var. *variegata* Belg. Hort, EE UU.

Yucca gloriosa L, Daga española. SE EEUU.

Yucca querataroensis Pina, México.

Yucca rigida (Engelm.) Trel., Yuca azul. México.

Yucca rostrata (Engelm.) Trel. = *Y. linearis* (Trel.) D.J. Ferguson,
Tejas, N México.

Yucca thompsoniana Trel., SO Texas.

Yucca treculeana Carrière, Daga española, Palma pita. S,C Texas, O
México.

Asphodelaceae

Asphodelus fistulosus L., Región mediterránea.

Asphodelus ramosus L., Región mediterránea.

Kniphofia uvaria (L.) Oken, África.

Aspleniaceae

Asplenium antiquum Maquino 'Chrissie', Origen hortícola.

Asplenium bulbiferum G. Forst., Nueva Zelanda, Australia, India.

Asplenium nidus L. 'Leslie', Origen hortícola.

Asplenium nidus L. 'Osaka', Origen hortícola

Asplenium nidus L., Helecho nido de ave. India, Australia, Japón.

Asplenium scolopendrium L., Europa, Asia, N América.

Balsaminaceae

Impatiens balsamina L., Bálsamo de jardín. India, SE Asia.

Impatiens hawkeri W. Bull, Impatiens de Nueva Guinea. Nueva Guinea.

Impatiens walleriana Hook. f., De Tanzania a Mozambique.

Impatiens x hybrida hort. 'Sunpatiens', Origen hortícola.

Begoniaceae

Begonia bowerae Ziesenh., Begonia. México.

Begonia cucullata Willd. = *B. semperflorens* Link & Otto, Begonia de flor. Brasil, Paraguay, N Argentina.

Begonia rex Putz. 'hybrida', Origen hortícola.

Begonia x hybrida auct. 'Dragon wing', Origen hortícola.

Begonia x ricinifolia Dietr., *Begoniaceae*. Origen hortícola.

Berberidaceae

Berberis aquifolium Pursh = *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt.,
Uvas de Oregón. EE UU.

Berberis thunbergii DC. `Atropurpurea`, Agracejo púrpura. Origen
hortícola.

Nandina domestica Thunb., Japón, C China.

Bignoniaceae

Amphilophium buccinatorium (DC.) L.G.Lohmann = *Distictis
buccinatoria* (DC.) A.H.Gentry, México.

Bignonia capreolata L. = *Doxantha capreolata* (L.) Miers,
Bignonia. S Ontario (Canadá), E EE UU.

Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum., Trompeta china. China.

Campsis radicans (L.) Seem = *Bignonia radicans* L. = *Tecoma
radicans* (L.) Juss., Bignonia roja, Trompeta trepadora. C América,
SE Iowa, Tejas (EE UU).

Catalpa bignonioides Walter, Catalpa. SE EE UU.

Clytostoma callistegioides (Cham.) Baill., Dama del monte.
Argentina, S Brasil.

Delostoma integrifolia D.Don = *D. speciosum* (H. Karst. et Triana)
K. Schum. ex B.D. Jacks., Perú.

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann = *Macfadyena unguis-
cati* (L.) A. H. Gentry, De México a Argentina.

Jacaranda mimosifolia D. Don = *J. ovalifolia* R. Br., Jacaranda,
Palo santo. NO Argentina.

Kigelia africana (Lam.) Benth. = *K. pinnata* (Jacq.) DC., Árbol de
las salchichas. África.

Mansoa alliacea (Lam.) A.H.Gentry, Flor de Ajo. Amazonia.

Markhamia lutea (Benth.) k. Schum., Tulipero amarillo. África.

Pandorea jasminoides (Lindl.) K. Schum. = *Tecoma jasminoides* Lindl., Bignonia blanca. Australia.

Pandorea pandorana (Andrews) Steenis = *Bignonia australis* (R. Br.) Aiton = *Bignonia pandorana* Andrews, Arbusto de Pandora. Malaysia, Australia.

Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague, Bignonia rosa. S África.

Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers = *P. ignea* (Vell.) C. Presl, Brasil, Paraguay.

Spathodea campanulata P. Beauv., Tulipero del Gabón. C África.

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC., Apamate, Roble negro. De México a Venezuela, Ecuador.

Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. = *Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach, S África.

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, De Florida a México.

Blechnaceae

Blechnum gibbum Mett., Nueva Caledonia.

Boraginaceae

Anchusa azurea Mill., Región mediterránea.

Cynoglossum creticum Mill., S Europa.

Echium aculeatum Poir., Tenerife; Gomera, Hierro (Islas Canarias).

Echium callithyrsum Webb & Bolle, Taginaste azul. Gran Canaria (Islas Canarias).

Echium candicans L. f. = *E. fastuosum* Jacq., Plumero azul. Madeira (Portugal).

Echium decaisnei Webb & Berthel., Taginaste blanco. Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura (Islas Canarias).

Echium nervosum Dryand, Madeira (Portugal).

Echium plantagineum L., S, O Europa.

Echium strictum L.f., Tagisnaste chino. Islas Canarias.

Glandora nitida (Ern) D.C. Thomas = *Lithodora nitida* (Ern) R. Fern., S de la Península Ibérica. Sierra Mágina, Trevenque-Almijara (alcanza las sierras de Horconera y Rute, Córdoba).

Heliotropium arborescens L. = *H. peruvianum* L., Heliotropo, Vainilla de jardín. Perú.

Heliotropium europaeum L., S, C Europa, O Asia, N África.

Brassicaceae

Alyssum serpyllifolium Desf. subsp. *malacitanum* Rivas Goday, S^a Bermeja, Serranía de Ronda (Málaga).

Coronopus didymus (L.) Sm., Europa.

Erysimum myriophyllum Lange, Sierras de Tejeda y Almijara (Málaga), sierras de la mitad occidental de Granada y Serranía de Cazorla (Jaén).

Matthiola incana (L.) R. Br., S W Europa.

Matthiola maderensis Lowe, Madeira (Portugal).

Sinapis alba L. = *Brassica hirta* Moench, Europa, N África, O Asia.

Sisymbrium officinale (L.) Scop., Europa, N África, oriente próximo.

Biscutella auriculata L., Península Ibérica, Marruecos, Argelia.

Biscutella baetica Boiss & Reut., SO España, NO África

Capsella bursa-pastori (L.) Medik., Europa.

Crambe filiformis Jacq., S España, N África.

Diplotaxis eruroides (L.) DC., Región mediterránea, C Europa, W Asia.

Diplotaxis virgata (Cav.) DC., Península Ibérica.

Iberis sempervirens L., Región mediterránea.

Lobularia maritima (L.) Desv. = *Alyssum maritimum* (L.) Lam., S Europa.

Bromeliaceae

Acanthostachys strobilacea (Link) Klotzsch & Otto, Brasil, N Argentina.

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker, America tropical.

Aechmea caudata Lindm. = *A. caudata* f. *albiflora* W. Weber & Roeth, Brasil.

Aechmea coelestis (K.Koch) E.Morren = *A. coelestis* var. *coelestis*, Brasil.

Aechmea distichantha Lem. var. *schlumbergeri* E. Morren ex Mez, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay.

Aechmea distichantha Lem., N Argentina, Paraguay, Uruguay.

Aechmea fasciata (Lind.) Baker Morgana', Origen hortícola

Aechmea fasciata (Lindl.) Baker 'Morgana', Origen hortícola.

Aechmea fasciata (Lindl.) Baker = *Billbergia fasciata* Lindl. = *B. rhodocyanea* Lem., Brasil.

Aechmea mcvanghii L. B. Sm. = *Ursalaea mcvanghii* (L.B. Sm.) Read & Baensch, México.

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. = *A. nudicaulis* var. *nudicaulis*, México.

- Aechmea* Ruiz & Pav. 'Blue rain', Origen hortícola.
- Aechmea weberbaueri* Harms, América tropical.
- Aechmea werdermannii* Harms, Brasil.
- Ananas comosus* (L.) Merr., Piña. América del Sur.
- Billbergia brasiliensis* L.B. Sm., Bolivia, Brasil.
- Billbergia nutans* H.Wendl. ex Regel, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina.
- Billbergia* sp. Thunb.
- Billbergia zebrina* (Herb.) Lindl., Brasil.
- Catopsis paniculata* E. Morren, Costa Rica, México.
- Cryptanthus bivittatus* (Hook.) Regel., Brasil.
- Cryptanthus odoratissimus* Leme, Espirito santo (Brasil).
- Cryptanthus praetextus* E.Morren ex Baker, Brasil.
- Dyckia brevifolia* Baker, Brasil.
- Fosterella penduliflora* (C.H. Wright) L.B. Sm., Argentina, Bolivia, Perú.
- Fosterella rusbyi* (Mez) L.B. Sm., Bolivia.
- Fosterella schidosperma* (Baker) L.B. Sm., Bolivia.
- Guzmania dissitiflora* (André) L. B. Sm., América tropical.
- Guzmania donnellsmithii* Mez ex Donn.Sm., Costa Rica, Panamá; Nicaragua, Ecuador.
- Guzmania lingulata* (L.) Mez var. *concolor* Proctor & Cedeño-Mald. = *G. minor* Mez, C América.
- Guzmania lingulata* (L.) Mez, C América, Perú, Brasil.
- Guzmania monostachia* (L.) Rusby ex Mez, México, S América.
- Guzmania* Ruíz & Pav. 'Pasion', Origen hortícola.

Guzmania Ruíz & Pav. 'Torch', Origen hortícola.

Guzmania sp. Ruíz & Pav.

Neoregelia carolinae (Beer) L. B. Sm. 'Flandria' = *Bromelia carolinae* Beer = *Nidularum carolinae* Baker, Origen hortícola.

Neoregelia carolinae (Beer) L. B. Sm. 'Meyendorffii', Origen hortícola.

Neoregelia carolinae (Beer) L. B. Sm. 'Tricolor' (Foster) L. B. Sm., Origen hortícola.

Neoregelia carolinae (Beer) L. B. Sm., Brasil.

Neoregelia L.B. Sm. 'Fireball', Origen hortícola.

Orthophytum foliosum L.B. Sm., Brasil.

Orthophytum sanctum L.B. Sm., Brasil.

Pitcairnia altensteinii (Link, Klotzsch & Otto) Lem., Venezuela.

Pitcairnia heterophylla (Lindl.) Beer, Costa Rica, México, Venezuela, Ecuador.

Puya alpestris (Poepp.) Gay, Chile.

Puya coerulea Lindl. var. *violacea* (Brongn.) L.B. Sm. & Looser, Chile.

Puya mirabilis (Mez) L.B. Sm., Bolivia, NE Argentina.

Puya venusta (Baker) Phil, Chile.

Tillandsia aeranthos (Loisel.) L. B. Sm., Brasil. Argentina.

Tillandsia albertiana Verv., Argentina.

Tillandsia andreana E. Morren ex André, Colombia.

Tillandsia argentea Griseb., Cuba.

Tillandsia baileyi Rose ex Small, S. Texas (EEUU), Tamaulipas (México).

Tillandsia balbisiana Schult. & Schult. f., Florida (EEUU).

Tillandsia bergeri Mez, Argentina.

Tillandsia brachycaulos Schldtl. var. *abdida*, México, Venezuela, Panamá.

Tillandsia bulbosa Hook., México. Colombia. Brasil.

Tillandsia butzii Mez, Costa Rica, México.

Tillandsia caliginosa W. Till = *T. crocata* var. *tristis* Rauh, Bolivia, Argentina.

Tillandsia capitata Griseb 'Peach', República Dominicana, Cuba, México.

Tillandsia caput medusae E. Morren, C. América.

Tillandsia crispa (Baker) Mez = *Racinaea crispa* (Baker) M.A. Spencer & L.B. Sm., Colombia.

Tillandsia cyanea Linden ex K. Koch., Ecuador.

Tillandsia disticha Kunth, Colombia, Ecuador, Perú.

Tillandsia dyeriana André, Ecuador.

Tillandsia fasciculata Sw., México, Brasil.

Tillandsia filifolia Schldtl. & Cham., México, Costa Rica.

Tillandsia fuchsii W. Till var. *argentea*, México.

Tillandsia fuchsii W. Till, Oaxaca (México).

Tillandsia gardneri Lindl., Brasil, Venezuela.

Tillandsia harrisii Ehlers, Guatemala.

Tillandsia juncea (Ruiz & Pav.) Poir 'Juncifolia' Regel, Origen hortícola.

Tillandsia juncea (Ruiz & Pav.) Poir, Bolivia, Brasil, Costa Rica, México, Venezuela.

Tillandsia kolbii W. Hill & Schatzl, México.

Tillandsia L 'Samantha', O Mexico.

Tillandsia magnusiana Wittm., México, Guatemala, Honduras.

Tillandsia mallemonii Glaz. ex Mez, Brasil.

Tillandsia mauryana L.B. Sm., México.

Tillandsia montana Reitz, Brasil.

Tillandsia neglecta E. Pereira, Brasil.

Tillandsia oaxacana L.B. Sm., México.

Tillandsia pohliana Mez, Brasil.

Tillandsia recurvata (L.) L., América tropical.

Tillandsia reichenbachii Baker, Bolivia, Argentina.

Tillandsia schiedeana Steud., Costa Rica, México, Venezuela.

Tillandsia seleriana Mez = *T. ehlersiana* Rauh, Chiapas (México).

Tillandsia seleriana Mez, México.

Tillandsia streptophylla Scheidw. ex E.Morren, México.

Tillandsia stricta Sol. ex Ker Gawl., Sudamérica.

Tillandsia tectorum E. Morren, Perú, Ecuador.

Tillandsia tricolor Schldl. & Cham. = *T. melanocrater* L. B. Sm., Guatemala, Costa Rica, Panamá.

Tillandsia usneoides (L.) L., Musgo español. De EE UU a Argentina.

Tillandsia velutina Ehlers, México.

Tillandsia xerographica Rohweder, Guatemala.

Vriesea hieroglyphica (Carrière.) E. Morr., Brasil.

Vriesea procera (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm., Brasil, Venezuela.

Vriesea splendens (Brongn.) Lem. = *Tillandsia splendens* Brongn.,
Venezuela, Guayana, Trinidad y Tobago.

Vriesea x poelmanii Leon Duval, Origen hortícola.

Buxaceae

Buxus balearica Lam., Boj. Cerdeña, Islas Baleares, N África, S
España, S Turquía.

Buxus sempervirens L. = *B. colchica* Pojark. = *B. hyrcana* Pojark.,
Boj común. C, S Europa, N África, SO Asia.

Cactaceae

Astrophytum myriostigma Lem., Bonete de obispo. México.

Astrophytum ornatum (DC.) Britton. & Rose, México.

Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb. = *O. subulata*
(Muehlenpf.) Engelm., S Perú.

Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A. Berger = *Opuntia brasiliensis*
(Willd.) Haw., Brasil.

Cactus muehlenpfordtii Kuntze = *Mammillaria muehlenpfordtii*
Foerster, Quanajuato, Querétaro, San Luis de Potosi (México).

Cactus sp mix Juss., Cactaceae. America del norte y del sur .

Carnegiea gigantea (Engelm.) Britton & Rose, Saguaro. Desierto de
Sonora-Arizona (EEUU).

Cereus peruvianus (L.) Mill. 'Monstruosus', Origen hortícola.

Cereus peruvianus (L.) Mill., Brasil, Argentina.

Cleistocactus hildegardiae F. Ritter, Bolivia.

Cleistocactus straussii (Heese) Backeb. = *Borzicactus straussii*
(Heese) A. Berger, Bolivia, Argentina.

Cleistocactus winteri D. R. Hunt, Cola de Rata dorada. De Argentina a Uruguay.

Cochemiea maritima G.E. Linds. = *Mammillaria pondii* subsp. *maritima* (G.E. Linds.) D.R. Hunt, A lo largo de la costa del Pacífico fde la Baja California (México).

Cochemiea poselgeri Britton & Rose = *Mammillaria poselgeri* Hildmann, Baja California.

Copiapoa gigantea Backeb., Chile.

Copiapoa haseltoniana Backeb., Chile.

Copiapoa lembeckii F. Ritter, Chile.

Cryptocereus antonianus Alexander, México.

Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M. Knuth = *Opuntia imbricata* (Haw.) DC., México.

Cylindropuntia leptocaulis (DC.) F.M. Knuth = *Opuntia leptocaulis* DC., De Oklahoma a Arizona, S México.

Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb. = *O. pallida* Rose = *O. rosea* DC., *Cactaceae*. Cactus rosa. México.

Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb. = *Opuntia pallida* Rose, México.

Cylindropuntia spinosior (Engelm.) F.M.Knuth = *Opuntia spinosior* (Engelm.) Toumey, Arizona, Nuevo México, N México.

Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F.M.Knuth = *Opuntia tunicata* (Lehm.) Pfeiff., Desierto Arizona (México).

Disocactus nelsonii (Britton. & Rose) Linding., México.

Echinocactus grusonii Hildm. 'Brevispinus' Y. Ito, Origen hortícola.

Echinocactus grusonii Hildm. var. *albispina*, México.

Echinocactus grusonii Hildm., Asiento de suegra. México.

- Echinocactus platyacanthus* Link & Otto = *E. ingens* Zucc. ex Pfeiff., México.
- Echinocereus pectinatus* (Scheidew.) Engelm., N México.
- Echinocereus pentalophus* (DC.) Lem., México.
- Echinocereus triglochidiatus* Englm., Nuevo México.
- Echinopsis huascha* (Web.) Friedrich & G.D.Rowley =
Trichocereus huascha (F.A.C. Weber) Britton & Rose, Argentina.
- Echinopsis huascha* (Web.) Friedrich & Rowley, Argentina.
- Echinopsis multiplex* (Pfeiff.) Zucc., S Brasil.
- Echinopsis scopulicola* (F. Ritter) Mottram, Bolivia.
- Epiphyllum anguliger* (Lem.) G.Don, México.
- Epiphyllum crenatum* (Lindl.) G. Don, De México a Honduras.
- Epithelantha micromeris* (Engelm.) F.A.C.Weber ex Britton & Rose, O Texas a N México.
- Eriosyce subgibbosa* subsp. *clavata* (Söhrens ex K.Schum.) Katt. =
Neoporteria nigrihorrida Backeb., Costa de Chile.
- Espostoa lanata* (Kunth) Britton & Rose, N Perú.
- Ferocactus chrysacanthus* (Orcutt) Britton & Rose, México.
- Ferocactus emoryi* subsp. *rectispinus* (Engelm.) N.P. Taylor = *F. rectispinus* (Engelm.) Britton & Rose, Baja California (México).
- Ferocactus glaucescens* (DC.) Britton & Rose, México.
- Ferocactus gracilis* subsp. *coloratus* (H.E.Gates) N.P.Taylor = *F. coloratus* H.E. Gates, Baja California (México).
- Ferocactus gracilis* subsp. *gatesii* (G.E. Linds) N.P. Taylor =
Ferocactus gatesii G.E. Linds., Baja California (México).
- Ferocactus herrerae* J.G. Ortega, México.
- Ferocactus histrix* (DC.) G.E. Linds., México central.

Ferocactus macrodiscus (Mart.) Britton & Rose, San Luis de Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Oaxaca (México).

Ferocactus peninsulae (A.A.Weber) Britton & Rose = *F. horridus* Britton & Rose, Baja California (México).

Ferocactus pilosus (Galeotti ex Salm-Dick) Werder = *F. stainesii* var. *pringlei* (J.M. Coult.) Backeb., San Luis de Potosí, Zacatecas, Coahuila (México).

Ferocactus recurvus (Mill.) Borg = *F. latispinus* (Haw.) Britton & Rose, Lengua del demonio. E,C México.

Ferocactus schwarzii G.E. Linds., Sinaloa (México).

Gymnocalycium baldianum (Speg.) Speg., Argentina.

Gymnocalycium saglionis (Cels) Britton & Rose, Argentina.

Hatiora salicornioides Britton. & Rose f. *bambusoides* (F.A.C. Weber) Supplie, Brasil.

Hatiora salicornioides Britton. & Rose, Brasil.

Hylocereus esquiintlensis Kimmach, Guatemala.

Hylocereus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) Ralf Bauer = *Selenicereus setaceus* (Salm-Dyck ex DC.) A.Berger ex Werderm., Argentina, Bolivia, Brasil; Paraguay.

Hylocereus sp (A. Berger) Britton & Rose, América tropical.

Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose, Dama de la noche. C América.

Lepismium cruciformis (Vell.) Miq. = *Rhypsalis cruciformis* (Vell.) A. Cast., Argentina, Brasil.

Leuchtenbergia principis Hook., México.

Mammillaria albescens Tiegel subsp. *maritimus*, México.

Mammillaria albicans (Britton & Rose) Berger., Baja California.

Mammillaria albicans subsp. *fraileana* (Britton & Rose) D.R. Hunt.
= *M. fraileana* (Britton & Rose) Boed., México.

Mammillaria albilanata Backeb subsp. *oaxacana* D.R. Hunt,
Oaxaca (México).

Mammillaria albilanata Backeb. subsp. *tegelbergiana* (Gates ex
Lindsay) Hunt, México, Chiapas.

Mammillaria amajacensis Brachet & M. Lacoste, México.

Mammillaria apozolensis Repp. var. *saltensis* Repp, México,
Zacatecas.

Mammillaria armillata K. Brandegee, Baja California (México).

Mammillaria bachmannii Boed. ex Berger, México.

Mammillaria backebergiana F.G. Buchenau subsp. *ernestii*
(Fittkan) Hunt, Guerrero (México).

Mammillaria backebergiana F.G. Buchenau, México.

Mammillaria baumii Boed., México.

Mammillaria beneckeii Ehrenb. var. *multiprolifera*, S México.

Mammillaria blossfeldiana Boed., Baja California , México.

Mammillaria bocasana Poselg. = *M. bocasana* subsp. *bocasana*, San
Luis de Potosi (México).

Mammillaria bocasana Poselg., San Luis de Potosi (México).

Mammillaria bocasana subsp. *eschauzieri* (J.M. Coult.) Fitz
Maurice & B. Fitz Maurice = *M. hirsuta* Boed. = *M. longicoma*
Britton & Rose, San Luis de Potosi, Zacatecas (México).

Mammillaria boelderiana Wohlschl., México, Zacatecas.

Mammillaria bombycina Quehl, México.

Mammillaria brandegeei subsp. *lewisiana* (H.E. Gates) D.R. Hunt,
México, Baja California.

Mammillaria bravoae R.T. Craig subsp. *maritimus*, México.

- Mammillaria buxbaumeriana* Repp., México, Guanajuato.
- Mammillaria canelensis* R.T. Craig., SO Chihuahua, SE Sonora (México).
- Mammillaria capensis* (H.E. Gates) Craig, México, Baja California.
- Mammillaria carmenae* Castañeda 'Dark red', Origen hortícola.
- Mammillaria carnea* Zucc. ex Pfeiff., México: Puebla.
- Mammillaria cerralboa* (Britton & Rose) Orcutt, México, Baja California.
- Mammillaria chica* Repp., Durango (México).
- Mammillaria chionocephala* J.A. Purpus = *M. ritteriana* Boed., Nuevo León, Coahuila, Durango (México).
- Mammillaria columbiana* (Werd.) Dugand var. *bogotensis*, Colombia, Venezuela.
- Mammillaria columbiana* Salm-Dyck subsp. *yucatanensis* (Britton et Rose) Hunt, SE México.
- Mammillaria compressa* DC., México.
- Mammillaria confusa* Orcutt, México.
- Mammillaria crinita* DC., México.
- Mammillaria crinita* subsp. *scheinvariana* (R. Ortega & Glass in Glass) Fitz Maurice & B. Fitz Maurice = *M. scheinvariana* Ortega-Varela & Glass in Glass, Queretaro, Hidalgo (México).
- Mammillaria crinita* subsp. *wildii* (A. Dietr.) D.R. Hunt = *M. wildii* Dietr., Hidalgo (México).
- Mammillaria crucigera* Mart., México.
- Mammillaria diacentra* Jacobi, México.
- Mammillaria dioica* K. Brandegees, S California a México.
- Mammillaria discolor* Haw., México.

- Mammillaria dixanthocentron* Backeb., México: Puebla, Oaxaca.
- Mammillaria duoformis* R.T. Craig & E.Y. Dawson, Puebla, Oaxaca, Morelos (México).
- Mammillaria eichlamii* Quehl = *M. voburnensis* var. *eichlamii* (Quehl) Repp., Honduras, Chiapas (México).
- Mammillaria elongata* DC., C México.
- Mammillaria erythrosperma* Boed. var. *robusta*, México.
- Mammillaria evermanniana* (Britton & Rose) Orcutt, Isla Cerralvo (México).
- Mammillaria flavicentra* f. *hamata*
- Mammillaria gaumeri* (Britton & Rose) Orcutt, México, Yucatán.
- Mammillaria geminispina* Haw., México.
- Mammillaria gigantea* Hildm. ex K. Schum., México.
- Mammillaria glassii* R.A. Foster, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas (México).
- Mammillaria goodridgii* Scheer = *M. rectispina* (E.Y. Dawson) Repp., Isla de Cedros (México).
- Mammillaria gracilis* Pfeiff. = *M. fragilis* Salm-Dyck, Cactus dedal. C México.
- Mammillaria gracilis* Pfeiff. = *M. vetula* subsp. *gracilis* (Pfeiff.) D.R. Hunt, Hidalgo, Queretaro, Guanajuato (México).
- Mammillaria grahamii* Engelm. = *M. oliviae* Orcutt, México, Arizona, Nuevo México, Texas, California (EEUU).
- Mammillaria grusonii* Runge, México, Coahuila.
- Mammillaria gueldemanniana* Bakeb., Sierra de Álamos, Sonora (México).
- Mammillaria guelzowiana* Werderm., Durango (México).
- Mammillaria guerreronis* (Bravo) Boed., México.

Mammillaria haageana Pfeiff. subsp. *conspicua* (J.A. Purpus) D.R.
Hunt = *M. albidula* Backeb., Puebla, Morelos, Oaxaca (México).

Mammillaria haageana Pfeiff. subsp. *schmollii* (R.T. Craig bis) D.R.
Hunt, Puebla, Oaxaca (México).

Mammillaria hahniana Werdem. 'Albiflora', Origen hortícola.

Mammillaria hahniana Werdem. subsp. *mendeliana* (Bravo) D.R.
Hunt Neomammillaria mendeliana Bravo, Guanajuato (México).

Mammillaria hahniana Werdem. subsp. *woodsii* (R.T. Craig) D.R.
Hunt, México.

Mammillaria hahniana Werdem., Queretaro, Guanajuato (México).

Mammillaria halhingeri Boed., Oaxaca (México).

Mammillaria hamata Lehm. ex Pfeiff., Puebla (México).

Mammillaria heyderi Muehlenpf., México.

Mammillaria hubertmulleri Repp., Morelos (México).

Mammillaria huitzilopochtli D.R. Hunt subsp. *niduliformis* (A.B.
Lau) Pilbeam, México, Oaxaca.

Mammillaria huitzilopochtli D.R. Hunt, México.

Mammillaria humboldtii Ehrenb., México, Hidalgo.

Mammillaria icamolensis Boed., Nuevo León (México).

Mammillaria jaliscana (Britton & Rose) Boed., México, Jalisco.

Mammillaria johnstonii (Britton & Rose) Orcutt, Sonora.

Mammillaria karwinskiana subsp. *beiselii* (Diers) D.R. Hunt = *M.*
beiselii Diers, México.

Mammillaria klissingiana Boed., México.

Mammillaria knippeliana Quehl, México, Morelos.

Mammillaria lasiacantha Engelman subsp. *hyalina* Hunt., México,
Fresnillo, Zacatecas.

Mammillaria laui D.R. Hunt subsp. *dasyacantha* (D.R. Hunt) D.R. Hunt, México.

Mammillaria lloydii (Britton & Rose) Orcutt, México, Zacatecas, San Luis de Potosí.

Mammillaria longimamma DC., México, EEUU.

Mammillaria magnifica F.G. Buchenau, Puebla, Morelos (México).

Mammillaria magnimamma Haw. = *M. centricirrho* Lem. = *M. phymatothele* A. Berger, México.

Mammillaria mammillaris (L.) H. Karst., México, S EEUU, Antillas holandesas, Venezuela.

Mammillaria marksiana Krainz, C México.

Mammillaria matudae Bravo, Michoacan (México).

Mammillaria mazatlanensis K. Schum. = *M. mazatlanensis* subsp. *mazatlanensis* = *M. occidentalis* Boed., Sinaloa, Sonora, Jalisco, Colima., Michoacan (México).

Mammillaria melanocentra subsp. *rubrograndis* (Repp. & A.B. Lau) D.R. Hunt, México.

Mammillaria mendeliana (Bravo) Wederm., México.

Mammillaria meyranii Bravo, México.

Mammillaria microhelia Werderm., Queretaro (México).

Mammillaria miegiana W. Earle, México.

Mammillaria multidigitata W.T. Marshall ex Linds., México, Baja California.

Mammillaria multihamata Boed. = *M. marcosii* Fitz Maurice, Fitz Maurice & Glass, México, Guanajuato.

Mammillaria mystax Mart., C México.

Mammillaria nana Backeb. subsp. *nana* = *M. monancistracantha* Backeb., Santa M^a del Rio, san Luis del Potosi (México).

- Mammillaria nana* Backeb., Guanajuato (México).
- Mammillaria napina* J.A. Purpus, México.
- Mammillaria neocoronaria* F.M. Knuth, México.
- Mammillaria neopalmeri* Craig, México, Baja California.
- Mammillaria nivosa* Link ex Pfeiffer, Tortola (Mar Caribe).
- Mammillaria nunezii* subsp. *bella* (Backeb.) D.R. Hunt = *M. bella* Backeb., México, Guerrero.
- Mammillaria nunezii* subsp. *bella* (Backeb.) D.R. Hunt = *M. bella* Backeb. Cactaceae. México, Guerrero.
- Mammillaria orcuttii* Boed., México.
- Mammillaria ortegae* (Britton & Rose) Orcutt, México.
- Mammillaria overmanniana* Orcutt., México, Cerralvo en baja California.
- Mammillaria pacifica* (H.E. Gates) Boed., S Baja California (México).
- Mammillaria parkinsonii* Ehrenb., México.
- Mammillaria pennispinosa* subsp. *nazasensis* (Glass & R. Foster) D.R. Hunt = *M. pennispinosa* var. *nazasensis* Glass & R. Foster, Coahuila, Durango (México).
- Mammillaria petterssonii* Hildm., México.
- Mammillaria polyedra* Mart., México.
- Mammillaria polythele* Mart. = *M. crocidata* Lem., México.
- Mammillaria polythele* Mart. = *M. hidalgensis* Purpus, Hidalgo, Queretaro, Guanajuato (México).
- Mammillaria pottsii* Scheer ex Salm-Dyck, Durango, Coahuila, Chihuahua, zacatecas (México), S Texas (EEUU).
- Mammillaria prolifera* (Mill.) Haw. subsp. *haitiensis* (K. Schum.) D.R. Hunt, México.

- Mammillaria prolifera* (Mill.) Haw., México, Texas (EEUU).
- Mammillaria prolifera* subsp. *multiceps* (Salm-Dyck) U. Guzmán
M. prolifera subsp. *texana* (Engelm.) D.R. Hunt, México.
- Mammillaria pseudocrucigera* (R.T. Craig.) D.R. Hunt = *M.*
formosa subsp. *pseudocrucigera* (R.T. Craig) D.R. Hunt, México.
- Mammillaria rectispina* (E.Y. Dawson) Repp., Baja California,
México.
- Mammillaria rekoi* Vaupel = *M. rekoi* subsp. *rekoi*, Oaxaca
(México).
- Mammillaria rekoi* Vaupel subsp. *leptocantha* (Lau) Hunt. var.
aurespina, Oaxaca (México).
- Mammillaria rhodantha* Link & Otto = *M. rhodantha* Link & Otto
subsp. *rhodantha*, Hidalgo, Michoacan, Queretano, Guanajuato
(México).
- Mammillaria rhodantha* Link & Otto subsp. *mccartenii* Repp.,
Michoacan, Zacatecas (México).
- Mammillaria rhodantha* Link & Otto subsp. *pringlei* (J.M. Coult.)
D.R. Hunt, Jalisco, Queretaro, Guanajuato (México).
- Mammillaria roseoalba* Boed., México.
- Mammillaria schiedeana* Ehrenb. ex Schltdl. = *M. schiedeana*
subsp. *schiedeana* Ehrenberg., Hidalgo, Queretaro (México).
- Mammillaria schiedeana* Ehrenberg. subsp. *giselae* Lüthy,
Tamaulipas (México).
- Mammillaria schiedeana* Ehrenberg., México.
- Mammillaria schumannii* Hildm., Baja California (México).
- Mammillaria scrippsiana* (Britton & Rose) Orcutt var. *autlanensis*,
México.
- Mammillaria setispina* Englm. ex J.M. Coult., Baja California.

Mammillaria sheldonii (Britton & Rose) Boed., Sonora, Chihuahua (México).

Mammillaria solisioides Backeb., Puebla, Oaxaca (México).

Mammillaria sphacelata Mart., Puebla, Oaxaca.

Mammillaria sphacelata subsp. *viperina* (J.A. Purpus) D.R. Hunt = *M. viperina* J.A. Purpus, México.

Mammillaria sphaerica A. Dietr., México.

Mammillaria spinosissima Lem. subsp. *pilcayensis* (Bravo) D.R. Hunt, México.

Mammillaria spinosissima Lem. subsp. *spinossisima* = *M. gasterantha*, Morelos, Guerrero (México).

Mammillaria spinosissima Lem. var. *auricoma* 'Cristata', México.

Mammillaria spinosissima Salm-Dyck var. *auricoma* (A.Dietr.) Gürke, Morelos (México).

Mammillaria tayloriorum Glass. & R.A. Foster, México.

Mammillaria tepexicensis J. Meyran, Oaxaca (México).

Mammillaria thornberi subsp. *yaquensis* (R.T. Craig) D.R. Hunt, Sonora (México).

Mammillaria vagaspina R.T. Craig, México.

Mammillaria varieaculeata Bucheanu, Puebla (México).

Mammillaria verhaertiana Boed. = *M. phitauiana* (E.M. Baxter) Werderm., México.

Mammillaria voburnensis Scheer, Chiapas, Oaxaca (México).

Mammillaria voburnensis subsp. *collinsii* (Britton & Rose) U. Guzmán = *M. karwinskiana* Mart. subsp. *collinsii* (Britton & Rose) D.R. Hunt, Oaxaca (México).

Mammillaria vonwyssiana Krainz, México.

Mammillaria wagneriana Boed., México.

Mammillaria weingartiana Boed., Nuevo León (México).

Mammillaria winterae Boed., México.

Mammillaria winterae subsp. *aramberri* Hunt, Nuevo León (México).

Mammillaria zeilmanniana Boed. var. *alba*, Guanajuato (México).

Marginatocereus marginatus (DC.) Backeb. = *Pachycereus marginatus* (DC.) Britton & Rose, Organo, Jarritos. México central.

Marginatocereus marginatus (DC.) Backeb. = *Stenocereus marginatus* (DC.) A. Berger & Buxb., México.

Matucana aureiflora F. Ritter, Perú.

Matucana madisoniorum (Hutchison) G.D. Rowley, Perú.

Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex Pfeiff.) Console, México.

Neomammillaria candida (Scheidw.) Britton & Rose = *Mammillaria candida* Scheidw., México.

Neomammillaria graessneriana (Boed.) Britton & Rose = *Mammillaria graessneriana* Boed., Coahuila (México).

Neoporteria napina (Phil.) Backeb., Chile.

Notocactus leninghausii (K. Schum.) Backeb., Brasil, Argentina.

Notocactus magnificus (F.Ritter) Krainz ex N.P.Taylor = *Eriocactus magnificus* F. Ritter, Brasil.

Opuntia articulata (Pfeiff.) D.R. Hunt var. *inermis* Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backeb., Argentina.

Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., México, Arizona (EEUU).

Opuntia engelmannii var. *linguiformis* (Griffiths) B.D.Parfitt & Pinkava = *O. linguiformis* Griffiths, S de Tejas a San Antonio (EEUU).

Opuntia ficus-indica (L.) Mill., Chumbera, Tuna. México.

Opuntia macrocentra Engelm. = *O. violacea* Engelm., México.

Opuntia microdasys subsp. *rufida* (Engelm.) U. Guzmán & Mandujano = *O. rufida* Engelm., Tejas, N Méjico.

Opuntia monacantha (Willd.) Haw., S Brasil, Paraguay.

Opuntia picardoi Marn.-Lap., N Argentina.

Opuntia robusta J.C. Wendl., Cholla. México central.

Opuntia salmiana Parm. ex Pfeiff., Brasil, Paraguay, Argentina.

Opuntia santarita (Griffiths & Hare) Rose = *O. violacea* var. *santarita* (Griffiths & Hare) L.D. Benson, De Tejas a Arizona.

Opuntia tomentosa Salm-Dyck, México central.

Oreocereus trollii Kupper, Viejo hombre de los Andes. S Bolivia, N Argentina.

Ortegocactus macdougallii Alexander, Oaxaca (México).

Pachycereus pringlei (S. Watson) Britton & Rose, México, Baja california.

Parodia concinna (Monv.) N. P. Taylor, Brasil.

Pereskia aculeata Mill., América tropical.

Pereskia diazromeroana Cárdenas, Bolivia.

Pereskia humboldtii Britton & Rose var. *humboldtii*, O de S América.

Pereskia marcanoi Areces, De Brasil a Mexico.

Pereskia weberiana K. Schum., Bolivia.

Pfeiffera asuntapatense (M. Kessler, Ibisch & Barthlott) Ralf Bauer = *Lepismium asuntapatense* M. Kessler, Ibisch & Barthlott, Bolivia.

Pseudorhipsalis ramulosa (Salm-Dyck) Barthlott = *Disocactus ramulosus* (Salm-Dyck) Kimmach, De México a N Suramérica.

Rebutia heliosa Rausch, Bolivia.

Rebutia pulvinosa F. Ritter & Buininig, Bolivia.

Rhipsalis agudoensis N.P.Taylor, Rio Grande do Sul (Brasil).

Rhipsalis angustissima F.A.C. Weber = *Pseudorhipsalis ramulosa*
(Salm-Dyck) Barthlott, Costa Rica.

Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn = *Rhipsalis coralloides*
Rauh, América Centra, America del Sur, caribe, Florida (EEUU).

Rhipsalis boliviana (Britton) Lauterb. = *Lepismium bolivianum*
(Britton) Barthlott, Bolivia.

Rhipsalis cereoides (Backeb. & Voll) Backeb., Brasil.

Rhipsalis cereuscula Haw., Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay,
Argentina.

Rhipsalis crispata (Haw.) Pfeiff., Brasil.

Rhipsalis ewaldiana Barthlott & N.P.Taylor, Brasil.

Rhipsalis hoelleri Barthlott. & N.P. Taylor, Brasil.

Rhipsalis mesembryanthemoides Haw., Brasil.

Rhipsalis neves-armondii K.Schum., Brasil.

Rhipsalis pachyptera Pfeiff., Brasil.

Rhipsalis paradoxa (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck, Brasil.

Rhipsalis pilocarpa f. *pilocarpa* Loefgr., Brasil.

Rhipsalis pilocarpa Loefgr. f. *minima* Süplie, Brasil.

Rhipsalis rauhiorum Barthlott, Perú, Ecuador.

Rhipsalis sp Gaertn., América, África, Ceilán (Asia).

Rhipsalis sulcata F.A.C.Weber, Espirito santo (Brasil).

Rhipsalis teres f. *prismatica* (Vell.) Steud., Brasil.

Rhypsalis sp. Gaertn.,

Schlumbergera truncata (Haw.) Moran = *Zygocactus truncatus*
(Haw.) K. Schum., Brasil.

Selenicereus anthonyanum (Alexander) D.R. Hunt., Reina de la
noche. México.

Selenicereus chrysocardium (Alexander) Kimmach, América
Central, América del Sur, Caribe.

Selenicereus grandiflorus Britt. & Rose subsp. *lautner* Ralf Bauer,
México.

Selenicereus hondurensis (K.Schum.) Britton & Rose, Honduras,
Guatemala.

Selenicereus macdonaldiae (Hook.) Britton. & Rose, Honduras.

Selenicereus macranthus

Selenicereus pteranthus (Link ex A. Dietr.) Britton & Rose,
Princesa de la Noche. México.

Stenocactus crispatus (DC.) A. Berger ex A.W. Hill, México.

Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose, Palillo de dientes.
Bolivia, Argentina.

Sulcorebutia arenacea (Cárdena) F. Ritter, Cochabamba (Bolivia).

Tunilla erectoclada (Backeb.) D. R. Hunt & J. Iliff, Argentina.

Weberocereus glaber (Eichlam) G.D. Rowley, Costa Rica,
Guatemala, México.

Weberocereus sp Britton. & Rose, Costa Rica, Guatemala, México.

Weingartia neocumingii Backeb., Bolivia.

Campanulaceae

Campanula portenschlagiana Schult. Blue Addu', Croacia.

Jasione montana L., Europa, NO África, Turquía.

Trachelium caeruleum L. subsp. *caeruleum*, Flor de la viuda
Península Ibérica, Islas Baleares, N África, Italia, Sicilia.

Cannabaceae

Celtis australis L., Almez, Almencino. S Europa, N África, O Asia.

Celtis julianae C.K. Schneid., China.

Celtis occidentalis L., Almez americano. SE Canadá, EE UU.

Cannaceae

Canna x generalis L.H. Bailey & E.Z. Bailey, Origen hortícola.

Capparaceae

Capparis spinosa L. subsp. *spinosa*, Región mediterránea.

Caprifoliaceae

Abelia chinensis R. Br. *A. rupestris* Lindl., Abelia. China.

Abelia x grandiflora (Ravelli ex André) Rehder. Abelia. Origen hortícola.

Lonicera fragrantissima Lindl. & J. Paxton, China.

Lonicera japonica Thunb., Madreselva. E Asia.

Pseudoscabiosa grosii (Font Quer) Devesa, Sierras Tejeda, Almijara; Chaparral y Cázulas (Málaga-Granada).

Scabiosa stellata L., SO Europa.

Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake, E EEUU.

Weigela florida (Bunge) A. DC. 'Red Prince', Origen hortícola.

Caricaceae

Carica papaya L. 'BH-65', Papaya BH-65. Origen hortícola.

Carica papaya L. 'Exótica', Papaya Exótica. Origen hortícola.

Carica papaya L. f. 'Leide', Origen hortícola.

Caryophyllaceae

Cerastium tomentosum L., Italia.

Dianthus anticarius Boiss. & Reut, SO Región mediterránea.

Dianthus caryophyllus L. 'Cornelia', Clavel común. Origen hortícola.

Paronychia argentea Lam., Paroniquia. Región mediterránea.

Polycarpon tetraphyllum (L.) L., O, C Europa, Región mediterránea, S, O Asia, África.

Sagina procumbens L., Europa.

Sagina subulata (Sw.) C.Presl, O, C Europa, Península Balcánica.

Silene colorata Poir, Región mediterránea, N Irán, Arabia, Is. Canarias (Lanzarote).

Casuarinaceae

Casuarina cunninghamiana Miq., Nueva Gales del Sur (Australia).

Casuarina equisetifolia L., Australia, Malasia, Polinesia.

Celastraceae

Brexia madagascarensis (Lam.) Thouars ex Ker Gawl., E África.

Catha edulis (Vahl.) Endl., Té de Abisinia. De SO Arabia a S África.

Euonymus alatus (Thunb.) Siebold, E Asia.

Euonymus fortunei (Turez.) Hand.-Mazz. `Canadale Gold`, Origen hortícola.

Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes. = *Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell subsp. *europaeus* (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes et M.B. Crespo, Arto, Espino cambrón. SE Península Ibérica, N África (Marruecos y Argelia).

Maytenus canariensis (Loes) G. Kunkel & Sunding, Peralillo Islas Canarias.

Cephalotaceae

Cephalotus follicularis Labill., Cephalotaceae. Australia.

Chenopodiaceae

Beta vulgaris L. = *B. vulgaris* subsp. *maritima* (L.) Arcang., Región mediterránea.

Chenopodium murale L., Zona meridional de Euroasia.

Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz, Región mediterránea, C Europa, C Asia, África tropical.

Cichorioideae

Carlina corymbosa L., Región mediterránea.

Cistaceae

Cistus albidus L., Jara blanca. Región mediterránea occidental.

Cistus clusii Dunal, Región mediterránea.

Cistus clusii Dunal subsp. *clusii*, Jaguarzo blanco, romerilla. Ibero-magrebí, Sicilia, S Península Itálica.

Cistus crispus L., Región mediterránea occidental.

Cistus ladanifer L., Región mediterránea occidental.

Cistus laurifolius L., Mediterráneo occidental, Mar Egeo, Anatolia.

Cistus monspeliensis L., Región mediterránea, Madeira, Tenerife.

Cistus salviifolius L., Región mediterránea.

Cistus x corbariensis Pourr., Origen hortícola.

Cistus x purpureus Lam., Origen hortícola.

Fumana thymifolia (L.) Spach, Región mediterránea.

Clusiaceae

Mammea americana L., Jamaica, Is. La Española, Puerto Rico, Las Antillas.

Webbia canariensis (L.) Webb & Berthel., Islas Canarias.

Combretaceae

Combretum indicum (L.) DeFilipps = *Quisqualis indica* L., *Cuisqualis*. De La Unión de Myanmar a Nueva Guinea.

Commelinaceae

Callisia fragans (Lindl.) Woodson = *Spirocnema fragans* Lindl., México.

Callisia repens (Jacq.) L., América tropical.

Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt 'Purple Heart' = *Setcreasea purpurea* Boom, Origen hortícola.

Tradescantia zebrina Bosse, México.

Tradescantia x andersoniana W.Ludw. & Rohweder 'Blue & Gold',
Origen hortícola.

Compositae

Ajania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries, C, E Asia.

Andryala glandulosa Lam., Madeira (Portugal).

Andryala integrifolia L., SO Europa, Región mediterránea,
macaronesia.

Antennaria chilensis J. Remy, Astearceae. Chile.

Anthemis arvensis L., Manzanilla bastarda. Europa.

Arctotis x hybrida Hort., Origen hortícola.

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip., Gran Canarias (Islas
Canarias).

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe = *A. pinnatifidum* (L.f.)
Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) Humphries, Madeira (Portugal).

Artemisia argentea L'Hér, Madeira.

Aster amellus L., Aster, Amelio. C y SE Europa, O Asia.

Aster novi-belgii L., América del Norte.

Atractylis cancellata L., S Europa, N África, Macaronesia

Bartlettina sordida (Less.) R.M. King & H. Rob. = *Eupatorium sor-
didum* Less., Eupatorio. México.

Berkheya purpurea (DC.) Benth. & Hook.f. ex Mast., *Compositae*. S
África.

Bidens ferulifolia (Jacq.) Sweet, De S EEUU a C América.

Brachycome iberidifolia Benth., O a S Australia.

Calendula arvensis M. Bieb., Región mediterránea.

- Calendula officinalis* L., Caléndula. De S de Europa al N África.
- Carthamus arborescens* L., S España, NO África.
- Centaurea candidissima* Lam., Centaurea plateada. S Europa.
- Centaurea carratracensis* Lange, Ronda (Sierra de Aguas y Sierra de la Robla, Málaga).
- Centaurea melitensis* L., Europa, África.
- Centaurea nigra* L., N África.
- Centaurea prolongoi* Pau, Sierras béticas andaluzas.
- Centaurea pullata* L., España, Portugal.
- Centaurea solstitialis* L., Abrepuño amarillo. Región mediterránea.
- Cheirolophus falcisectus* Svent. ex Montelongo & Moraleda, Gran Canaria (Islas Canarias).
- Cheirolophus sempervirens* (L.) Pomel = *Centaurea sempervirens* L., Región mediterránea occidental.
- Chrysanthemum morifolium* Ramat., Crisantemo, Margarita. China.
- Cichorium intybus* L., N África, Europa, Asia.
- Coreopsis grandiflora* Hogg ex Sweet, EE UU.
- Cosmos* sp. Cav., S EEUU, México, Panamá.
- Crepis vesicaria* L., O, S, Europa.
- Dittrichia viscosa* (L.) Greuter = *Inula viscosa* (L.) Aiton, Región mediterránea.
- Dymondia margaritae* Compton, Dimondia, Alfombra del Cabo. Sudáfrica.
- Erigeron karwiskianum* DC. = *E. mucronatus* DC., C América.
- Eriocephalus africanus* L., S África.
- Euryops evansii* Schltr., S África.

Euryops pectinatus (L.) Cass., S África.

Farfugium japonicum (L.) Kitam. `Aureomaculatum' = *F. tussilagineum* (Burm. f.) Kitam. `Aureomaculatum', Origen hortícola.

Farfugium japonicum (L.) Kitam. = *Ligularia tussilaginea* (Burm. f.) Makino, Boina, *Ligularia*. Japón, China.

Felicia amelloides (L.) Voss = *Agatheae caelestis* (L.) DC., Margarita azul. S África.

Filago pyramidata L., SO Europa, NO África, S Asia, Macaronesia

Gaillardia aristata Pursh, N América.

Gaillardia x grandiflora Hort. ex Van Houtte, Origen hortícola.

Galactites tomentosa Moench, Región mediterránea.

Gazania jurineifolia DC. = *G. nivea* Less., S África.

Gynura aurantiaca (Blume) Sch.Bip ex DC., SE Asia, Indonesia.

Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach = *Chrysanthemum coronarium* L., Región mediterránea, C,S Portugal.

Gonospermum canariense (DC.) Less., Islas Canarias.

Hedynopsis rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt = *H. cretica* (L.) Dum.Cours., S Europa, N, O África, SE Asia.

Helianthus annuus L., SE EEUU, N México.

Helianthus californicus DC., California (EEUU).

Helichrysum italicum (Roth) G. Don, Región mediterránea.

Helichrysum obconicum Dc., Madeira (Portugal).

Helichrysum stoechas (L.) Moench = *H. atropurpureum* (W.Bull) Radlk, S, O Europa.

Hymenolepis parviflora (L.) DC. = *Athanasia parviflora* L., Provincia del cabo (Sudáfrica).

Jacobea maritima (L.) Pelsner & Meijden = *Senecio cineraria* DC.,
Compositae. Región mediterránea.

Kleinia longiflora DC. = *Senecio longiflorus* (DC.) Sch.Bip., S
África.

kleinia nerifolia Haw. = *Senecio kleinia* (L.) Less., Verode. Islas
Canarias.

Leontodon longirostris (French & P.D. Sell.) Talavera, S Europa,
NO África, Macaronesia.

Leontodon tinginatus (Boiss. & Reuter) Ball, S España, NO
Marruecos.

Leucophyta brownii Cass. = *Calocephalus brownii* (Cass.) F. Muell.,
Australia.

Matricaria chamomilla L., Europa.

Montanoa bipinnatifida (Kunth) K. Koch, Árbol margaritero,
Margaritero arbóreo. México.

Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. = *Dimorphotheca ecklonis* DC.,
Margarita del Cabo. S África.

Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link, Región mediterránea.

Pallenis maritima (L.) Greuter = *Asteriscus maritimus* (L.) Less., O
Región mediterránea.

Pallenis spinosa (L.) Cass., S Europa.

Phagnalon rupestre (L.) DC., Región mediterránea.

Phagnalon saxatile (L.) Cass., S Europa, N África, Macaronesia.

Reichardia intermedia (Sch. Bip) Samp., S Europa, N África, SO
Asia.

Reichardia tingitana (L.) Roth, Región mediterránea.

Roldana petasitis (Sims.) H. Rob. & Brettel = *Senecio petasitis*
(Sims) DC., Senecio. México.

Rudbeckia hirta L. EEUU.

Santolina chamaecyparissus L. = *S. incana* Lam., Santolina,
Abrótano hembra. Región mediterránea.

Scorzonera angustifolia Asso, Península Ibérica, NO Marruecos.

Scorzonera hispanica L., N África.

Senecio articulatus (L. f.) Sch.Bip. = *Kleinia articulata* (L. f.) Haw.,
S África.

Senecio citrifolius G. D. Rowley, S África.

Senecio crassissimus Humbert, Madagascar.

Senecio herreianus Dinter, Namibia, S África.

Senecio jacobsenii G. D. Rowley, Kenia, Tanzania.

Senecio lineatus (L. f.) DC. = *Cineraria lineata* L. f., Sudáfrica.

Senecio macroglossus DC., África Austral.

Senecio rowleyanus H. Jacobsen = *Kleinia rowleyana* (H. Jacobsen)
G. Kunkel, Namibia.

Senecio scaposus DC. = *S. calamifolius* Hook., S África.

Sonchus oleraceus (L.) L., Cerrojo Euroasia, Región mediterránea.

Sonchus tenerrimus L., Región mediterránea.

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski = *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc.,
América tropical.

Tagetes erecta L. = *T. patula* L., México.

Tagetes erecta L. Nana', Origen hortícola.

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray, De México a N de S
América.

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, Euroasia.

Volutaria muricata (L.) Maire = *Cyanopsis muricata* L.) Dostál, S
España, NO África.

Convallariaceae

Aspidistra elatior Blume, China.

Convolvulaceae

Calystegia soldanella (L.) R.Br., Corregüela marina. De N Europa a la Región mediterránea.

Convolvulus althaeoides L., S Europa.

Convolvulus arvensis L., Europa.

Convolvulus cneorum L., Campanilla. Región mediterránea

Convolvulus floridus L., Islas Canarias.

Convolvulus lanuginosus Desr., S, E España, S Francia.

Convolvulus siculus L., Región mediterránea, Macaronesia.

Convolvulus tricolor L., Región mediterránea, Portugal.

Dichondra repens J. R. Forst. & G. Forst., C América, O India, China, S Japón, Islas Ryu kyu.

Ipomoea cairica (L.) Sweet, África tropical, Asia.

Ipomoea tricolor Cav., América Tropical.

Costaceae

Costus afer Ker Gawl., África tropical.

Costus pulverulentus C. Pres, México.

Crassulaceae

Aeonium arboreum L. ‘Atropurpureum’, Origen hortícola.

Aeonium arboreum L., = *A. manriqueorum* C. Bolle, Hierba puntera. Gran Canaria (Islas Canarias). Islas Canarias (España).

Aeonium castello-paivae Bolle, Islas Canarias.

Aeonium ciliatum (Willd.) Webb & Berth., Islas Canarias.

Aeonium glandulosum (Aiton) Webb & Berthel., Madeira (Portugal).

Aeonium glutinosum (Aiton) Webb & Berthel., Madeira (Portugal).

Aeonium gomerense (Praeger) Praeger, La Gomera (Islas Canaria).

Aeonium goochiae Webb & Berthel., Melera. Islas Canarias.

Aeonium lancerottense (Praeger) Praeger, Lanzarote (Islas Canarias).

Aeonium nobile (Praeger) Praeger, Islas Canarias.

Aeonium percarneum (R.P.Murray) Pit. & Proust., Bejeque rosado. Gran Canaria (Islas Canarias).

Aeonium smithii (Sims) Webb & Berthel., Islas Canarias (España).

Bryophyllum fedtschenkoi (Raym.-Hamet & H. Perrier) Lauz.-March. = *Kalanchoe fedtschenkoi* Raym.-Hamet & H. Perrier, Madagascar.

Crassula arborescens (Mill.) Willd., Sudáfrica.

Crassula arborescens (Mill.) Willd. 'Gollum', Sudáfrica.

Crassula ausensis Hutch., Namibia.

Crassula ausensis Hutch. subsp. *titanopsis* Pavelka, S Namibia.

Crassula capitella (Thunb.) Toelken subsp. *thyrsiflora*, S África.

Crassula columnella Marloth & Schönland, De Costa Oeste de S África a Namibia.

Crassula conmutata Friedr., Namibia.

Crassula corymbulosa Link and Otto, S África.

Crassula dejecta Jacq. = *C. albiflora* Sims, Sudáfrica.

Crassula falcata J. C. Wendl., S África.

Crassula lactea Sol., S África.

Crassula rupestris subsp. *marnieriana* (Huber & Jacobsen) Toelken
= *C. marnieriana* H. Huber & Jacobs, S África.

Crassula mesembryanthemoides (Haw.) Dietr., Namibia.

Crassula nudicaulis L. = *C. obvallata* L., S África.

Crassula orbicularis L. = *C. rosularis* Haw., S África.

Crassula pellucida L. subsp. *marginalis* (Dryand.) Toelken, S
África.

Crassula perforata Thunb., S África.

Crassula rupestris Thunb., S África.

Crassula socialis Schönland, S África.

Crassula spathulata Thunb., Sudáfrica.

Echeveria elegans Rose, México.

Echeveria gibbiflora DC., México.

Echeveria laui Moran & J. Meyrán, México.

Echeveria pilosa J. Purpus, México.

Echeveria setosa Rose & Purpus, México.

Kalanchoe beauverdii Raym.-Hamet, Madagascar.

Kalanchoe beharensis Drake, Madagascar.

Kalanchoe beharensis Drake var. *subnuda* H. Jacobsen,
Madagascar.

Kalanchoe blossfeldiana Poelln., Madagascar.

Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier,
Madagascar.

- Kalanchoe longiflora* Schltr ex J.M. Wood, S África (Natal).
- Kalanchoe marmorata* Baker = *K. grandiflora* A. Rich., E África.
- kalanchoe pumila* Baker, Madagascar.
- Kalanchoe tetraphylla* H. Perrier *K. thyrsiflora* Harv. 'Red Lips',
Origen hortícola.
- Kalanchoe tomentosa* Baker, Madagascar.
- Kalanchoe tubiflora* (Harv.) Raym.-Hamet, S África, Madagascar.
- Monanthes polyphylla* (Aiton) Haw., Islas Canarias (España).
- Pachyphytum oviferum* Purpus, México.
- Sedum acre* L., Península Ibérica.
- Sedum burrito* Moran, Crassulaceae. México, Honduras .
- Sedum lineare* Thunb., E Asia.
- Sedum morganianum* E.Walther, S México.
- Sedum mucizonia* (Ortega) Raym.-Hamet = *Mucizonia hispida* A:
Berger, C y S de la Península Ibérica y el NW de África.
- Sedum nussbaumerianum* Bitter, México.
- Sedum pachyphyllum* Rose, Platanitos. México.
- Sedum palmeri* S. Watson, México.
- Sedum rubrotinctum* R.T. Clausen, México.
- Sedum sediforme* (Jacq.) Pau, Uña de gato. Región mediterránea,
Europa meridional.
- Sempervivum spp.* L., Siempreviva. N África, Oriente medio,
Europa.
- Umbilicus horizontalis* (Guss.) DC., Is. Canarias, S y E España, Is.
Baleares.

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, Región mediterránea,
Macaronesia.

Villadia batesii (Hemsl.) Baehni & Macbride, México.

Cucurbitaceae

Citrullus colocynthis (L.) Schrad., Cabello de ángel. N África

Kedrostis africana (L.) Cogn., África.

Luffa cylindrica (L.) M. Roem = *L. aegyptiaca* Mill., Esponja
vegetal. Asia tropical, África.

Cunoniaceae

Cunonia capensis L., Sudáfrica.

Cupressaceae

Calocedrus decurrens (Torr.) Florin `Aureovariegata´, Origen
hortícola.

Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl. `Ellwoodii´,
Origen hortícola.

Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. `Nana Gracilis´,
Origen hortícola.

Cupressus lusitanica Mill. = *C. coulteri* J. Forbes = *C. lindleyi*
Klotsch, Ciprés de México. C América.

Cupressus sempervirens L., Ciprés mediterráneo, ciprés común.
Región mediterránea, S Europa.

Cupressus sempervirens L. var. *sempervirens*, Ciprés. Región
mediterránea.

Cupressus sempervirens L. var. *horizontalis* (Mill.) Loudon, Ciprés.
Región mediterránea.

Cupressus sempervirens L., 'Stricta', Región mediterránea, S Europa.

Juniperus communis L., Enebro común. Zona templada del Hemisferio Norte.

Juniperus horizontalis Moench, Enebro rastrero. N EEUU.

Juniperus macrocarpa Sm. = *J. oxycedrus* subsp. *macrocarpa* (Sm.) Neilr, Enebro de dunas. Región mediterránea, W Asia.

Juniperus oxycedrus L., Enebro de la miera. Región mediterránea, Caúcaso e Irán.

Juniperus phoenicea L., Región mediterránea, Macaronesia.

Juniperus phoenicea L. var. *turbinata* (Guss.) Parl. = *J. turbinata* L. subsp. *canariensis* (Guyot & Mathou) Rivas Mart., Sabina. Región mediterránea Occidental.

Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng, Sichuan-Hubei (China).

Platycladus orientalis (L.) Franco = *Thuja orientalis* L., Tuya, Árbol de la vida. N y O China, Manchuria, Corea.

Sequoia sempervirens (D, Don.) Endl., Secuoya. California (EEUU).

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J. Buchholz, Secuoya gigante. N California (EEUU).

Taxodium distichum (L.) Rich., Ciprés de los pantanos. SE EEUU.

Taxodium huegelii C.Lawson = *T. mucronatum* Ten., México.

Tetraclinis articulata (Vahl) Mast., SE España, N África.

Cyatheaceae

Sphaeropteris cooperi (F. Muell.) R.M. Tryon = *Cyathea cooperi* (F. Muell.) Domin, Árbol helecho australiano. Australia.

Cycadaceae

Cycas circinalis L., Cica, Palmera helecho, Palma del sagú, Sagú de Nueva Holanda. India, La Unión de Myanmar, Sri Lanka, Islas del Pacífico sur.

Cycas riuminiana Porte ex Regel = *C. circinalis* subsp. *riuminiana* (Porte ex Regel) J.Schust., Islas Palawan.

Cycas revoluta Thunb., Cica, Palma Sagú, Sagú del Japón. Islas Ryu Kyu, S Isla Kyushu (Japón).

Cycas rumphii Miq., India, Sri Lanka, Islas del Pacífico sur.

Cycas taiwaniana Carruth., Isla de Taiwan, Isla de Hainan, SE China.

Cyperaceae

Cyperus alternifolius L., Paragüita. Madagascar.

Cyperus haspan L., México.

Cyperus involucratus Rottb. = *C. flabelliformis* Rottb., Sombrillita, Paragüita. Madagascar, Islas Reunión, Islas Mauricio.

Cyperus papyrus L., Papiro. C África y Valle del Nilo (Egipto).

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla = *Scirpus lacustris* L., Cosmopolita.

Davalliaceae

Davallia canariensis (L.) Sm., Islas Canarias, N África.

Humata griffithiana var. *tyermannii* (T. Moore) Tagawa = *H. tyermannii* T. Moore, China.

Dianellaceae

Dianella tasmanica C. Pynaert. 'Variegata', Tasmania (Australia).

Dicksoniaceae

Balantium antarcticum (Labill.) C. Presl. = *Dicksonia antártica* Labill., Helecho arborescente. S y E Australia, Tasmania .

Didiereaceae

Portulacaria afra Jacq., S África.

Portulacaria afra Jacq. var. *foliis-variegatis* H. Jacobsen .
Mozambique, S África.

Dioscoreaceae

Dioscorea elephantipes (L'Hert) Engl., S África.

Dioscorea macrostachya M. Martens & Galleotti, S México, N Sudamérica.

Doryanthaceae

Doryanthes palmeri W. Hill ex Benth., E Austrtalia.

Droseraceae

Dionaea muscipula J. Ellis, Carolina EEUU.

- Dionaea muscipula* 'Dentata' B. Meyers-Rice, Origen hortícola.
- Dionaea muscipula* 'Red Dragon' R. gagliardo, Origen hortícola.
- Drosera aliciae* Raym.-Hamet., Sudáfrica.
- Drosera anglica* Huds., S Europa, S Japón.
- Drosera auriculata* Backh. ex Planch., S Australia, Tasmania, Nueva Zelanda.
- Drosera binata* Labill., Australia, Nueva Zelanda.
- Drosera burkeana* Planch., África, madagascar.
- Drosera capensis* L., África austral.
- Drosera capillaris* Poir. Alba', Origen hortícola.
- Drosera capillaris* Poir., SE EEUU.
- Drosera communis* A. St-Hil., Brasil.
- Drosera dielsiana* Exell & J.R. Laundon, Zimbawe, Malawi, Natal (S África).
- Drosera filiformis* Raf., EEUU.
- Drosera hamiltonii* C.R.P. Andrews, SO Australia.
- Drosera intermedia* Hayne, Europa, SE Canadá, E EEUU, Cuba, S América.
- Drosera kaiteurensis* Brumm.-Ding., Guayana, Venezuela.
- Drosera madagascariensis* Dc., África.
- Drosera montana* A. St-Hil., Brasil, Venezuela.
- Drosera natalensis* Diels, Sudáfrica, Madagascar.
- Drosera rotundifolia* L., EE UU.
- Drosera scorpioides* Planch., Australia.
- Drosera spatulata* Labill., Asia, Australia.

Dryopteridaceae

Cyrtomium falcatum (L.) C. Presl = *Polystichum falcatum* (L. f.)
Diels, De S África a Hawaii.

Cyrtomium yamamotoi var. *intermedium* (Diels) Ching & K.H.
Shing = *C. fortunei* J. Sm var. *clicicolum* (Makino) Tagawa, Japón,
Korea, China.

Ebenaceae

Diospyros kaki L., Caqui, Kaki, Palo santo China, Japón.

Diospyros kaki L. var. *sharon*, Origen hortícola.

Diospyros kaki L. var. *fuyu*, Caqui Fuyu. Origen hortícola.

Diospyros virginiana L., Caqui de Virginia De Connecticut a
Florida, Iowa, Kansas (E EE UU).

Diospyros nigra (J.F.Gmel.) Perrier = *D. digyna* Jacq., Zapote negro
C America.

Elaeagnaceae

Elaeagnus angustifolia L., Árbol del paraíso. S Europa, De O Asia a
Himalaya.

Ephedraceae

Ephedra chilensis C.Presl, Chile.

Ephedra fragilis Desf. = *E. fragilis* Desf. subsp. *fragilis*, Efedra,
hierba de las coyunturas. O región mediterránea, Macaronesia.

Equisetaceae

Equisetum hyemale L., Cola de caballo. Hemisferio norte.

Equisetum fluviatile L., EE UU.

Ericaceae

Arbutus canariensis Duhamel, Madroño. Tenerife, La Palma, Gran Canaria (Islas Canarias).

Arbutus unedo L., Madroño. S Europa, Irlanda, Palestina, Macaronesia; N África.

Erica mackaiana subsp. *andevalensis* (Cabezudo & Rivera) D.C.McClint. & E.C.Nelson = *E. andevalensis* Cabezudo & J. Rivera, *Ericaceae*. Brezo de las minas. Comarca del Ádevalo, Valle del río Odiel (Huelva).

Kalmia latifolia L., Laurel americano, Laurel de montaña. EE UU.

Pieris floribunda (Pursh) Benth. & Hook f., *Ericaceae*. EEUU.

Euphorbiaceae

Breynia disticha J.R. Forst. & G. Forst., Polinesia.

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. `Aucubifolia´, Croton. Origen hortícola.

Euphorbia abyssinica J.F. Gmel. = *E. acruensis* N.E.Br., Etiopía.

Euphorbia aeruginosa Schweick., S África.

Euphorbia aggregata A. Berger, S. África.

Euphorbia alluaudii Drake = *E. leucodendron* Drake, S Madagascar.

Euphorbia aphylla Brouss. ex Willd., Tolda. Gran Canaria, Tenerife, la Gomera (Islas Canarias).

- Euphorbia atropurpurea* Brouss. ex Willd., Tabaiba mayorera.
Tenerife (Islas Canarias).
- Euphorbia baioensis* S. Carter, Kenia.
- Euphorbia balsamifera* Aiton, Tabaiba dulce. África, Islas Canarias.
- Euphorbia bravoana* Svent., Gomera (Islas Canarias).
- Euphorbia canariensis* L., Cardón. Islas Canarias.
- Euphorbia candelabrum* Tremant ex Kotschy, África tropical.
- Euphorbia caput-medusae* L. 'Cristata', Origen hortícola.
- Euphorbia confinalis* R. A. Dyer, S África, Mozambique, Zimbawe.
- Euphorbia cotinifolia* L., Lechero rojo. México.
- Euphorbia cylindrifolia* Marn.-Lap. & Rauh, Madagascar.
- Euphorbia deightonii* Croizat, Sierra Leona.
- Euphorbia desmondii* Keay & Milne-Redh., Nigeria, Camerún.
- Euphorbia exigua* L., Europa, O Asia, N África, Macaronesia.
- Euphorbia franckiana* A. Berger, S África.
- Euphorbia grandialata* R.A. Dyer, Transval (S África).
- Euphorbia grandidens* Haw., S África.
- Euphorbia helioscopia* L., Europa, Asia, N África, Macaronesia.
- Euphorbia horrida* Boiss., S África.
- Euphorbia inermis* Mill., S África.
- Euphorbia mammillaris* L., S África.
- Euphorbia medicaginea* Boiss., S Península Ibérica, O África.
- Euphorbia milii* Des Moul., Madagascar.
- Euphorbia milii* Des Moul. 'Lutea', Origen hortícola.
- Euphorbia milii* Des Moul. 'Rosea', Origen hortícola.

Euphorbia monteiroi Hook., África tropical.

Euphorbia nerifolia L., India.

Euphorbia nyikae Pax ex Engl., África tropical.

Euphorbia obesa Hook. f., Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Euphorbia pentagona Haw., Sudáfrica.

Euphorbia peplus L., Europa, O Asia, N África, Macaronesia.

Euphorbia pteroneura A. Berger, México.

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch = *Poinsettia pulcherrima* (Willd. ex Klotzsch) Graham, Pascuero, Flor de Pascua, Poinsetia. C México.

Euphorbia pulvinata Marloth, S. África.

Euphorbia regis-jubae J. Gay, Tabaiba morisca. Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura (Islas Canarias), Marruecos occidental.

Euphorbia resinifera O. Berg., Marruecos.

Euphorbia segetalis L., Europa, N África, Macaronesia.

Euphorbia stenoclada Baill., Madagascar.

Euphorbia tirucalli L., De África tropical a Sudáfrica.

Euphorbia trigona Mill., O África tropical.

Euphorbia trigona Mill. 'Rubra', Origen hortícola.

Euphorbia xyllophylloides Brongn. ex Lem., Madagascar.

Euphorbia umbellata (Pax) Bruyns = *Synadenium grantii* Hook. f., Mozambique, Uganda, Zimbawe.

Euphorbia umbellata (Pax) Bruyns 'Rubra', Origen hortícola.

Jatropha integerrima Jacq., Peregrina. Cuba.

Jatropha multifida L., América central.

Jatropha podagrica Hook., Guatemala, Panamá.

Monadenium arborescens P.R.O. Bally, África central.

Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit Variegatus', Origen hortícola.

Ricinus communis L., Ricino. E, NE África y Europa.

Ricinus communis L. Sanguineus', Ricino rojo. Origen hortícola.

Fagaceae

Quercus coccifera L., Coscoja. Región mediterránea.

Quercus faginea Lam., Quejigo, Roble enciniego. N África, S Europa.

Quercus ilex L., Encina. Región mediterránea, De SO Francia a Portugal.

Quercus john-tuckeri Nixon & C.H. Müll., California (EEUU).

Quercus pringlei Seemen ex Loes. = *Q. filiformis* C.H. MÜll., California (EEUU).

Quercus robur L. = *Q. pedunculata* Hoffm., Roble. Europa, N África, O Asia.

Quercus rotundifolia Lam., Encina. S Península Ibérica, N.África.

Quercus suber L., Alcornoque. N África, S Europa.

Quercus x acutidens Torr., California (EEUU).

Fumariaceae

Platycapnos tenuiloba Pomel subsp. *parallela* Lidén, Sierras de Málaga, entre Ardales y el Burgo, Sierra de Alcaparaín.

Geraniaceae

Erodium chium (Burm. f.) Willd., África.

Erodium malacoides (L.) L'Hér., S Europa.

Erodium moschatum (L.) L'Hér., S, O Europa.

Geranium maderense Yeo, Madeira (Portugal).

Geranium purpureum Vill., Región mediterránea, Macaronesia.

Pelargonium graveolens L' Hér., Geranio de olor. S África.

Pelargonium laxum Steud, Sudáfrica.

Pelargonium mutans Voster = *P. grandiflorum* Willd. = *P. alchemilloides* (L.) Aiton Geranio de pensamiento. Natal (Sudáfrica).

Pelargonium peltatum (L.) L'Hér., Gitanilla. S África.

Pelargonium tomentosum Jacq., Sudáfrica.

Pelargonium zonale (L.) L'Hér. ex Aiton, Geranio. S África.

Gesneriaceae

Aeschynanthus speciosus Hook, Península Malaya, Borneo, Java.

Ginkgoaceae

Ginkgo biloba L., Árbol sagrado, Árbol de los cuarenta escudos.
China, Japón.

Goodeniaceae

Scaevola aemula R. Br., Australia.

Gunneraceae

Gunnera manicata Linden ex Delchev., Ruibarbo gigante. Brasil.

Haemodoraceae

Anigozanthos flavidus DC. = *A. coccineus* Paxton, Australia

Haloragaceae

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Sudamérica.

Hamamelidaceae

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv., China, Japón.

Loropetalum chinensis (R. Br.) Oliv. Fire Dance', Origen hortícola.

Helioconiaceae

Heliconia pseudoaemygdiana Emygdio & E. Santos, Brasil.

Hemionitidaceae

Cosentinia vellea (Aiton) Tod., Región macaronésica, región mediterránea.

Hyacinthaceae

Leopoldia comosa (L.) Parl. = *Muscari comosum* (L.) Mill., Región mediterránea.

Hydrangeaceae

Deutzia scabra Thunb., Celinda de espigas. China, Japón.

Philadelphus coronarius L., Celindo, Filadelfo. S Europa, SO Asia.

Hydrocharitaceae

Elodea canadensis Michx., EEUU.

Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine,
De México a Perú, Amazonas.

Vallisneria spiralis L., SE Asia, N África, S Europa.

Hypericaceae

Hypericum calycinum L., Hierba de San Juan. SE Bulgaria, N
Turquía.

Hypericum canariense L., Islas Canarias.

Hypericum hircinum L., Hierba de San Juan Región mediterránea.

Hypericum olympicum L., SE Europa.

ypericum patulum Thunb., China.

Hypoxidaceae

Molineria capitulata (Lou.) Herb. = *Curculigo capitulata* (Lour.)
Kuntze. Indochina.

Iridaceae

Aristea ecklonii Baker, C, S África.

Aristea ensifolia J.Muir, S África, Madagascar.

Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E.Br., Sudáfrica.

Crocus sp. L., N África, Asia, Europa.

Dietes bicolor Sweet & G. Don, Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Diets grandiflora N.E.Br., S África.

Fressia sp Klatt., África.

Iris x germanica L., Lirio azul. Europa meridional.

Iris japonica Thunb., Japón, China.

Iris pseudoacorus L., De Europa y N África a Siberia Occidental.

Iris xiphium L., S Europa, Región mediterránea.

Neomarica gracilis (Herb.) Sprague, Centroamérica

Juglandaceae

Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch, S EE UU.

Juglans regia L. = *J. sinensis* (A. DC.) Dode, Nogal. SE Europa, O, C Asia.

Juncaceae

Juncus acutus L., Junco silvestre. Región mediterránea.

Juncus maritimus Lam., C, W Europa, Región mediterránea, W Asia, N África.

Lamiaceae

Ajuga reptans L., C, E Asia.

Clerodendrum bungei Steud. = *C. foetidum* Bunge, China.

Lamium amplexicaule L., Europa.

Lavandula angustifolia Mill., Espliego. Región mediterránea.

Lavandula canariensis (L.) Mill., Matorrisco. Islas Canarias.

Lavandula dentata L., Lavanda. S y E España, Islas Baleares.

- Lavandula multifida* L., Lavanda. O Región mediterránea.
- Lavandula pinnata* L., Madeira (Portugal).
- Lavandula stoechas* L., Región mediterránea, Macaronesia.
- Lavandula x heterophylla* Viv., Europa.
- Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel., SO Europa.
- Leonotis leonurus* (L.) R.Br.= *Phlomis leonorus* L., S África.
- Marrubium vulgare* L., Euroasia, Región mediterránea, Macaronesia.
- Mentha aquatica* L., Euroasia, región mediterránea.
- Micromeria graeca* (L.) Benth.ex Rchb., Región mediterránea, C, S Portugal.
- Origanum vulgare* L., Orégano. Europa.
- Perovskia atriplicifolia* Benth., Salvia Rusa. Afganistán, Rusia.
- Phlomis fruticosa* L., Flomis, Oreja de liebre. Región mediterránea.
- Phlomis purpurea* L., Matagallo. Península Ibérica, N Marruecos.
- Plectranthus ecklonii* Benth., S África.
- Plectranthus madagascariensis* (Pers.) Benth. `Variegatus´, SE África, Madagascar.
- Plectranthus neochilus* Schltr., África Austral.
- Plectranthus parviflorus* Willd. = *P. australis* R. Br., Flor de Cockspur. Hawai, Polinesia francesa, Australia.
- Plectranthus socotranus* A.B. Sm., Menta de Socotra. Isla de Socotra (Yemen).
- Plectranthus verticillatus* (L.f.) Drude, Planta del dinero. S África, Mozambique.
- Rosmarinus officinalis* L., Romero. Región mediterránea.

Rosmarinus officinalis L. 'Postratus', Romero rastrero. Origen hortícola.

Rothea myricoides (Hochst.) Steane-Mabb. = *Clerodendrum ugandense* Prain, África.

Salvia canariensis L., Islas Canarias.

Salvia coccinea Buc'hoz ex Etl., Salvia roja S América.

Salvia coccinea Buc'hoz ex Etl. Coral Nymph', Origen hortícola.

Salvia elegans Vahl, Salvia. México, Guatemala.

Salvia farinacea Benth., Nuevo México, Texas.

Salvia involucrata Cav., México.

Salvia leucantha Cav., Salvia. México.

Salvia microphylla Kunth. = *S. grahamii* Benth., México.

Salvia splendens Sellow ex Schult., Salvia roja. S Brasil.

Salvia x sylvestris L. = *Salvia x superba* (Silva Tar. & C.K. Schneid.) Stapf, Salvia híbrida. Origen hortícola.

Sideritis reverchonii Willk., S de España.

Stachys ocymastrum (L.) Briq., SO Europa.

Tetradenia riparia (Hochst.) Codd = *Iboza riparia* (Hochst.) N.E.Br., S África.

Teucrium fruticans L., Región mediterránea occidental.

Teucrium lusitanicum Schreb., O, S Península Ibérica, NO África.

Teucrium pseudochamaepitys L., SO Europa.

Teucrium rotundifolium Schreb., E, S España, NW África (Marruecos).

Thymbra capitata (L.) Cav. = *Coridothymus capitatus* (L.) Rchb.f., Tomillo blanco, Carrasqueño. España.

Thymus mastichina (L.) L., Mejorana, Tomillo blanco. Península Ibérica, N África.

Thymus vulgaris L., Tomillo. O región mediterránea.

Vitex agnus-castus L., Sauzgatillo. De Región mediterránea a C Asia.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce = *W. rosmariniformis* Sm., Romero australiano. Nueva Gales del Sur (Australia).

Lauraceae

Apollonias barbujana (Cav.) Bornm., Barbusano. Madeira, Porto Santo, Islas Canarias.

Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, China, Taiwan, Japón.

Laurus azorica (Seub.) Franco. Macaronesia.

Laurus nobilis L., Región mediterránea.

Ocotea foetens (Aiton) Baill., Til. Islas Canarias occidentales.

Persea americana Mill. = *P. gratissima* C. F. Gaertn. f., Aguacate. C América.

Persea americana Mill. Hass Nachan', Aguacate Hass Nachan. Origen hortícola.

Persea americana Mill. Fuerte Nachan', Aguacate Fuerte Nachan. Origen hortícola.

Persea indica (L.) Spreng., Viñatigo. Islas Canarias occidentales.

Leguminosae

Acacia dealbata Link, Mimosa plateada. Nueva Gales del Sur, Victoria, Tasmania (Australia).

Acacia karroo Hayne, Sudáfrica.

Acacia retinodes Schldtl. = *A. retinoides* Schltr., Mimosa siempre en flor, Mimosa de las cuatro estaciones. S y SE Australia.

Acacia saligna (Labill.) Wendl. = *A. cyanophylla* Lindl., Mimosa de hojas azuladas. O Australia

Adenocarpus telonensis (Loisel) DC., S Francia, España, Portugal, N África.

Albizia julibrissin Durazz. = *Acacia julibrissin* (Durazz.) Willd. = *Mimosa japonica* Thunb., De Irán a Japón.

Amorpha californica Torr. & A.Gray, C, S California (EEUU).

Anagyris foetida L., Región mediterránea.

Anthyllis cytisoides L., Albaida. Región mediterránea.

Anthyllis tejedensis Boiss subsp. *plumosa* (E. Domínguez) Benedí, Sur de la Península Ibérica (Sierra de Cómpea, En medio, Tejada y Almirajara). Gr y Ma.

Astragalus echinatus Murray, S Europa, Turquía, NO África.

Astragalus hamosus L., Región mediterránea, Macaronesia.

Bauhinia tomentosa L., De India a China, África tropical.

Bauhinia variegata L., Árbol de las orquídeas. Himalaya, China.

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. = *Psoralea bituminosa* L., S Europa, N África, SO Asia.

Bolusanthus speciosus (Bolus) Harms, S África.

Caesalpinia gilliesii (Hook.) D. Dietr., Pájaro del Paraíso. Argentina, Uruguay.

Calliandra haematocephala Hassk. = *C. inaequilatera* Rusby, Bolivia.

Cassia corymbosa L., N Argentina, Uruguay, S Brasil.

Ceratonía siliqua L., Región mediterránea.

Cercis siliquastrum L., Región mediterránea.

Colvillea racemosa Bojer, Madagascar.

Coronilla valentina subsp. *glauca* (L.) Batt., = *C. glauca*, Coronilla.
Región mediterránea.

Coronilla juncea L., S Europa, NO África.

Cytisus racemosus Hort. Cf. Marcock, Europa, Oriente medio, N
África.

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC., O, S Península Ibérica, NO
Marruecos.

Cytisus proliferus L.f. = *Chamaecytisus proliferus* (L. f.) Link,
Escobón. Islas Canarias.

Cytisus scoparius (L.) Link. = *Sarothamnus scoparius* (L.) W.D.J.
Koch, Retama negra. O, SE y C Europa, Macaronesia.

Delonix decaryi (R. Vig.) Capuron = *Poinciana decaryi* R. Vig., S,
SO Madagascar.

Delonix elata (L.) Gamble = *Poinciana elata* L., Etiopía a Egipto,
Arabia e India.

Delonix floribunda (Baill.) Capuron, Madagascar.

Delonix pumila Du Puy, Phillipson & R. Rabev, Madagascar.

Delonix regia (Hook) Raf., Madagascar.

Dorycnium pentaphyllum Scop., Región mediterránea occidental.

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb., De México hasta Brasil.

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morog., S América.

Erophaca baetica (L.) Boiss. = *Astragalus lusitanicus* Lam., S
Península Ibérica, NO África.

Erythrina caffra Thunb., Árbol del coral. E y S África.

***Erythrina crista-galli* L., Cresta de gallo, Ceibo. Paraguay, N Argentina, S Brasil, Uruguay.**

***Genista haenseleri* Boiss., S Península Ibérica (Serranía de Ronda. Málaga).**

***Genista lydia* Boiss., Europa.**

***Genista spartioides* Spach subsp. *retamoides* (Spach ex Cosson) Rivas-Mart. & Cantó, Retama basta. Europa, Oriente medio, N África.**

***Genista ternera* (Murray) Kuntze, Madeira (Portugal).**

***Genista umbellata* (L`Hér) Poir. subsp. *equisetiformis* (Spach) Rivas Goday & Rivas Mart. = *Spartium umbellatum* L`Hér., Bolina. S Península Ibérica.**

***Genista monspessulana* (L.) L.A.S.Johnson = *Teline monspessulana* (L.) K. Koch., SO Península Ibérica, NO Marruecos.**

***Gleditsia triacanthos* L. = *Gleditsia triacanthos* f. *inermis* Willd., Acacia negra sin espinas. E EEUU.**

***Hardenbergia comptoniana* (Andrews) Benth. = *Glycine comptoniana* Andrews, Australia.**

***Hardenbergia violacea* (Schneev.) Stearn = *Glycine violacea* Schneev., Australia.**

***Hedysarum glomeratum* F. Dietr., Región mediterránea.**

***Hippocrepis biflora* Spreng., Región mediterránea.**

***Hippocrepis ciliata* Wild, Región mediterránea.**

***Inga edulis* Mart., Brasil**

***Lathyrus clymenum* L., S Europa, Asia menor, N África, Macaronesia.**

***Lathyrus tingitanus* L., Península Ibérica, S Francia, Cerdeña, NO África, Macaronesia.**

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit = *L. glauca* Benth., América Tropical, Florida Tejas (EE UU).

Lotus berthelotii Masf., Islas Canarias (España).

Lotus creticus L., Región mediterránea, Macaronesia.

Lotus edulis L., S Europa, SO Asia, N África.

Lotus maculatus Breidf., Islas Canarias (España).

Lotus ornithopodioides L., S, E Europa, N África, SO Asia.

Medicago arborea L, SE Europa, Asia menor.

Medicago orbicularis (L.) Bartal., Región mediterránea, Macaronesia, O Asia.

Medicago polymorpha L., Europa, Región mediterránea, Macaronesia, SO Asia.

Medicago rigidula (L.) All., S Europa, N África, SO Asia.

Melilotus albus Medik., Europa, Asia, N África.

Melilotus elegans Salzm. ex Ser. in DC., Región mediterránea, Macaronesia, Etiopia.

Melilotus indicus (L.) All., Europa, SO y C Asia, N África.

Melilotus sulcatus Desf., Región mediterránea, Macaronesia.

Ononis natrix L., Europa, N África, Macaronesia.

Ononis speciosa Lag., Gatuña. S España, NO África.

Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C.Nielsen = *Albizia lophantha* (Willd.) Benth., Albizia pluma. SO Australia.

Parkinsonia aculeata L., Espino de Jerusalén. Desde México hasta S Suramérica.

Peltophorum dubium (Urb.) Barneby var. *berteroarum* = *P. berteroarum* Urb., Abey. República Dominicana.

Retama monosperma (L.) Boiss. = *R. rhodorhizoides* Webb et Berthel., Retama blanca. Región mediterránea.

Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., Retama. Península Ibérica, NO África.

Robinia pseudoacacia L., Falsa acacia. E EE UU.

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake, Gallinazo. De México a Brasil.

Schotia afra (L.) Thunb., Provincia del Cabo (Sudáfrica), Namibia.

Schotia brachypetala Sond., Rhodesia, Mozambique, NE, S África.

Schotia latifolia Jacq., S África.

Scorpiurus vermiculatus L., O Región mediterránea, Macaronesia.

Senna didymobotria (Fresen.) H.S.Irwin & Barneby = *Cassia didymobotria* Fresen., Casia. África Tropical.

Spartium junceum L., Retama de olor, Gayomba. Región mediterránea, Macaronesia.

Styphnolobium japonicum (L.) Schott = *Sophora japonica* L., Sófora. China, Corea.

Teline canariensis (L.) Webb & Berthel., Tenerife, Gran Canaria (Islas Canarias).

Teline maderensis Webb & Berthel., Madeira (Portugal).

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze, Palo rosa. De S Brasil a Bolivia.

Trifolium angustifolium L., Región mediterránea, Macaronesia.

Trifolium campestre Schreb., SO Asia, NO África, Europa.

Trifolium tomentosum L., Región mediterránea.

Tripodion tetraphyllum (L.) Furr. = *Anthyllis tetraphylla* L. f., Región mediterránea.

Vicia sativa L., Península Ibérica, Baleares.

Vigna caracalla (L.) Verdc. = *Phaseolus caracalla* L., Caracolillo.
De C América a Sudamérica.

Wisteria sinensis (Sims) Sweet = *W. chinensis* DC., Glicinia. China.

Lemnaceae

Lemna minor L., Lenteja de agua. Cosmopolita.

Lentibulariaceae

Pinguicula agnata Casper, México.

Lentibulariaceae

Pinguicula dertosensis (Cañig.) Mateo & M-B. Crespo, E Península
Ibérica.

Pinguicula esseriana B. Kirchn., México.

Pinguicula laeana Speta & F. Fuchs., México.

Pinguicula sp. L.

Utricularia bisquamata Schrank., S África.

Utricularia calycifida Benj., N Sudamérica.

Utricularia chrysantha R. Br., O Australia.

Utricularia firmula Welw. ex Oliv., África tropical.

Utricularia intermedia Hayne., Europa.

Utricularia lateriflora R. Br., Australia.

Utricularia livida E. Mey., Trópico, S África.

Utricularia parthenopipes P. Taylor., Brasil.

Utricularia praelonga A.St.-Hil. & Girard., Sudamérica.

Utricularia sandersonii Oliv., África tropical.

Utricularia tricolor A. St.-Hil., S América.

Utricularia vulgaris L., Europa, Asia, América Boreal.

Utricularia prehensilis E. Mey., S África.

Liliaceae

Drimia maritima (L.) Stearn = *Urginea maritima* (L.) Baker, Región mediterránea.

Linaceae

Linum strictum L., De Europa, Región mediterránea a Afganistán.

Reinwardtia indica Dumort. = *R. trigyna* Planch., S Asia.

Lythraceae

Cuphea hyssopifolia HBK, Cufea. México, Guatemala.

Cuphea ignea A. DC., Cigarrillo. México, Jamaica.

Lagerstroemia indica L. = *L. elegans* Wall. ex Paxton, Árbol de Júpiter. China.

Punica granatum L., Granado. Región irano-turania.

Punica granatum L. 'Motrileño', Granado motrileño. Origen hortícola.

Magnoliaceae

Magnolia grandiflora L., zona costera del SE EE UU.

Malvaceae

Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin,
Abutilón. Brasil.

Abutilon pictum (Gillies ex Hook.) Walp., Abutilón. Brasil,
naturalizado en C y S América.

Abutilon x hybridum 'Canary Bird', Origen hortícola.

Abutilon x hybridum 'Orange King', Origen hortícola.

Adansonia digitata L., África central.

Adansonia grandidieri Baill., Madagascar.

Adansonia gregorii F. Muell. = *A. gibbosa* (A. Cunn.) Guymer ex
D.A. Baum, N, NE Australia.

Adansonia madagascariensis Baill. = *A. bernieri* Baillon. ex Poiss.,
NO, M Madagascar.

Adansonia perrieri Capuron, N Madagascar.

Adansonia suarezensis H. Perrier, Madagascar.

Adansonia za Baill., Baobab. Madagascar.

Adansonia fony (Jum. & H.Perrier) H.Perrier var. *rubrostipa* = *A.*
rubrostipa Jum. & H.Perrier, Madagascar.

Alyogyne huegelii (Endl.) Fryxell, SO Australia.

Alyogyne hakeifolia (Giord.) Alef., S Australia.

Alyogyne hakeifolia (Giord.) Alef. 'Melissa Anne', Origen hortícola.

Anisodonteia capensis (L.) D.M.Bates, Sudáfrica.

Brachychiton acerifolius (A. Cunn. ex G. Don) F. Muell. = *Sterculia*
acerifolia A. Cunn., Árbol de las llamas. De Queensland a Nueva
Gales del Sur (Australia).

Brachychiton bidwillii Hook., Australia.

Brachychiton discolor F. Muell. = *B. luridus* C. Moore ex F. Muell.,
Árbol sombrero. De Queensland a Nueva Gales del Sur.

Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R. Br., Queensland,
Nueva Gales Del Sur, Victoria (Australia).

Brachychiton rupestris (T.Mitch. ex Lindl.) K.Schum = *Sterculia*
rupestris (T.Mitch. ex Lindl.) Benth., Queensland (Australia).

Brachychiton* × *incarnatus Guyer, Australia.

Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir = *Chorisia insignis*
Kunth, Palo borracho amarillo, Barrilito, Yuchán, Árbol botella.
Perú.

Ceiba pentandra (L.) Gaertn., América tropical, África.

Ceiba pubiflora (A.St.-Hil.) K.Schum., Barrigudo, Árbol botella.
Sudamérica.

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna = *Chorisia speciosa* A. St.-Hil.,
Palo borracho rosado, Somohú, Árbol de los pájaros. Brasil,
Argentina.

Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. = *D. mastersii* Hook. f., S, E
África.

Dombeya natalensis Sond. = *D. tiliacea* (Endl.) Planch., S África.

Dombeya x cayeuxii André, Árbol de las hortensias. Origen
hortícola.

Firmiana simplex (L.) W. Wight = *F. platanifolia* (L. f.) Marsili =
Sterculia platanifolia L. f., Parasol de China. De Islas Ryu Kyu
(Japón) a Vietnam.

Guazuma ulmifolia Lam., Guácima. América Tropical.

Hibiscus acetosella Welw. Ex Hiern, De EEUU a Paraguay.

Hibiscus arnottianus A. Gray, Hawaii (EE UU).

Hibiscus integrifolius (Chapm.) Small, *H. coccineus* var. *integrifolius* Chapm., Florida, Georgia (EE UU).

Hibiscus elatus Sw., Jamaica y Cuba.

Hibiscus heterophyllus Vent., Nueva Gales del Sur, Queensland (Australia).

Hibiscus moscheutos L. *H. palustris* L., Algodón silvestre. S EE UU.

Hibiscus mutabilis L., China.

Hibiscus rosa-sinensis L., Asia Tropical, China.

Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook. f., Cayena péndula. Tropical, E África.

Hibiscus syriacus L., Altea, Rosa de Siria. Zona tropical de Europa, subtropical de Europa, Asia y África.

Hibiscus tiliaceus L., India.

Lagunaria patersonia (Andrews) G. Don, Lagunaria. Islas de Lord Howe, Isla de Norkfolk (Australia).

Malva multiflora (Cav.) Soldado, Banfi & Galasso = *Lavatera cretica* L., SO Europa, N África, SO Asia.

Malva sylvestre L., Europa, N África, SO Asia.

Malvaviscus penduliflorus Moc. & Sessé ex DC, Malvavisco. México.

Pachira aquatica Aubl., De C a N de S America.

Pavonia intermedia A. St.-Hil., Brasil.

Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand, América Tropical (México y Guatemala).

Marantaceae

Calathea lancifolia Boom = *C. insignis* Petersen, Brasil.

Thalia dealbata Fraser, SE EE UU.

Thalia geniculata L., S América.

Ctenanthe oppenheimiana (E. Morren) K. Schum. = *Calathea oppenheimiana* E. Morren , Maranthaceae. E Brasil.

Ctenanthe setosa (Roscoe) Eichler, SE Brasil.

Marsileaceae

Marsilea batardae Launer, Península Ibérica.

Marsilea strigosa Willd., Región mediterránea.

Meliaceae

Azadirachta indica A. Juss., Myanmar.

Melia azedarach L., Melio. India, De China a Australia.

Melanthaceae

Melianthus pectinatus Harv., S África.

Menispermaceae

Cocculus laurifolius DC., Cóculo. De India e Himalaya a China y Japón, Islas de Java (Indonesia).

Menyanthaceae

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, Euroasia.

Moraceae

Artocarpus heterophyllus Lam. Black Gold', Origen hortícola.

Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. = *Morus papyrifera* L.,
China, Japón, Corea, Polinesia.

Ficus benjamina L. = *F. nitida* Thunb., Ficus. India, S China, SE
Asia, N Australia.

Ficus binnendijkii Miq., De SE Asia a Filipinas.

Ficus carica L., S Península Ibérica.

Ficus carica L. Cuello paloma', Higuera cuello paloma. Origen
hortícola.

Ficus cyathistipula Warb., África Tropical.

Ficus deltoidea Jack, Malasia.

Ficus druceana Thunb. = *F. mysorensis* Roth ex Roem. & Schult,
Asia

Ficus elastica Roxb. ex Hornem, Ficus, Higuera del caucho. De
Himalaya a Península de Malaca, Sumatra e Isla De Java (Indonesia).

Ficus elastica Roxb. ex Hornem 'Decora', Origen hortícola.

Ficus natalensis subsp. *leprieurii* (Miq.) C.C.Berg = *F. leprieurii*
Miq., África Tropical.

Ficus lyrata Warb., África Tropical.

Ficus macrophylla Desf ex Pers. = *F. magnolioides* Borzí, Ficus
hoja de magnolio. Australia.

Ficus microcarpa L. f., India, Sri Lanka y China, de SE Asia a E
Australia.

Ficus pumila L. = *F. stipulata* Thunb. = *F. scandens* Lam., Higuera
trepadora, Ficus tapizante. De N Vietnam a China, Isla de Formosa
(Taiwan), Japón, e Islas Ryu Kyu (Japón).

Ficus pumila L. 'Variegata', Origen hortícola.

Ficus religiosa L., Higueras de las pagodas. De India a SE Asia.

Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. = *F. australis* Willd., Higo oxidado.
E Australia.

Ficus sycomorus L., Sicomoro. S África.

Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid., De Arkansas a Texas
(EEUU).

Morus alba L., Morera. C y E China.

Morus nigra L., Morera negra. O Asia.

Morus nigra L. Pendula', Morera llorona. Origen hortícola.

Moringaceae

Moringa borziana Mattei, África tropical.

Moringa oleifera Lam., NO India.

Moringa ovalifolia Dinter & A. Berger, Namibia Central, SO
Angola.

Moringa peregrina (Forssk.) Fiori, E África.

Moringa rivae Chiov. subsp. *longisiliqua* Verdc., Kenia, SE Etiopía.

Musaceae

Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman 'Maurelii', Plátano etíope,
plátano rojo. Origen hortícola.

Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman, Plátano etíope, plátano rojo.
Etiopía.

Musa acuminata Colla = *M. cavendishii* Lamb., Platanera. SE Asia,
De Tailandia a N Australia.

Musa velutina H. Wendl & Drude, Regiones tropicales se Asia.

Myricaceae

Myrica faya Aiton, Faya. Macaronesia.

Myrtaceae.

Acca sellowiana (O. Berg.) Burret = *Feijoa sellowiana* (O. Berg)
O. Berg , Paraguay, N Argentina, S Brasil, Uruguay.

Callistemon rigidus R. Br., Limpiatubos. Nueva Gales del Sur
(Australia).

Callistemon viminalis (Sol ex Gaertn.) G. Don, Limpiatubos. Nueva
Gales Del Sur, Queensland (Australia).

Chamelaucium uncinatum Schauer, SO Australia.

Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson., Eucalipto
limón. E Australia.

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. , Australia.

Eucalyptus deglupta Blume, Eucaliptus arcoíris. Indonesia,
Mindanao (Filipinas).

Eucalyptus globulus Labill., Eucaliptus común, eucalipto de
Tasmania. SE Australia.

Eugenia uniflora L., = *E. myrtifolia* Salisb., Pitanga. América del
Sur tropical.

Leptospermum scoparium J.R. Forst. & G. Forst., Australia, Nueva
Zelanda.

Melaleuca acuminata F.J. Muell, De Nueva Gales del Sur a O
Australia.

Melaleuca armillaris (Sol. ex Gaertn.) Sm., SE Australia.

Melaleuca sp. L., Australia.

Melaleuca styphelioides Sm., Nueva Gales del Sur (Australia).

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn., Árbol de navidad. Nueva Zelanda.

Myrtus communis L., Mirto, Arrayán. S Europa, NO África, Asia Menor, Oriente próximo.

Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine = *P. littorale* Raddi, Guayabo rosa. Brasil.

Psidium guajava L., Guayabo. América Tropical.

Psidium guayava L. 'Guayabito limón', Guayabito limón. Origen hortícola.

Psidium guayava L. 'Guayabito rojo', Guayabito rojo. Origen hortícola.

Psidium guayava L. 'Guayabo rojo, Guayabo rojo. Origen hortícola.

Syzygium jambos (L.) Alston, Pomarroja. Asia tropical, África.

Nelumbonaceae

Nelumbo nucifera Gaertn. = *N. speciosa* Willd., Flor de loto. Egipto, India, China, Japón, Filipinas.

Nelumbo nucifera Gaertn. var. *rosea*, Loto rosa. China, Japón.

Nelumbo nucifera Gaertn. 'Heilongjiang Lian', Loto. Origen hortícola.

Nelumbo nucifera Gaertn. 'Xiangshan Lian', Loto. Origen hortícola.

Nepenthaceae

Nepenthes L. 'Miranda', Origen hortícola.

Nepenthes 'Bloody Mary', Origen hortícola.

Nepenthes 'Alata' Blanco, tropical.

Nepenthes rafflesiana Jack, Malasia.

Nepenthes sanguinea Lindl., Malasia.

Nyctaginaceae

Bougainvillea glabra Choisy, Brasil.

Bougainvillea spectabilis Willd., Buganvilla. Brasil.

Bougainvillea x buttiana Holttum & Standl., Origen hortícola.

Mirabilis jalapa L., Don Diego de noche, Don Pedro. América Tropical.

Nymphaeaceae

Euryale ferox Salisb., Nenúfar gigante. De india a Japón.

Nuphar lutea (L.) Sm., Europa, N África y N Asia.

Nymphaea Lat.-Marl. `Attraction´, Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea Dreer `James Brydon´, Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea Perry D. Slocum `King of Blues´, Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea Lat.-Marl. `Madama Wilfron Gonner´, Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea Perry D. Slocum `Yellow Sensation´, Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea x marliacea Lat.-Marl. `Albida´, Nenúfar. Origen hortícola.

Numphaea sp. L. Mayla', Origen hortícola.

Numphaea sp. L. Murasaki Shikibu', Origen hortícola.

Numphaea sp. L. Wanbisia', Origen hortícola.

Numphaea sp. L. Perry's Pink', Origen hortícola.

Numphaea sp. L. Black Princess', Origen hortícola.

Numphaea sp. L. Daubenyana', Origen hortícola.

Victoria cruziana A.D. Orb., Victoria. Argentina, Brasil, Paraguay

Oleaceae

Forsythia x intermedia Zabel, Campanita china. Origen hortícola.

Fraxinus americana L., De Florida a Tejas (E EE UU).

Fraxinus angustifolia Vahl = *F. rotundifolia* Mill., S Europa, So Asia.

Fraxinus excelsior L., Europa, Asia menor.

Fraxinus griffithii C. B. Clarke = *F. formosana* Hayata, De China y Birmania a Filipinas, Archipiélago Malayo.

Fraxinus ornus L., Europa, O Asia.

Jasminum azoricum L., Jasmín de las azores. Azores (Portugal).

Jasminum humile L., Jasmín italiano. De Afganistan a SO China.

Jasminun multipartitum Hochst, Sudáfrica.

Jasminum odoratissimum L., África tropical, Islas Canarias, Madeira.

Jasminum officinale L., Jasmín común, Jazmin real. Himalaya, SO China.

Jasminum polyanthum Franch., Jasmín de invierno, Jasmín de china. Yunnan (SO China).

Jasminum sambac (L.) Ait., Jasmín de Arabia. S Asia.

Jasminum simplicifolium G. Forst., Jasmín mandarino. Australia, Islas del Pacífico.

Ligustrum japonicum Thunb., Aligustre. Hong Kong (China), Japón, Corea.

Ligustrum japonicum Thunb. 'Variegatum', Aligustre matizado. Origen hortícola.

Ligustrum ovalifolium Hassk., Japón.

Olea europaea L., Olivo. Región mediterránea.

Olea europaea L. subsp. *sylvestris* (Mill.) Rouy ex hegi, Acebuche. Región mediterránea.

Olea europaea L. subsp. *cuspidata* (Wall. & G.Don) Cif., De África a India.

Olea europaea L. subsp. *guanchica* P.Vargas et al. = *O. cerasiformis* Rivas Mart. & del Arco, Acebuche. Islas Canarias, Madeira.

Olea exasperata Jacq., Provincia del cabo (Sudáfrica).

Olea paniculata R. Br., E Australia, SE Asia

Phillyrea angustifolia L., Labiérnago, Ladierna. Región mediterránea occidental.

Phillyrea latifolia L., Labiernago negro. Región mediterránea.

Picconia excelsa (Aiton) DC., Palo Blanco. Islas Canarias occidentales.

Syringa oblata Lindl., China, Corea.

Syringa villosa Vahl, Lilo tardío. China.

Syringa villosa subsp. *wolfii* (C.K.Schneid.) Jin Y.Chen & D.Y.Hong = *S. wolfii* C.K. Schneid, China, Corea.

Oleandraceae

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott, Tropical, Subtropical.

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl, Pantropical.

Nephrolepis exaltata (L.) Schott, Helecho. América Tropical, África, Polinesia.

Onagraceae

Fuchsia x hybrida Hort. ex Siebold & Voss, Origen hortícola.

Gaura lindheimeri Engelm. & A. Gray, México.

Oenothera speciosa Nutt., SE EEUU, México.

Orchidaceae

Angraecum sesquipedale Thouars, Madagascar.

Aspasia lunata Lindl., Brasil.

Brassia sp. R. Br., C. América, S América tropical.

Brassia wagneri Rchb. f., Américatropical.

Bulbophyllum medusae (Lindl.) Rchb.f. = *Cirrhopetalum medusae* Lindl., Malasia, Indonesia, Borneo, Filipinas.

Cattleya alaorii (Brieger & Bicalho) Van der Berg = *Laelia alaorii* Brieger & Bicalho, Brasil.

Cattleya amethystoglossa Linden & Rchb. f. ex R. Warner, Brasil.

Cattleya aurantiaca (Bateman ex Lindl.) P.N. Don, México. C América.

Cattleya bowringiana O'brien, C América.

Cattleya fidelensis (Pabst) Van der Berg = *Laelia fidelensis* Pabst, Río de Janeiro (Brasil).

Cattleya forbesii Lindl., Brasil.

Cattleya grandis (Lindl.) A.A. Chadwick = *Laelia grandis* Lindl., Brasil.

Cattleya intermedia Graham ex Hook., Brasil, Perú.

Cattleya jenmanii Rolfe, Guayana.

Cattleya labiata Lindl., Brasil.

Cattleya lawrenceana Rchb. f., Venezuela, Guayana.

Cattleya lobata Lindl. = *Laelia lobata* (Lindl.) A.H. Kent, Brasil.

Cattleya maxima Lindl., Colombia, Ecuador, Perú.

Cattleya porphyroglossa Linden & Rchb. f, Brasil.

Cattleya purpurata (Lindl. & Paxton) Van den Berg = *Laelia purpurata* Lindl. & Paxton, Brasil.

Cattleya schroederae (Rchb. f.) Sander, Nueva Granada, Colombia.

Cattleya tenebrosa (Rolfe) A.A. Chadwick = *Laelia grandis* var. *tenebrosa* Rolfe, Brasil.

Cattleya tigrina A. Rich. = *C. leopoldii* Verschaff. ex Lem., Brasil.

Cattleya trianae Linden & Rchb.f., Colombia.

Cattleya walkeriana Gardner, Brasil.

Chysis bractescens Lindl. = *Chysis aurea* var. *bractescens* (Lindl.) P.H. Allen, México, Guatemala, Belice.

Coelogyne cristata Lindl., E Himalaya.

Comparettia macroplectron Rchb. f. & Triana, Colombia.

Cymbidium sp. Sw.

Dendrobium aphyllum (Roxb.) C.E.C.Fisch. = *D. pierardii* Roxb., Himalaya, Burna, China.

Dendrobium delicatum (F. M. Bailey) F. M. Bailey, E Australia

Dendrobium loddigesii Rolfe, Laos, Vietnam, S China.

Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw. = *D. cupreum* var. *cupreum* (Lindl.) Rchb. f., Himalayas e Indonesia.

Epidendrum ferrugineum Ruiz & Pav., Perú.

Epidendrum parkinsonianum Hook., C América.

Epidendrum pseudepidendrum Rchb. f., Desde Florida a N Argentina.

Epidendrum radicans Pav. ex Lindl., C América, N Sudamérica, O India.

Epidendrum sp. L.,

Gomesa bifolia (Sims) M.W.Chase & N.H.Williams = *Oncidium bifolium* Sims, Uruguay.

Gomesa crispa (Lindl.) Klotzsch. & Rchb. f., Brasil.

Gomesa varicosa (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams = *Oncidium varicosum* Lindl., Brasil.

Guarianthe skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins = *C. skinneri* Bateman, C América.

Masdevallia chasei Luer, Costa Rica.

Masdevallia floribunda Lindl., México a C América.

Masdevallia herradurae F. Lehm. & Kraenzl., Colombia.

Maxillaria nigrescens Lindl., Venezuela.

Miltonia moreliana A. Rich. = *M. spectabilis* var. *moreliana* (A. Rich.) Henfr., Brasil.

Ophrys fusca Link., Abejera. Región mediterránea occidental.

Paphiopedilum gratixianum Rolfe, Laos, Vietnam.

Paphiopedilum insigne (Wall. ex Lindl.) Pfitzer, E Himalaya.

Paphiopedilum venustum (Wall. ex Sims) Pfitzer, Himalaya.

Paphiopedilum sp. Pfitzer, SE Asia Tropical.

Phalaenopsis sp. Blume,

Vanda Jones ex R. Br. Blue magic', Origen hortícola.

Vanda Jones ex R. Br. Cerise purple', Origen hortícola.

Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews, México.

Vanilla sp. Mill.,

Orobanchaceae

Orobanche gracilis Sm., S, C, E Europa.

Oxalidaceae

Averrhoa carambola L., Carambola. Malasia.

Averrhoa carambola L. B-10', Carambola B-10. Origen hortícola.

Averrhoa carambola L. Fwang Tung', Carambola Fwang Tung.
Origen hortícola.

Oxalis corniculata L., S Europa.

Oxalis pes-caprae L., Región mediterránea, O Europa.

Oxalis debilis Kunth var. *corymbosa* (DC.) Lourteig = *Oxalis corymbosa* DC., S América.

Pandanaceae

Pandanus utilis Bory, Madagascar.

Papaveraceae

Eschscholzia californica Cham., California (EEUU).

Fumaria officinalis L., Europa, de Región mediterránea a Irak.

Fumaria parviflora Lam., S, C Europa.

Glaucium flavum Crantz, Adormidera marina. Región mediterránea, atlántica, macaronesica.

Papaver dubium L., Europa, Asia, N África, Macaronesia.

Papaver hybridum L., Europa, SO Asia, N África, Macaronesia.

Papaver rhoeas L., Europa, Asia, N África, Macaronesia.

Romneya coulteri Harv., Romneya. S California, N de Baja California (EEUU).

Sarcocapnos crassifolia DC., Zapatitos de la Virgen. Mauritania.

Passifloraceae

Passiflora caerulea L., Pasionaria. De Brasil a Argentina.

Passiflora edulis Sims, Maracuyá. Brasil.

Paulowniaceae

Paulownia tomentosa Steud., Paulonia. China.

Phormiaceae

Phormium tenax J.R. Forst & G. Forst, Formio, Lino de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda.

Phormium tenax J. R. Forst. & G. Forst. `Nana´, Formio. Origen hortícola.

Phormium tenax J.R. Forst & G. Forst cv. Jack spratt, Australia.

Phytolaccaceae

Phytolacca dioica L., Ombú. Argentina, Uruguay, Brasil, Perú.

Pinaceae

Abies pinsapo Boiss. = *A. hispanica* Chambray, Abeto español, Pinsapo. España, N África.

Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière = *C. africana* Gordon ex Knight, Cedro del Atlas. Argelia y Marruecos.

Cedrus deodara (Roxb ex D. Don) G. Don = *C. Indica* Chambray, Cedro del Himalaya. Himalaya.

Cedrus libani A. Rich. = *C. libanotica* Link, Cedro del Líbano. Asia Menor.

Picea pungens Engelm. Glauca globosa', Origen hortícola.

Pinus canariensis C. Sm., Pino canario. Islas Canarias occidentales

Pinus halepensis Mill., Pino carrasco, Pino de Alepo. Región mediterránea.

Pinus pinaster Aiton, Pino marítimo. Región mediterránea.

Pinus pinea L. = *P. maderensis* Ten., Pino piñonero. S Europa, O Asia.

Pistiaceae

Pistia stratiotes L., Pantropical.

Pittosporaceae

Hymenosporum flavum F.Muell., Plumaria australiana. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Pittosporum bicolor Hook., Pitosporo. E Australia.

Pittosporum tenuifolium Banks & Sol. ex Gaertn., Nueva Zelanda.

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, Pitosporo, Azahar de China. China, Japón, Corea.

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton `Nana´, Azahar de China. Origen hortícola.

Pittosporum undulatum Vent., Pitosporo. E Australia.

Plantaginaceae

Gambelia speciosa Nutt. = *Galvezia speciosa* (Nutt.) A. Gray, Boca de dragón. California (EEUU).

Russelia equisetiformis Schlttdl. & Cham. = *R. juncea* Zucc., Lagrimas de amor, Planta del coral. México.

Plantaginaceae

Plantago afra L., S Europa.

Plantago albicans L., Región mediterránea.

Plantago arborescens Poir. subsp. *maderensis* (Dcne.) Hansen et Kunkel, Madeira (Portugal).

Plantago coronopus L., Europa, Macaronesia, SO Asia, N África.

Plantago lagopus L., S Europa.

Platanaceae

Platanus orientalis L. var. *acerifolia* Dryand. = *P. acerifolia* (Dryand.) Willd., Plátano de sombra. Mediterráneo oriental.

Plumbaginaceae

Armeria hirta Willd., Región mediterránea.

Armeria malacitana Nieto Fel., Sierras de Nmalaga, Mijas, Ojen (Málaga), Sierras de Grazalema y Blanca (Cádiz)

Armeria villosa Girard subsp. *carratracensis* (Bernis) Nieto Fel., Málaga (Sierra de Aguas, Próximo a Álora y Sierra Parada, Tolox).

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss., Región mediterránea.

Limonium insigne Kuntze, Siempreviva morada. SE Península Ibérica.

Limonium malacitanum B. Díez, Litoral Andaluz (Málaga y Granada. (S España)).

Limonium preauxii Kuntze, Gran Canaria (Islas Canarias).

Limonium silvestrei Aparicio, Vega sur del Guadalquivir (Sevilla).

Limonium sinuatum (L.) Mill., Región mediterránea.

Limonium tuberculatum (Boiss.) Kuntze, África occidental, isla de Lobos (Furteventura).

Plumbago auriculata Lam. = *P. capensis* Thunb., Jazmín azul, Celestina. S África.

Poaceae

Aegilops geniculata Roth, S Europa.

Ammophila arenaria (L.) Link subsp. *arundinacea* H. Lindb. f., Costas Mediterráneas y atlántica (desde Francia a Marruecos).

Aristida adscensionis L., EE UU.

Arundina graminifolia (D. Don) Hochr., Malasia.

Arundo donax L., Cañavera, Región mediterránea.

Avena sterilis L., S Europa.

Bambusa textilis McClure, S China.

Bambusa tuldoides Munro = *B. ventricosa* McClure, China.

Bambusa ventricosa McClure, China.

Bambusa vulgaris Schrad., Bambú común. Tropical.

Briza maxima L., S Europa.

Briza sp L.,

Bromus rigidus Roth = *B. matritensis* Cav., Región mediterránea.

Bromus rubens L., SO Europa, N África, SO Asia, Macaronesia.

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. = *Desmazeria rigida* (L.)
Tutin, S, O Europa.

Chimonobambusa quadrangularis (Fenzi) Makino 'Tatejima',
Origen hortícola.

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.) Asch. & Graebn. =
Gynerium argenteum Ness., S América.

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, Lemongrass'. Ceilan, Malasia.

Cymbopogon nardus (L.) Rendle, Citronela. Ceilan, Malabar.

Cynodon dactylon (L.) Pers., Hierba de las Bermudas. Región
templada Hemisferio Sur.

Dactylis glomerata L., Caracolillo. N América, S África.

Festuca arundinacea Schreb., Europa, N África.

Festuca glauca Vill., Castañuela azul. Europa.

Hordeum murinum L. subsp *leporinum* (Link.) Arcang. = *H.*
leporinum Link., Región mediterránea.

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf = *H. sinaica* (Delile) G. López,
Cerrillo. Región mediterránea, Portugal.

Indocalamus tessellatus (Munro) Keng f. = *Sasa tessellata*
(Munro) Makino & Shibata, China.

Lagurus ovatus L., O Europa, Región mediterránea, Macaronesia.

Lamarckia aurea (L.) Moench, Región mediterránea, Portugal.

Lolium rigidum Gaudin, Euroasia.

Otatea acuminata (Munro) Calderon & Soderstr., México.

Phalaris minor Retz., Región mediterránea, O Asia.



Phyllosasa tranquillans (Koidz.) Demoly Shiroshima' =
Hibanobambusa tranquillans (Koidz.) Maruy. & H.Okamura,
Origen hortícola.

Phyllostachys aurea Rivière & C. Rivière, Bambú caña de pescar.
SE China.

Phyllostachys aureosulcata McClure, Bambú acanalado amarillo.
NE China.

Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc., Bambú. China.

Phyllostachys nidularia Munro, China.

Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro, Bambú negro. E
China.

Phyllostachys sulphurea (Carrière) Rivière & C.Rivière = *P.*
viridis (R.A.Young) McClure, China.

Piptatherum miliaceum (L.) Coss., Región mediterránea,
Macaronesia, N África, SO Asia.

Pleiblastus argenteostriatus (Regel) Nakai = *Arundinaria pumila*
Mitford = *Pleiblastus chino* 'Elegantissimus' (Franchet & Savatier)
Makino, Japón.

Pleiblastus fortunei (Van Houtte) Nakai = *Pleiblastus variegatus*
(Siebold ex Miq.) Makino, Japón.

Pleiblastus gramineus (Bean) Nakai, Nueva Zelanda.

Pleiblastus linearis (Hack.) Nakai, S. Japón.

Poa annua L., Europa.

Poa infirma Kunth, Inglaterra, Región mediterránea, Irano-
Turanica, Macaronesia.

Polypogon monspeliensis (L.) Desf., Europa.

Pogonatherum panicum (Lam.) Hack., Bambú de interior. Asia



Pseudosasa disticha (Mitford) Nakai = *Pleioblastus distichus* (Mitford) Nakai, Japón.

Pseudosasa japonica (Steud) Makino = *Arundinaria japonica* Siebold & Zucc. ex Steud., Bambú flecha. Japón, Corea.

Rostraria cristata (L.) Tzvelev, Región mediterránea.

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L. var. 70/3370, Caña de azúcar. São Paulo.

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L. var. 71/6180, Caña de azúcar. São Paulo.

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L. var. 71/799, Caña de azúcar. São Paulo.

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L. var. 78/1233, Caña de azúcar. São Paulo.

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L. var. CO 11-48, Caña de azúcar. India.

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L., Caña de azúcar. Origen hortícola.

Sasa palmata (Burb.) E.G. Camus 'Nebulosa', Origen hortícola.

Sasa veitchii (Carrière) Rehder, Japón.

Semiarundinaria fastuosa (Mitford) Makino = *Bambusa fastuosa* Lat.-Marl. ex Mitford, Japón.

Shibataea kumasasa (Steud.) Makino, S Japón.

Stipa bromoides (L.) DRaörf., N África.

Stipa tenacissima L. = *Macrochloa tenacissima* (L.) Kunth, W Región mediterránea.

Podocarpaceae

Podocarpus neriifolius D. Don = *P. discolor* Blume, Podocarpo. De Himalaya a China, La Unión de Myanmar, Laos, Malasia.

Polygalaceae

Polygala myrtifolia L., Poligala. E del Cabo, Natal (Sudáfrica).

Polygala rupestris Pourr., Región mediterránea.

Polygonaceae

Coccoloba uvifera (L.) L., América tropical.

Emex spinosa (L.) Compd., Región mediterránea, Macaronesia.

Muehlenbeckia complexa Meisn., Nueva Zelanda.

Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross = *Polygonum capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don, Himalaya, E Asia.

Phlebodium sp. (R.Br.) J.Sm.

Polygonum aviculare L., Euroasia.

Rumex aculeatus subsp. *induratus* (Boiss & Reuter) Maire & Weiller in Mare, Acedera redonda. C, S Península Ibérica, NO África.

Rumex bucephalophorus L., Región mediterránea, SO Asia, Macaronesia.

Rumex crispus L., Península Ibérica, Baleares.

Polypodiaceae

Didymochlaena truncatula (Swartz) Js. Sm., S América, África, Madagascar, India, Nueva Guinea, Islas Fiji.

Microsorium musifolium Copel., Helecho cocodrilo. Malasia, Indonesia, Filipinas, Nueva Guinea, Polinesia.

Phlebodium aureum (L.) J. Sm., C, S América, O India.



Phymatosorus diversifolius (Willd.) Pic. Serm., Australia, Nueva Zelanda.

Phymatosorus scolopendria (Burm. f.) Pic. Serm., Tropical.

Platyserium bifurcatum (Cav.) C. Chr. = *P. alcicorne* Hort., Cuerno de alce. Queensland, Nueva Gales Del Sur (Australia).

Platyserium stemaria (P. Beauv.) Desv., África tropical, Madagascar.

Platyserium superbum De Joch. & Hennipman, Nueva Gales del Sur, Queensland.

Lecanopteris celebica Hennipman, Célebes (Indonesia).

Myrmecopteris lomarioides (Kunze ex Mett.) Pic. Serm., Célebes (Indonesia).

Myrmecophila sinuosa (Hook.) T. Nakai ex H. Itô, Malasia a Isla Salomón .

Lecanopteris carnosa (Reinw.) Blume, Indonesia, Malasia.

Lecanopteris pumila Blume, Indonesia, Malasia, Islas Filipinas.

Lecanopteris pumila x celebica, .

Lecanopteris holttumii Hennipman, Célebes (Indonesia).

Pontederiaceae

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms., Jacinto de agua. América Tropical.

Pontederia cordata L., De E EE UU a Caribe.

Portulacaceae

Cistanthe grandiflora (Lindl.) Schltld. = *Calandrinia grandiflora*
Lindl., Pata de Guanaco. Chile.

Portulaca grandiflora Hook., Portulaca, Verdolaga. Brasil,
Argentina, Uruguay.

Potamogetonaceae

Potamogeton nodosus Poir, Euroasia.

Primulaceae

Anagallis arvensis L., N, C, S Europa, W Asia, N África.

Cyclamen persicum Mill. `Sierra Series', Origen hortícola.

Cyclamen persicum Mill., SE Europa.

Primula L. Sp. `Wanda Supreme Series', Origen hortícola.

Proteaceae

Stenocarpus sinuatus (A. Cunn.) Endl., Australia.

Banksia serrata L.f, E. Australia.

Grevillea lanigera A. Cunn. ex R.Br. `Compacta' = *G. Lanigera* A.
Cunn. `Mount Tamboritha', Origen hortícola.

Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br., Arbol del fuego, Roble
australiano, Zosle plateado australiano. Queensland, Nueva Gales
del Sur (Australia).

Hakea salicifolia (Vent.) B.L. Burt, Australia.

Macadamia tetraphylla L.A.S. Johnson, Queensland, Nueva Gales
del Sur (Australia).

Pteridaceae

Cheilanthes pteridioides C. Chr., Región mediterránea y macaronesia.

Pellaea rotundifolia (G. Forst.) Hook, Nueva Zelanda.

Pteris cretica L., Trópical y Subtropical.

Pteris cretica L. `Albo lineata, Origen hortícola.

Pteris cretica L. `Parkeri´, Origen hortícola.

Pteris cretica L. `Wimsettii´, Origen hortícola.

Pteris ensiformis Burm. f. `Evergemiensis´, Origen hortícola.

Pteris vittata L., S África, Madagascar, Asia, Malasia, Nueva Guinea, Australia. ´

Pteris sp., L.

Ranunculaceae

Aquilegia caerulea E. James, N América.

Aquilegia vulgaris L., Aguileña. Europa, Asia.

Clematis cirrhosa L., Clemátide. Región mediterránea.

Clematis flammula L., Vidriera, Gata rabiosa. Euroasia.

Nigella gallica Jord., N África, S Europa.

Resedaceae

Reseda alba L., Región mediterránea.

Reseda lutea L., Europa, N África, SO Asia, Macaronesia.

Restionaceae

Elegia tectorum (L.f.) Moline & H.P.Linder, Ciudad del Cabo
(Sudáfrica).

Rhamnaceae

Ceanothus thyrsiflorus Eschw. = *C. thyrsiflorus* Eschw. var.
repens McMinn, Costa De California (EE UU).

Colletia spinosissima J.F. Gmel, Chile.

Rhamnus alaternus L., Aladierno, Sanguino. Región mediterránea.

Rhamnus crenulata Aiton, Espinero. Islas Canarias.

Rhamnus lycioides L., Espino negro. Región mediterránea,
Portugal.

Rhamnus lycioides L. subsp. *oleoides* (L.) Jahand. & Maire,
Región mediterránea.

Ziziphus lotus (L.) Lam., Región mediterránea.

Rosaceae

Bencomia caudata (Aiton) Webb & Berthel., Becomia de monte.
Islas Canarias occidentales, Madeira.

Bencomia sphaerocarpa Svent., Bencomia herreña. Hierro (Islas
Canarias).

Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai = *C. lagenaria* (Loisel.)
Koidz., China, La Unión de Myanmar.

Cotoneaster horizontalis Decne., O China.

Crataegus azarolus L., Región mediterránea, Oriente próximo.

Crataegus monogyna Jacq., Majuelo, Espino albar. O, C Europa,
Caucaso, Anatolia, Oriente Próximo, NO África.

Cydonia oblonga Mill. 'Coinos', Membrillos coínos. Origen
hortícola.

Cydonia oblonga Mill., Membrillero. SE Asia, SE Arabia.

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Níspero. Japón, China.

Geum magellanicum Comm. ex Pers. = *G. chilense* auct., Hierba del clavo. Chile.

Malus communis Poir. var. *coino*, Origen hortícola.

Malus communis Poir. var. *ronda*, Origen hortícola.

Malus domestica L. 'Arena', Origen hortícola.

Malus domestica L. 'Sevillano', Origen hortícola.

Marcetella moquiniana (Webb & Berthel.) Svent., Palo de sangre. Tenerife, Gran Canaria, Gomera (Islas Canarias.).

Mespilus germanica L., Níspero de invierno. Europa Asia Menor.

Photinia x fraseri Dress, 'Red Robin', Origen hortícola.

Potentilla sp. L., Hemisferio norte.

Prunus cerasifera Ehrh. 'Nigra', Ciruelo rojo. SO Asia, Cáucaso.

Prunus domestica L., Ciruelo púrpura. SE Europa, SO Asia.

Prunus domestica L. 'Blanquilla', Ciruela blanquilla. Origen hortícola.

Prunus domestica L. 'Claudia', Ciruela claudia. Origen hortícola.

Prunus domestica L. 'Abrehueso', Ciruela abrehueso. Origen hortícola.

Prunus domestica L. 'Safranera', Ciruela safranera. Origen hortícola.

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb. = *P. amygdalus* Batsch = *P. communis* (L.) Arcangeli, Almendro. Balcanes, SO Asia, N África.

Prunus lusitanica L. subsp *hixa* (Brouss. ex Willd.) Franco, Madeira, Islas Canarias.



Prunus persica (L.) Batsch Stark 'Red Gold', Nectarina Stark Red Gold. Origen hortícola.

Prunus persica (L.) Batsch, Melocotonero. China, Afganistan, Irán.

Prunus persica. (L.) Batsch var. *independence*, Nectarina independence. Origen hortícola.

Pyracantha coccinea M. Roem., Espino de fuego. SE Europa.

Pyrus communis L., Peral. Caucaso, E Europa.

Pyrus communis L. Franco', Peral. Origen hortícola.

Rhaphiolepis x delacourii Andr, Origen hortícola.

Rosa banksiae R.Br., Rosal de Banks. O y C China.

Rosa sempervirens L., Mosqueta. S Europa, NO África, Turquía.

Rubus ulmifolius Schott, Zarzamora. Europa, NO África, Macaronesia.

Sorbus domestica L., Serbal común. C, S Europa, NW África, Chipre, Anatolia, Cáucaso.

Spiraea cantoniensis Lour. = *S. reeversiana* Lindl., Espírea, Escoba. China, Japón.

Spiraea japonica L. f. 'Little Princess', Pequeña princesa. Origen hortícola.

Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel, China, Japón.

Rubiaceae

Asperula hirsuta Desf., S Peninsula Ibérica, NO África.

Coffea arabica L. var. *la robusta*, Origen hortícola.

Coffea arabica L., África tropical.

Coffea canephora Pierre ex A. Froehner = *C. robusta* L. Linden, Cafeto robusto. O África tropical.



Coleonema pulchrum Hook., S África.

Coprosma repens A. Rich. Marple Queen', Origen hortícola.

Coprosma repens A. Rich., Nueva Zelanda.

Crucianella maritima L., Región mediterránea.

Galium aparine L., Euroasia, Sudamérica.

Galium tricornutum Dandy, S, O, C Europa.

Galium viridiflorum Boiss & Reut., S de España: Serranía de Ronda, Sierra Bermeja, Sierra Tejada y valle del río Guadalfeo.

Hydnophytum formicarum Jack, Sudeste de Asia.

Hydnophytum moseleyanum Becc.,

Hydnophytum puffii Y.W.Low, Sugau & K.M.Wong, Sabah (Malasia).

Hydnophytum simplex Becc, Nueva Guinea.

Hydnophytum sp. Jack, Asia Sudoriental.

Myrmecodia beccarii Hook.f., Australia.

Myrmecodia tuberosa Jack = *M. armata* DC., S Asia.

Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers, De E África a S Arabia

Plocama pendula Aiton, Balo. Islas Canarias.

Rogiera amoena Planch. = *Rondeletia amoena* (Planch) Hemsl., México , Belice , Guatemala , El Salvador , Nicaragua , Costa Rica y Panamá

Rondeletia odorata Jacq. = *R. speciosa* Lodd., Cuba, Panamá.

Rubia peregrina L., S, O Europa.

Sherardia arvensis L., Europa.

Valantia hispida L., Región mediterránea, S Portugal.

Rutaceae

Diosma hirsuta L. = *D. ericoide* L., Sudáfrica.

Citrus australasica F.Muell, Lima dedo, Caviar cítrico.
Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Calodendrum capense (L. f.) Thunb., Castaño del Cabo. S África.

Casimiroa edulis La Llave, México, C América.

Casimiroa tetrameria Millsp., Matasano. C América.

Citrus x aurantium L., S Vietnam, SE Asia.

Citrus hystrix DC., Combava. SE Asia.

Citrus japonica Thunb. = *Fortunella margarita* (Lour.) Swingle,
Kumquat. SE China.

Citrus limon (L.) Osbeck, Limonero. SE Asia.

Citrus maxima (Burm.) Merr. = *C. grandis* (L.) Osbeck, Pomelo.
Malasia, Polinesia.

Citrus medica L. = *C. medica* var. *digitata* Risso ex Guillaumin.
cidro, citrón. SE Asia

Citrus sinensis (L.) Osbeck, Naranja dulce. China.

Citrus reticulata Blanco, *Rutaceae*. Mandarino. Filipinas, SE Asia.

Murraya paniculata (L.) Jack. = *M. exotica* (L.) Millsp., Jazmín de
la India. SE Asia, Malasia.

Ruta graveolens L., Ruda. S Europa.

Salicaceae

Populus alba L., Álamo blanco. C, S Europa, O Asia, N África.

Populus nigra L., Chopo, Álamo negro. Europa oriental, O Asia.

Salix babylonica L., Sauce llorón. E Asia.

Salix pedicellata Desf., Sauce. Región mediterránea.

Salviniaceae

Salvinia natans (L.) All., Euroasia, N África.

Santalaceae

Osyris alba L., Retama loca, Guardalobo. S Europa, N África, SO Asia.

Sapindaceae

Acer negundo L., América del Norte y América Central.

Acer negundo L. f. *variegatum*, América del Norte.

Acer platanoides L., Arce real. N, C Europa.

Acer tataricum L., Acer de Tataria. SE Europa.

Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk, Cupania de hojas de anacardo. E, N Australia.

Dimocarpus longan Lour. = *Euphoria longan* (Lour.) Steud., Longan. India, Sri Lanka.

Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 'Purpurea', Origen hortícola.

Koelreuteria bipinnata Franch., Árbol de la lluvia chino. China.

Koelreuteria elegans (Seem.) A. C. Sm., Árbol de la lluvia de oro. Taiwan, Fiji.

Koelreuteria paniculata Laxm. = *K. apiculata* Rehder & E.H. Wilson, Jabonero de China, Árbol de los farolillos. China.

Litchi chinensis Sonn., Lichi. China.

Litchi chinensis Sonn. 'B-10', Lichi B-10. Origen hortícola.

Litchi chinensis Sonn. 'Kawai-Mai-Pink', Litchi Kawai-Mai-Pink.
Origen hortícola.

Ungnadia speciosa Endl., California (EEUU).

Sapotaceae

Argania spinosa (L.) Skeels, Argán. Marruecos, Sahara.

Manilkara zapota (L.) P. Royen, Chicozapote, Sapodilla. México,
C América.

Pouteria campechiana (Kunth) Baehni = *Lucuma salicifolia* HBK,
Canistel, Zapote amarillo. De México a C América.

Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 'Canistel Fes', Canistel Fes.
Origen hortícola.

Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 'Canistel Bruce', Canistel
Bruce. Origen hortícola.

Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze, Lucumo. Perú, Bolivia.

Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze 'La Molina', Lucumo La
Molina. Origen hortícola.

Sarraceniaceae

Heliamphora minor Gleason, Tropical.

Sarracenia alata (Alph. Wood.) Alph. Wood., S Alabama, E texas
(EEUU).

Sarracenia leucophylla Raf., NE Alabama (EE UU).

Sarracenia minor Walter, Nuevo mundo.

Sarracenia oreophila Wherry., NE Alabama (EE UU).

Sarracenia psittacina Michx., SE EEUU.

Sarracenia purpurea L. var. *venosa* (Raf.) Fernald, N América.

Sarracenia purpurea L., N América.

Saururaceae

Houttuynia cordata Thunb., China, Japón.

Saxifragaceae

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch = *B. cordifolia* (Haw.) Sternb.,
Siberia, Mongolia.

Heuchera micrantha Douglas ex Lindl., Origen hortícola.

Saxifraga stolonifera Curtis, China, Japón.

Scrophulariaceae

Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze, Chile.

Antirrhinum majus L., Conejitos. Región mediterránea.

Diascia barberae Hook. f., S África.

Hebe andersonii (Lindl. & Paxt.) Cockayne `Variegata´, Origen
hortícola.

Hebe pinguifolia (Hook. f.) Cockayne & Allan `Pagei´, Origen
hortícola.

Hebe sp. Comm. ex Juss. `Autum Glory´, Origen hortícola.

Linaria amoii Campo ex Amo, SE de la Península Ibérica (Sierra
Tejeda y Almirajara).

Linaria clementei Haens ex Boiss., S de la Península Ibérica (Ma).

Linaria platycalyx Boiss., Sierra de Ronda (Málaga)

Misopates orontium (L.) Raf., S Europa, N África.

Phygelius capensis E. Mey. Ex Benth., Sudáfrica

Scrophularia peregrina L., Región mediterránea, SO Asia.

Selaginellaceae

Lycopodioides apoda (L.) Kuntze = *Selaginella apoda* (L.) C.
Morren, E, N América.

Selaginella kraussiana (Kunze) A. Braun, S África.

Selaginella martensii Spring 'Variegata', Origen hortícola.

Selaginella sp., P. Beauv.

Simaroubaceae

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle = *A. glandulosa* Desf. =
Toxicodendron altissimum Mill., China.

Smilacaceae

Smilax aspera L., S Europa, O Asia, Macaronesia, N África.

Solanaceae

Brugmansia x candida Pers. = *Datura x candida* (Pers.) Voigt,
rigen hortícola.

Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.
Presl, SE Brasil.

Brugmansia x insignis (Barb.Rodr.) Lockwood ex R.E.Schult,
Origen hortícola.

Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltldl.) Benth. = *B. calycina*
Benth. ,.. Brasil.

Cestrum aurantiacum Lindl, Galán anaranjado. C América.

Cestrum elegans (Brongn. ex Neumann) Schltld. = *C. purpureum* (Lindl.) Standl, México.

Cestrum x cultum Francey, Galán rosado. Origen hortícola.

Cestrum nocturnum L, Sudamérica.

Juanulloa mexicana (Schltld.) Miers, Perú.

Lycianthes rantonnetii (Carrière ex Lesc.) Bitter, = *Solanum rantonnetii* Carrière, Argentina, Paraguay.

Lycium chilense Bertero, Chile.

Lycium intricatum Boiss, S Europa, N África.

Petunia hybrida Vilm, Origen hortícola.

Petunia hybrida Vilm., 'Grandiflora'. Origen hortícola.

Petunia x atkinsiana D. Don ex W.H. Baxter, Surfinias. Origen hortícola.

Solandra maxima (Moc. & Sessé ex Dunal) P.S.Green = *S. hartwegii* C.F. Ball, Trompetas. México.

Solanum jasminoides J. Paxton, Solano de flor blanca. Brasil.

Solanum americanum Mill. = *S. nigrum* L, N Europa.

Streptosolen jamesonii (Benth) Miers, Estreptosolen. Andes colombianos, Ecuador, Perú.

Vestia foetida Hoffmanns, Chile.

Whitania frutescens (L.) Pauquy, Oroval. Región mediterránea.

Strelitziaceae

Ravenala madagascariensis Sonn., Árbol del viajero, palma del viajero. Madagascar.

Strelitzia juncea (Ker Gawl.) Link, Sudáfrica.

Strelitzia nicolai Regel & K. Koch, Ave gigante del paraíso.
Regiones costera Del S De Natal y NE Provincia Del Cabo
(Sudáfrica).

Strelitzia reginae Banks = *S. parvifolia* W.T. Aiton, Ave del
paraíso. S África.

Stylidiaceae

Stylidium adnatum R. Br., Australia.

Stylidium debile F. Muell, Queensland, Nueva Gales del Sur
(Australia).

Stylidium graminifolium SW. ex Willd., Tasmania (Australia).

Tamaricaceae

Tamarix gallica L., Taray, Taraje Región mediterránea.

Tamarix parviflora DC., Taraje. NE región mediterránea.

Taxaceae

Taxus baccata L., Región mediterránea.

Theaceae

Visnea mocanera L. f., Mocan. Islas Canarias.

Thelypteridaceae

Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy, Tropical,
subtropical.

Thymelaeaceae

Thymelaea hirsuta (L.) Endl., Bolaga, Matapollo. Región mediterránea.

Tiliaceae

Tilia cordata Mill., Tilo de hojas pequeñas. Europa.

Tilia platyphyllos Scop., Tilo, Tilo de hojas grandes. C, S Europa.

Tilia tomentosa Moench = *T. argentea* Desf., Tilo plateado. Europa oriental, N Anatolia.

Trapaceae

Trapa natans L., Europa, Asia.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L., Capuchina Perú.

Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav, Andes centrales.

Ulmaceae

Ulmus minor Mill. = *U. angustifolia* (Weston) Weston, Olmo. Europa, NO Asia, N América.

Urticaceae

Parietaria judaica L. = *P. diffusa* Merlet & W.D.J.Koch, O, S Europa.

Pilea depressa (Sw.) Blume, SO EEUU.

Pilea glaucophylla Killip, SE Asia.

Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd., De O del S EEUU a N de S América.

Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy, España, Francia, Italia.

Urtica dioica L., Euroasia.

Verbenaceae

Aloysia citriodora Palau = *A. triphylla* (L'Hér.) Britton, Hierba Luisa. Argentina, Chile.

Aloysia looseri Moldenke, Chile.

Citharexylum spinosum L. = *C. quadrangulare* Jacq., Antillas, N América del Sur.

Duranta erecta L. = *D. repens* L., Duranta. Brasil.

Duranta erecta L. 'Geisha girl', Duranta. Origen hortícola.

Lantana camara L., Banderita española. América Tropical.

Lantana camara L. 'Flava', Origen hortícola.

Lantana camara L. 'Nana', Origen hortícola.

Lantana montevidensis (K. Spreng.) Briq. = *L. sellowiana* Link et Otto = *Lippia montevidensis* Spreng., Lantana rastrera. S América.

Petrea volubilis L., América tropical.

Phyla nodiflora (L.) Greene var. *rosea* (D. Don) Moldenke = *Lippia repens* Spreng., Tropical y subtropical.

Verbena canadensis (L.) Britton = *V. aubletia* Jacq., Verbena rosa. América del Norte.

Verbena x hybrida Voss., Verbena. Origen hortícola.

Violaceae

Viola odorata L., Violeta. Asia occidental, Región mediterránea, Macaronesia.

Viola tricolor L., Pensamiento. Europa y Asia.

Viola wittrockiana Gams ex Nauenb. & Buttler, Violaceae.
Pensamiento. Origen hortícola.

Vitaceae

Ampelopsis glandulosa (Wall.) Momiy. var. *brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. = *A. brevipedunculata* (Maxim.) Trautv., N China, Manchuria, Corea, Japón.

Cissus alata Jacq. = *C. rhombifolia* Vahl., Ciso, Parra de interior. Trinidad y Tobago.

Cissus antarctica Vent., Vid canguro. E Australia.

Cyphostemma juttae (Dinter & Gilg) Desc., Parra del desierto Namibia.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. = *Ampelopsis quinquefolia* Michx. = *Vitis quinquefolia* (L.) Lam., Viña virgen. NE EE UU a México.

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., Parra virgen. De China a Japón.

Vites herlandieri x Vitis rupestris F. Richter 110R, Origen hortícola.

Vitis vinifera L., Vid común. Región mediterránea.

Vitis vinifera L., 'Airén'. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Alicante'. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Beba'. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Ciutí'. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Cojonata'. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Doradilla'. Origen hortícola.

- Vitis vinifera* L., 'Jaén blanco'. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Jaén tinto'. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Mollar negro'. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Moscatel fino'. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Pedro Ximenez'. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Perruna blanca'. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Perruna negra'. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Perruno'. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Piñuela'. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Plateado'. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Rome blanco'. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Rome tinto'. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Santa Paula'. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Uva del rey'. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Vijiriega'. Vid común. Origen hortícola.

Xanthorrhoeaceae

- Aloe aculeata* Pole-Evans., Sudáfrica.
- Aloe arborescens* Mill., Aloe. De N Sudáfrica a Malauí.
- Aloe brevifolia* Mill., Sudáfrica.
- Aloe ciliaris* Haw., Sudáfrica.
- Aloe descoingsii* Reynolds, SO Madagascar.
- Aloe dichotoma* Masson, Sudáfrica.
- Aloe ferox* Mill., Sudáfrica.

Aloe humilis (L.) Mill., Sudáfrica.

Aloe juvenna Brandham & S.Carter, Sudáfrica.

Aloe maculata All. = *A. saponaria* (Aiton) Haw., Sudáfrica.

Aloe perfoliata L. = *A. mitriformis* Mill., S África.

Aloe plicatilis (L.) Mill., S África.

Aloe ramossisima Pillans, S África.

Aloe rauhii Reynolds, Madagascar.

Aloe thraskii Baker, Sudáfrica.

Aloe vacillans Forssk., Península Arábiga.

Aloe vera (L.) Burm. f. = *A. barbadensis* Mill., SO Arabia.

Aloe x spinosissima hort. ex Jahand, Origen hortícola

Bulbine frutescens (L.) Willd., E Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Gasteria carinata (Mill.) Duvall, S África.

Gasteria carinata var. *verrucosa* (Mill.) van Jaarsv. = *G. verrucosa* (Mill.) Duval, S África.

Gasteria obliqua (Aiton) Duval = *G. liliputana* (Poelln.) Van Jaarsv., S África.

Zamiaceae

Dioon califanoi De Luca & Sabato, Oaxaca (México).

Dioon edule Lindl., México.

Dioon mejiae Staudl. & L. O. Willians, Honduras.

Dioon rzedowskii De Luca, A. Moretti, Sabato & Vázquez-Torres, Oaxaca (México).

Dioon spinulosum Dyer, México.

Encephalartos villosus Lem., Cica espina, encefalarto. S África.



Macrozamia communis L. A. S. Johnson, E Nueva Gales del Sur (Australia).

Macrozamia johnsonii D.L. Jones & K. D. Hill, Nueva Gales del Sur (Australia).

Macrozamia moorei F. Muell., Queensland (Australia).

Zamia floridana A.DC, SE EE UU.

Zamia furfuracea L. f. ex Aiton, Veracruz (México).

Zingiberaceae

Alpinia caerulea (R.Br.) Benth., Origen hortícola.

Alpinia malaccensis (Burm. f.) Roscoe, Indonesia, Malasia.

Alpinia nutans (L.) Roscoe, SE Asia.

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. = *A. speciosa* (Wendl.) Schum., Asia Tropical y subtropical.

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. variegata', Origen hortícola.

Hedychium coronarium J. Koenig, Asia Tropical.

Hedychium flavescens Carey ex Roscoe, China, India, Nepal.

Hedychium horsfieldii R.Br. ex Wall., Isla de Java (Indonesia).