

## CATÁLOGO DE ESPECIES POR FAMILIAS (enero 2022)

### Acanthaceae

*Acalypha wilkesiana* Müll. Arg. = *A. tricolor* Seem., Acalifa. Islas del Pacífico.

*Acanthus mollis* L., Acanto. C, E Región mediterránea.

*Aphelandra squarrosa* Nees, 'Dania' *Acanthaceae*. Afelandra. Origen hortícola

*Barleria cristata* L., Violeta filipina. S Asia.

*Barleria obtusa* Ness, S África.

*Brillantaisia ulugurica* Lindau, *Acanthaceae*. Salvia gigante. C,S África.

*Crossandra infundiliformis* (L.) Ness Orange marmalade', Origen hortícola.

*Eranthemum pulchellum* Andrews = *E. nervosum* (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult., India.

*Hypoestes phyllostachya* Baker, Madagascar.

*Justicia adhatoda* L. = *Adhatoda vasica* Ness, India, Sri Lanka.

*Justicia aurea* Schltl., México a Panamá.

*Justicia brandegeana* Wassh. & L. B. Sm = *Beloperone guttata* Brandege. México.

*Justicia carnea* Lindl., Sudamérica.

*Megaskepasma erythrochlamys* Lindau, Venezuela.

*Odontonema tubaeforme* (Bertol.) Kuntze = *O. strictum* (Ness) Kuntze. C América.

*Pseuderanthemum carruthersii* (Seem.) Guillaumin =  
*Pseuderanthemum atropurpureum* (W.Bull) Radlk., Malasia, India,  
Sri Lanka.

*Ruellia rosea* (Ness) Hemsl., México.

*Ruellia simplex* C.Wright, Petunia mejicana. México.

*Ruellia tweediana* Griseb., México.

*Sanchezia pavibracteata* Sprangue & Hutch., Sanchezia. América  
tropical.

*Thunbergia erecta* (Benth) T. Anderson = *Meyenia erecta* Benth,  
África Tropical.

*Thunbergia fragrans* Roxb., Thunbergia fragante. India, SE Asia y  
China.

*Thunbergia grandiflora* (Roxb. & Rottler) Roxb., Thunbergia. N  
India.

### Adiantaceae

*Adiantum capillus-veneris* L. Subcosmopolita.

*Adiantum raddianum* C. Presl = S América, México.

### Adoxaceae

*Viburnum odoratissimum* Ker Gawl., Viburnum dulce. Asia.

*Viburnum tinus* L., Durillo. Región mediterránea.

### Agavaceae

*Hesperaloe parviflora* (Torr.) J.M. Coult., Texas (EEUU).

### Aizoaceae

*Carpobrotus acinaciformis* (L.) L.Bolus, Diente de dragón. Uña de león. Sudáfrica.

*Carpobrotus edulis* (L.) N.E.Br., S África.

*Delosperma cooperi* (Hook.f.) L.Bolus, Sudáfrica.

*Delosperma lehmannii* (Eckl. & Zeyh.) Schwantes ex H.Jacobsen =  
*Schonlandia lehmannii* (Eckl. & Zeyh.) L. Bolus, Ciudad del Cabo  
(Sudáfrica).

*Drosanthemum hispidum* (L.) Schwantes, Namibia, S África.

*Glottiphyllum depressum* (Haw.) N.E., Br., Sudáfrica.

*Glottiphyllum difforme* (L.), N.E.,Br., Sudáfrica.

*Lampranthus spectabilis* (Haw.) N. E. Br., 'Alba', Uña de gato.  
Origen hortícola.

*Lithops wernerii* Schwantes & H. Jacobs. Namibia.

*Pleiospilos nelii* Schwantes. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

*Smicrostigma viride* (Haw.) N. E. Br., S África.

### Alliaceae

*Allium ampeloprasum* L., Euroasia, N África.

*Allium neapolitanum* Cirillo, Región mediterránea, Portugal.

*Allium rouyi* Gaut., Sierra bermeja de Estepona (Málaga). España.

*Tulbaghia violacea* Harv., S África.

### Alstroemeriaceae

*Alstroemeria pelegrina* L., Azuzena de Quito. Chile.

### Altingiaceae

*Liquidambar styraciflua* L., De Connecticut a C América.

### Amaranthaceae

*Alternanthera ficoidea* (L.) Sm., Coqueta. América.

*Alternanthera brasiliana* (L.) Kuntze, Alternantera. Brasil

*Atriplex halimus* L., Salado. Región mediterránea, S África.

*Iresine herbstii* Hook., S América.

### Amaryllidaceae

*Agapanthus africanus* (L.) Hoffmanns. 'Peter Pan', Agapanto, Lirio africano. Origen hortícola.

*Agapanthus africanus* (L.) Hoffmanns. = *A. umbellatus* L`Hér. = *A. minor* Lodd., S África.

*Amaryllis belladonna* L., Amarilis. Sudáfrica.

*Clivia miniata* (Lindl.) Bosse, Clivia. S África.

*Clivia nobilis* Lindl. = *Imantophyllum aitonii* Hook. f., Clivia. S África.

*Crinum asiaticum* var. *pedunculatum* (R.Br.) Fosberg & Sachet = *Crinum pedunculatum* R. Br., Australia.

*Crinum x amabile* Donn ex Ker Gawl. = *Crinum x augustum* Roxb., Origen hortícola.

*Crinum x powellii* Baker, Origen hortícola.

*Cyrtanthus brachyscyphus* Bakeri, Sudáfrica.

*Haemanthus albiflos* Jacq., Brocha de pintor. Sudáfrica.

*Haemanthus* sp. L., Sudáfrica.

*Hippeastrum vittatum* (L`Her.) Herb., Argentina, Brasil.

*Hymenocallis* sp Salisb., América tropical y subtropical.

*Ismene narcissiflora* (Jacq.) M.Roem. = *Hymenocallis narcissiflora* (Jacq.) J.F.Macbr., C, S Perú.

*Narcissus* sp L., Región mediterránea, Europa.

*Rauhia multiflora* (Kunth) Ravenna = *R. peruviana* Traub, Perú.

### Anacardiaceae

*Mangifera indica* L., Mango. De N India a La Unión de Myanmar.

*Mangifera indica* L. `Irwin´, Mango. Origen hortícola.

*Mangifera indica* L. `Tony Atkins´, Mango. Origen hortícola.

*Mangifera indica* L. `Osteen´, Mango. Origen hortícola.

*Mangifera indica* L. `Keitt´, Mango. Origen hortícola.

*Mangifera indica* L. `Kent´, Mango. Origen hortícola.

*Mangifera indica* L. var. *rosa*, Mango Rosa. Origen hortícola.

*Mangifera indica* L. var. *maya*, Mango Maya. Origen hortícola.

*Mangifera indica* L. var. *palmer*, Mango Palmer. Origen hortícola.

*Operculicarya decaryi* H. Perrier, S y SW Madagascar.

*Pistacia atlantica* Desf., Almácigo. Islas Canarias, S, E región mediterránea, Pakistán, Afganistán.

*Pistacia lentiscus* L., Lentisco. Región mediterránea.

*Pistacia terebinthus* L., Cornicabra. Región mediterránea.

*Pistacia vera* L., Pistacho. Asia occidental, Asia menor.

*Pleiogynium timoriense* (A. DC.) Leenh., Ciruela Burdekin. Malasia, Australia y las islas del Pacífico.

*Rhus punjabensis* J. L. Stewart ex Brandis, E Asia, Himalayas.

*Rhus typhina* L. f. *dissecta* Rehder, Origen hortícola.

*Schinus molle* L., Falso pimentero. C de Suramérica.

*Schinus terebinthifolia* Raddi, Cerezo de Navidad. Brasil.

*Spondias mombin* L. = *S. lutea* L., Jobo, Jobo amarillo. América tropical.

### Annonaceae

*Annona cherimola* Mill., Chirimoyo. Andes peruanos y Ecuador.

### Apiaceae

*Astydamia latifolia* (L. f.) Baill., Lechuga de mar, servilleta. Islas Canarias (España), NO África.

*Bupleurum fruticosum* L., Región mediterránea.

*Bupleurum gibraltarium* Lam., Península Ibérica, N África.

*Bupleurum handiense* (Bolle) G. Kunkel, Islas Canarias orientales.

*Crithmum maritimum* L., Región mediterránea, atlántica, macaronésica.

*Daucus carota* L., Europa, Asia, N África, Macaronesia.

*Distichoselinum tenuifolium* (Lag.) García-Martín & Silvestre, S, E Península Ibérica.

*Elaeoselinum foetidum* (L.) Boiss., SO Península ibérica, NO África.

*Eryngium maritimum* L., Cardo marino. Región mediterránea.

*Foeniculum vulgare* Mill. = *Foeniculum vulgare* subsp. *piperitum* (C.Presl.) Bég., Hinojo., Región mediterránea.

*Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm. = *O. daucoides* L., Región mediterránea, Cáucaso, Azerbaiyán, N Irán, N Iraq.

*Peucedanum officinale* L. subsp. *brachyradium* García Martín et Silvestre, Sierra Bermeja (Ronda. Málaga).

*Scandix pecten-veneris* L., O, C, S Europa.

*Torilis arvensis* (Huds.) Link., C, S Europa, NO África, Macaronesia, SO Asia.

### Apocynaceae

*Acokanthera oblongifolia* (Hochst.) Benth. & Hook. f. ex B. D. Jacks. = *A. spectabilis* (Sond.) Hook. f., SO África.

*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult., De E África a S Arabia.

*Asclepias curassavica* L., N América.

*Asclepias incarnata* L., Algodancillo de Mexico. EEUU.

*Asclepias syriacas* L., E EEUU.

*Beaumontia grandiflora* Wall., Trompeta blanca. E del Himalaya.

*Carissa macrocarpa* (Eckl.) A.DC. = *C. grandiflora* (E. Mey.) A. DC., Cerezo del Natal. S África.

*Cascabela thevetia* (L.) Lippold = *T. peruviana* (Pers.) K. Schum., Oleandro amarillo. América Tropical.

*Ceropegia dichotoma* Haw., Cordoncillo, Mataperros. Islas Canarias.

*Ceropegia sandersonii* Decne. ex Hook. f., Mozambique, Sudáfrica.

*Ceropegia stapeliiformis* Haw., S África.

*Ceropegia woodii* Schltr., Sudáfrica, Swazilandia, Zimbabwe.

*Cryptostegia grandiflora* Roxb. ex R.Br., SE Madagascar.

*Dischidia vidalii* Becc. = *D. pectenoides* H. Person, Islas Filipinas.

*Duvalia pubescens* N.E. Br., S África.

*Fockea edulis* (Thunb.) K. Schum., Namibia, Sudáfrica.

*Gomphocarpus physocarpus* E. Mey., SE África.

*Hoya bella* Hook., SE Asia, Australia.

*Hoya carnosa* (L. f.) R. Br., De S China a Australia.

*Hoya compacta* C.M. Burton 'Variegata', SE Asia, Australia.

*Hoya compacta* C.M. Burton, SE Asia, Australia.

*Hoya kerrii* Craib, Sian, Thailandia, Laos.

*Hoya lanceolata* Wall. ex D. Don subsp. *bella* (Hook.) D. H. Kent =  
*H. bella* Hook, Burma.

*Mandevilla laxa* (Ruiz & Pav.) Woodson, Jazmín chileno. Chile.

*Nerium oleander* L. 'Nana', Adelfa enana. Origen hortícola.

*Nerium oleander* L., Adelfa. De región mediterránea a Japón.

*Orbea variegata* (L.) Haw. = *Stapelia variegata* L., Provincia del  
Cabo (Sudáfrica).

*Pachypodium bispinosum* (L.f.) A. DC., Sudáfrica.

*Pachypodium geayi* Castantin & Bois, SE Madagascar.

*Pachypodium lamerei* Drake, S Madagascar.

*Periploca laevigata* Aiton, Región mediterránea.

*Plumeria alba* L., Plumeria, Frangipani. De México a Antillas  
Mayores y Menores.

*Plumeria obtusa* L., La Española, Cuba, Península del Yucatán  
(México).

*Plumeria rubra* L., Plumeria, Frangipani. De México a Panamá.



*Plumeria rubra* L. 'Yellow',. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

*Plumeria rubra* L. 'Muang Jack',. Plumeria Frangipani. Origen hortícola.

*Plumeria rubra* L. 'Kled Tabtim', Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

*Plumeria rubra* L. 'Alba', Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

*Plumeria rubra* L. 'Muang Puang Roi', Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

*Plumeria rubra* L. 'Thong Tawee Choke', Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

*Plumeria rubra* L. 'Puang Yok', Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

*Plumeria rubra* L. 'Chompoo Sin', Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

*Plumeria rubra* L. 'Elsie', Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

*Plumeria rubra* L. 'Balang Tabtim', Plumeria, Frangipani. Origen hortícola  
*Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. =  
*Rhynchospermum jasminoides* Lindl., Jasmín estrella. China.  
*Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. Mandianum'. Origen hortícola.

*Vinca difformis* Pourr., Vincapervinca. O Región mediterránea.

*Vinca major* L., Región mediterránea, Europa, Asia menor.

*Vinca minor* L., Vincapervinca. Europa.

### Araceae

*Alocasia lauterbachiana* (Engl.) A. Hay, Indonesia. Nueva Guinea.

*Alocasia odora* (Lodd.) Spach, Oreja de elefante. Asia Tropical.

*Alocasia zebrina* Schott ex Van Houtte, Oreja de elefante cebrá.  
Asia.

*Amorphophallus bulbifer* (Roxb.) Blume, India.

*Anthurium andraeanum* Linden ex André, SO Colombia, NO  
Ecuador.

*Anthurium coriaceum* G. Don, Brasil.

*Arisarum simorrhinum* Durieu, Europa.

*Colocasia esculenta* (L.) Schott, Taro. SE Asia.

*Epipremnum aureum* (Linden & André) G.S. Bunting = *Pothos  
aureus* Linden et André, Islas Salomón.

*Monstera deliciosa* Liebm., Costilla de Adán. De México a Panamá.

*Philodendron bipinnatifidum* Schott ex Endl. = *P. selloum* K. Koch,  
Araceae. S Brasil.

*Philodendron glaziovii* Hook.f., Brasil.

*Philodendron hederaceum* (Jacq.) Schott = *P. scandens* K.Koch &  
Sello, Filodendro. C América, Caribe.

*Philodendron panduliforme* (Kunth) Kunth, Brasil.

*Rhaphidophora decursiva* (Roxb.) Schott, India, Sri Lanka, La  
Unión de Myanmar.

*Scindapsus grandifolius* Engl. = *Epipremnum grandifolium* (Engl.)  
Engl., SE Asia, Nueva Guinea, Queensland, Islas del Pacífico.

*Scindapsus pictus* Hassk. 'Argyraeus', Origen hortícola.

*Spathiphyllum wallisii* Regel, Colombia.

*Syngonium podophyllum* Schott = *S. gracile* (Miq.) Schott,  
Singoio. México, Brasil, Bolivia.

***Zantedeschia aethiopica*** (L.) Spreng = *Calla aethiopica* L. =  
*Richardia africana* Kunth, Cala, Lirio de agua. Provincia del Cabo,  
Natal, Transvaal, Lesotho (Sudáfrica).

***Zantedeschia aetiopica*** (L.) Spreng 'Callaformia', Cala. Origen  
hortícola.

### ***Araliaceae***

***Hedera canariensis*** Willd. 'Gloire de marengo', Origen hortícola.

***Hedera helix*** L., Europa, O Asia, N África.

***Hedera helix*** L. 'Glacier', Origen hortícola.

***Schefflera actinophylla*** (Endl.) Harms = *Brassaia actinophylla*  
Endl., Árbol de los paraguas. Australia, S Nueva Guinea.

***Schefflera arboricola*** (Hayata) Merr. = *Heptapleurum arboricolum*  
Hayata, Cheflera. Isla de Formosa (Taiwan).

***Schefflera arboricola*** (Hayata) Merr. 'Gold Capella', Origen  
hortícola.

***Schefflera elegantissima*** (Veitch ex Mast.) Lowry & Frodin =  
*Dizygotheca elegantissima* (Veitch ex Mast.) R. Vig. & Guillaumin =  
*Aralia elegantissima* Veitch ex Mast., Falsa aralia, Planta araña.  
Nueva Caledonia, Polinesia.

### ***Araucariaceae***

***Agathis microstachya*** J.F. Bailey & C.T. White, N Queensland  
(Australia).

***Araucaria angustifolia*** (Bertol.) Kuntze, S Brasil, Argentina.

***Araucaria bidwillii*** Hook, Araucaria. SE Queensland (Australia).

***Araucaria columnaris*** (G.Forst.) Hook. = *A. excelsa* (Lamb.) R. Br.,  
Pino de Nueva Caledonia. Nueva Caledonia.

*Araucaria heterophylla* (Salisb.) Franco, Pino de pisos, Pino de Norfolk. Isla de Norfolk (Australia).

*Wollemia nobilis* W.G.Jones, K.D.Hill & J.M.Allen, Nueva Gales del Sur (Australia).

### Areaceae

*Acoelorrhaphe wrightii* (Griseb. & H. A. Wendl.) H. A. Wendl. ex Becc. = *Paurotis wrightii* (Griseb. et H. A. Wendl.) Brittonx ex Brittonx, Tasiste, Guano prieto. México, Belice, Bahamas y Cuba.

*Acrocomia aculeata* (Jacq.) Lodd. ex Mart., Totaí, Macaúba. De México a Argentina.

*Archontophoenix alexandrae* (F. Muell.) H. Wendl. & Drude = *Ptychosperma alexandrae* F. Muell., N Queensland (Australia).

*Archontophoenix alexandrae* (F. Muell.) H. Wendl. & Drude `Beatrice`, Palmera escalonada. Queensland (Australia).

*Archontophoenix cunninghamiana* (H. Wendl.) H. Wendl. & Drude = *Ptychosperma cunninghamiana* H. Wendl., Palmera de Cunningham, Palmera rey Piccabeen. Nueva Gales del Sur, Queensland (Australia).

*Arenga engleri* Becc., Palmera de Formosa. Isla de Formosa e Islas Ryu-Kyu.

*Bismarckia nobilis* Hildebr. & Y. H. Wendl., Palmera de Bismarck. Madagascar.

*Brahea armata* S. Watson = *B. roezlii* Linden = *Erythea armata* (S. Watson) S. Watson, Palmera azul mejicana. Baja California y Sonora (NO México).

*Brahea brandegeei* (Purpus) H. E. Moore = *Erythea brandegeei* Purpus, Palmera negra mejicana. NO México.

*Brahea dulcis* (Kunth) Mart., Palmera dulce . Desde México a Perú.

*Butia capitata* (Mart.) Becc., Brasil, Uruguay.

***Butia capitata*** (Mart) Becc. var. ***strictor*** L. H. Bailey, Butia. Brasil.

***Butia yatay*** (Mart) Becc. = *Cocos yatay* Mart., Yatay, Palma yatay. Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

***Caryota mitis*** Lour. = *C. furfuracea* Blume ex Mart. = *C. griffithii* Becc., Palmera cola de pescado con varios troncos. SE Asia.

***Caryota obtusa*** Griff. = *C. gigas* Hahn ex Hodel, Caryota gigante de Tailandia. Tailandia.

***Caryota urens*** L., India, Isla de Sri Lanka, Unión de Myanmar, Península de Malaca.

***Chamaedorea castaricana*** Oerst., Pacaya De México a Panamá.

***Chamaedorea cataractarum*** Mart. = *C. atrovirens* H. Wendl., México.

***Chamaedorea elegans*** Mart., México, Guatemala, Belice.

***Chamaedorea ernesti-augusti*** H. Wendl., México.

***Chamaedorea metallica*** O. F. Cook ex H. E. Moore, *Arecaceae*. México.

***Chamaedorea seifrizii*** Burret = *C. erumpens* H. E. Moore, México, Guatemala, Belice, Honduras.

***Chamaedorea tepejilote*** Liebm., México

***Chamaerops humilis*** L., Región mediterránea occidental.

***Chamaerops humilis*** L. var. ***argentea*** André = *C. humilis* var. *cerifera* Becc., Marruecos, Sahara.

***Chambeyronia macrocarpa*** (Brongn.) Vieill. ex Becc. = *Kentiopsis macrocarpa* Brongn., Nueva Caledonia (E Australia).

***Coccothrinax crinita*** (Griseb. & H. Wendl. ex C.H. Wright) Becc., Palmera petate. Cuba.

***Copernicia alba*** Morong, Caradá, Caranday. Brasil, Bolivia, N Argentina, Paraguay.

*Dictyosperma album* (Bory) Scheff. = *Linoma alba* (Bory) O. F. Cook, Islas Mascareñas.

*Dypsis decaryi* (Jum.) Beentje & J. Dransf. = *Neodypsis decaryi* Jum., Palmera triángulo. Madagascar.

*Dypsis lutescens* (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. = *Chrysalidocarpus lutescens* H. Wendl. = *Areca lutescens* Bory, Madagascar.

*Gaussia maya* (O. F. Cook) H. J. Quero & Read = *Opsiandra maya* O. F. Cook, México, Belice, Guatemala.

*Howea belmoreana* (C. Moore & F. Muell.) Becc. = *Kentia belmoreana* C. Moore & F. Muell., *Kentia*, *Kencia*. Isla de Lord Howe (Australia).

*Howea forsteriana* (F. Muell.) Becc. = *Kentia forsteriana* F. Muell., Isla de Lord Howe (Australia).

*Hyphaene coriacea* Gaertn., S África.

*Jubaea chilensis* (Molina) Baill. = *J. spectabilis* Kunth, Palmera de Chile, palma de miel. C Chile.

*Livistona australis* (R. Br.) Mart., *Livistona* de Australia. E Australia.

*Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. ex Mart., *Livistona* de China, Palmera china de abanico. E China, Islas Ryu Kyu (Japón), Islas Bonin.

*Livistona decora* (W. Bull) Dowe = *L. decipiens* Becc., Queensland (Australia).

*Livistona muelleri* F. M. Bailey, Palmera abanico enana. NE Queensland (Australia).

*Livistona nitida* Rodd, C Queensland (Australia).

*Livistona saribus* (Lour) Merr. ex A. Chev. = *L. hoogendorpii* Teijsm. et Binn. ex Miq., SE Asia.

***Nannorrhops ritchieana*** (Griff.) Aitch. = *Chamaerops ritchieana* Griff., Palmera mazari, Palmito de Pakistán. Pakistán, Afganistán, Irán, Península de Arabia.

***Phoenix canariensis*** Chabaud, Palmera de Canarias. Islas Canarias (España).

***Phoenix dactylifera*** L., Palmera datilera. N África, O Asia.

***Phoenix reclinata*** Jacq., Palmera datilera del Senegal. África tropical y subtropical.

***Phoenix roebelenii*** O' Brien, Palmera pigmea, Palmera datilera enana. Laos, Vietnam y SO China.

***Phoenix rupicola*** T. Anderson, Datilera de las rocas. Himalaya (India), Butan.

***Phoenix sylvestris*** (L.) Roxb., Datilera silvestre. India y Pakistán.

***Phoenix theophrasti*** Greuter, Palmera de Creta. Creta y Turquía.

***Pritchardia hillebrandii*** Becc., Islas Hawai (EE UU).

***Pseudophoenix sargentii*** H. A. Wendl. ex Sargent., Palmera bucanera. México, Belice, Florida, Bahamas, Cuba, La Española, Dominica.

***Ravenea glauca*** Jum. & Perrier, *Arecaceae*. C y S Madagascar.

***Ravenea xerophilla*** Jum., S Madagascar.

***Rhapidophyllum hystrix*** (Fraser ex Thouin) H.Wendl. & Drude = *Chamaerops hystrix* (Fraser ex Thouin) Pursh, Palmera con agujas. SE EE UU.

***Rhapis excelsa*** (Thunb.) Henry, Palmerita China. China.

***Rhapis humilis*** Blume, China.

***Rhapis multifida*** Burret, Palmera dedo. S China.

***Roystonea regia*** (Kunth) O. F. Cook = *R. ventricosa* C. H. Wright = *R. jenmanii* (C.H. Wright) Burret, Palmera real cubana. Cuba.

***Sabal bermudeana*** L.H. Bailey, Bermuda palmeto. Islas Bermudas (Reino Unido).

***Sabal causiarum*** (O. F. Cook) Becc. = *S. haitensis* Becc. ex Martelli, Palma de sombrero. S Isla La Española, Puerto Rico.

***Sabal domingensis*** Becc., Palma cana. Isla la Hispaniola (Haiti y Republica dominicana).

***Sabal mauritiiformis*** (H. Karst.) Griseb. & H. Wendl. = *S. allenii* L. H. Bailey, C México, Belice, N Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y Trinidad.

***Sabal mexicana*** Mart. = *S. texana* (O.F.Cook) Becc., Palma de sombrero, Palma llanera. México, S Tejas (EE UU).

***Sabal minor*** (Jacq.) Pers., Palmito enano, Palmito de los pantanos. SE EE UU.

***Sabal palmetto*** (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult f., Palmito de Florida. SE EE UU, Cuba.

***Saribus rotundifolius*** (Lam.) Blume = *L. rotundifolia* (Lam.) Mart., Islas Filipinas, Islas Célebes, Islas Molucas.

***Serenoa repens*** (W. Bartram) Small = *S. serrulata* (Michx.) Hook.f. ex B.D.Jacks., Palmito aserrado. SE EE UU.

***Syagrus amara*** (Jacq.) Mart., Pequeñas Antillas.

***Syagrus coronata*** (Mart.) Becc., Licuri. Brasil.

***Syagrus romanzoffiana*** (Cham.) Glassman = *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc., Palmera reina. De Brasil a Argentina.

***Syagrus schizophylla*** (Mart.) Glassman = *Arikuryroba schizophylla* (Mart.) L. H. Bailey, Aricuriroba. Brasil.

***Trachycarpus fortunei*** (Hook.) H. Wendl. = *Chamaerops fortunei* Hook., Palmito elevado, Palmito elevado chino, Palmera china de abanico. N La Unión de Myanmar, C, E China.



*Trachycarpus martianus* (Wall. ex Mart.) H. Wendl. = *T. khasyanus* (Griff.) H. Wendl., Palmito elevado de Martius. E Himalaya, N La Unión de Myanmar.

*Trithrinax acanthocoma* Drude, Carandaí. S Brasil y Paraguay.

*Trithrinax campestris* (Burmeist) Drude & Griseb., Saro, Caranday. Argentina, O Uruguay.

*Washingtonia filifera* (Linden ex André) H. Wendl. ex de Bary, Palmera de abanico californiana, Palmera con enaguas. California, Arizona (SO EE UU), Baja California (México).

*Washingtonia robusta* H. Wendl., Palmera de abanico mejicana. Baja California y Sonora (NO México).

*Wodyetia bifurcata* A. K. Irvine, Palmera de cola de zorro. NE Queensland (Australia)

### Aristolochiaceae

*Aristolochia baetica* L., *Aristolochia*. S Península Ibérica, N África.

*Aristolochia gigantea* Mart., Brasil.

*Aristolochia grandiflora* Sw., *Aristolochiaceae*. Flor del pelícano. Caribe.

*Aristolochia littoralis* Parodi, Brasil.

### Asparagaceae

*Agave americana* L. 'Stricta', Origen hortícola.

*Agave americana* L. var. *marginata* Trel., México.

*Agave americana* L. var. *mediopicta* Trel. 'Alba', México.

*Agave americana* L. var. *mediopicta* Trel., México.

*Agave americana* L., México.

- Agave attenuata* Salm-Dyck, C México.
- Agave bracteosa* S. Watson ex Engelm., NE México.
- Agave colorata* Gentry, , Mescal ceniza. NE México.
- Agave decipiens* Baker, Falso sisal. Florida (EEUU).
- Agave desmettiana* Jacobi 'Marginata', Origen hortícola.
- Agave desmettiana* Jacobi, Sinaloa (México).
- Agave filifera* Salm-Dyck, México.
- Agave fourcroydes* Lem., Yucataán (México).
- Agave ghiesbreghtii* Lem. ex Jacobi = *A. purpusorum* A. Berger, SE México, Guatemala.
- Agave guadalajarana* Trel., Jalisco (México).
- Agave guiengola* Gentry, Oaxaca (México).
- Agave gypsophila* Gentry, México.
- Agave horrida* Lem. ex Jacobi subsp. *perotensis* Ullrich, Perote, Veracruz, Zacatepec (México).
- Agave karwinskii* Zucc., C México.
- Agave mitis* Mart. var. *albidior* (Salm-Dyck) B.Ullrich, Hidalgo (México).
- Agave ovatifolia* G.D. Starr & Villareal, Nuevo León (México).
- Agave potatorum* Zucc. = *A. potatorum* var. *verschaffeltii* 'Minor' (Lem. ex Jacobi) A.Berger Zucc., Mexico.
- Agave pumila* De Smet ex baker, México.
- Agave salmiana* Otto ex Salm-Dyck var. *ferox* ( K.Koch ) Gentry, México.
- Agave stricta* Salm-Dyck 'Nana', Origen hortícola.
- Agave stricta* Salm-Dyck, México.

*Agave utahensis* Engelm var. *eborispina* (Hester) Breitung,  
California (EEUU).

*Agave victoria-reginae* T. Moore, México.

*Agave vivipara* L. = *A. angustifolia* Haw., Costa Rica, México.

*Agave weberi* J.F.Cels ex J.Poiss., México.

*Asparagus albus* L., O, C Región mediterránea.

*Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop `Sprengeri´, Esparraguera  
basta. Origen hortícola.

*Asparagus falcatus* L., De S, E África a India.

*Asparagus setaceus* (Kunth) Jessop = *A. plumosus* Baker,  
Esparraguera fina. S África.

*Beaucarnea recurvata* Lem. = *Nolina recurvata* (Lem.) Hesml.,  
México.

*Chlorophytum comosum* (Thunb.) Jacques var. *variegatum*, Origen  
hortícola.

*Chlorophytum filipendulum* subsp. *amaniense* (Engl.) & A.D.  
Poulsen = *C. amaniense* Engl., E África.

*Cordyline australis* (G. Forst.) Endl., Nueva Zelanda.

*Cordyline fruticosa* (L.) A. Chev. = *C. terminalis* (L.) Kunth, E asia  
Tropical a Polinesia.

*Cordyline indivisa* (G. Forst.) Endl. = *Dracaena indivisa* G. Forst.,  
Nueva Zelanda.

*Dasyilirion longissimum* Lem, Junquillo, varacuate. México.

*Dasyilirion serratifolium* (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Zucc.,  
México.

*Deuterocohnia brevifolia* (Griseb.) M.A.Spencer & L.B.Sm. =  
*Abromeitiella brevifolia* (Griseb.) A.Cast., Argentina, Bolivia.

*Dracaena cinnabari* Balf.f., Arch. Socotra en Yemen.

*Dracaena draco* (L.) L., Drago de Canarias. Tenerife (Islas Canarias), Madeira.

*Dracaena reflexa* Lam. = *Pleomele reflexa* (Lam.) N. E. Br., Madagascar, Islas Mauricio (Islas Mascareñas).

*Dracaena tamaranae* Marrero Rodr., R.S. Almeida & Gonzales.-Martin, Islas Canarias (España).

*Furcraea foetida* (L.) Haw., Caribe, C América.

*Furcraea selloa* K. Koch, Falso ágave. México, Guatemala, Colombia.

*Hesperaloe parviflora* (Torr.) J.M. Coult., Texas (EEUU).

*Hesperoyucca whipplei* (Torr.) Trel. = *Yucca whipplei* Torr., S California, baja California.

*Ledebouria socialis* (Baker) Jessop = *Scilla socialis* Baker = *Scilla violacea* Hutch., S África.

*Liriope muscari* (Decne.) L. H. Bailey = *L. graminifolia* (L.) Baker var. *densiflora* Maxin. ex Baker = *Ophiopogon muscari* Decne., China.

*Liriope muscari* (Decne.) L. H. Bailey var. *variegata* (Bailey) H. Hara, China, Japón.

*Muscari parviflorum* Desf., Nazareno de otoño. SE de España e Islas Baleares.

*Nolina longifolia* (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Hemsl. = *Dasylyrion longifolium* (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Zucc., Norteamérica.

*Ophiopogon jaburan* (Siebold) Lodd. `Vitatus`, Origen hortícola.

*Ophiopogon japonicus* (Thunb.) Ker Gawl., Hierba de las turquesas. China, Corea, Japón.

*Ophiopogon planiscapus* Nakai `Niger`, Origen hortícola.

*Ophiopogon planiscapus* Nakai, Japón.

*Ornithogalum narbonense* L., S Europa.

*Ruscus aculeatus* L., Rusco, Brusco. Región mediterránea, O Europa.

*Ruscus hypoglossum* L., Aureolas. De Italia y República Checa a Turquía.

*Sansevieria cylindrica* Bojer ex Hook., Angola.

*Sansevieria raffillii* N.E.Br., África tropical.

*Sansevieria trifasciata* Prain var. *laurentii* (de Willd.) N.E.Br., África.

*Scilla peruviana* L., Jacinto del Perú. Región mediterránea.

*Veltheimia capensis* (L.) DC., E Sudáfrica.

*Yucca aloifolia* L. 'Variegata', Origen hortícola.

*Yucca aloifolia* L., Yuca, Yuca pinchona, Bayoneta española. México.

*Yucca baccata* Torr., Banana yuca. So EE UU.

*Yucca brevifolia* Engelm., Árbol de Joshua. De California a Utah (EEUU).

*Yucca carnerosana* (Trel.) Mckelvey, Daga española. NO México, O Texas.

*Yucca faxoniana* Sarg., Bayoneta española. O Texas, N México.

*Yucca filifera* Chabaud, Palma chica, Izote. Centroamérica, México.

*Yucca gigantea* Lem. = *Y. guatemalensis* Bak., Yuca fina, Pata de elefante. México, Guatemala.

*Yucca gloriosa* L var. *variegata* Belg. Hort, EE UU.

*Yucca gloriosa* L, Daga española. SE EEUU.

*Yucca querataroensis* Pina, México.

*Yucca rigida* (Engelm.) Trel., Yuca azul. México.

*Yucca rostrata* (Engelm.) Trel. = *Y. linearis* (Trel.) D.J. Ferguson,  
Tejas, N México.

*Yucca thompsoniana* Trel., SO Texas.

*Yucca treculeana* Carrière, Daga española, Palma pita. S,C Texas, O  
México.

### Asphodelaceae

*Kniphofia uvaria* (L.) Oken, África.

### Aspleniaceae

*Asplenium antiquum* Maquino 'Chrissie', Origen hortícola.

*Asplenium bulbiferum* G. Forst., Nueva Zelanda, Australia.

*Asplenium nidus* L. 'Leslie', Origen hortícola.

*Asplenium nidus* L. 'Osaka', Origen hortícola

*Asplenium nidus* L., Helecho nido de ave. India, Australia, Japón.

### Balsaminaceae

*Impatiens hawkeri* W. Bull, Impatiens de Nueva Guinea. Nueva  
Guinea.

### Begoniaceae

*Begonia bowerae* Ziesenh., Begonia. México.

*Begonia cucullata* Willd. = *B. semperflorens* Link & Otto, Begonia  
de flor. Brasil, Paraguay, N Argentina.

*Begonia rex* Putz. 'hybrida', Origen hortícola.

*Begonia x hybrida* auct. 'Dragon wing', Origen hortícola.

*Begonia x ricinifolia* Dietr., *Begoniaceae*. Origen hortícola.

### *Berberidaceae*

*Berberis aquifolium* Pursh = *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt.,  
Uvas de Oregón. EE UU.

*Berberis thunbergii* DC. `Atropurpurea`, Agracejo púrpura. Origen  
hortícola.

*Nandina domestica* Thunb., Japón, C China.

### *Bignoniaceae*

*Bignonia capreolata* L. = *Doxantha capreolata* (L.) Miers,  
Bignonia. S Ontario (Canadá), E EE UU.

*Campsis grandiflora* (Thunb.) K. Schum., Trompeta china. China.

*Campsis radicans* (L.) Seem = *Bignonia radicans* L. = *Tecoma  
radicans* (L.) Juss., Bignonia roja, Trompeta trepadora. C América,  
SE Iowa, Tejas (EE UU).

*Campsis x tagliabuana* (Vis.) Rehder, Trompeta trepadora. Origen  
hortícola.

*Catalpa bignonioides* Walter, Catalpa. SE EE UU.

*Chilopsis linearis* (Cav.) Sweet, Sauce del desierto. California a  
Texas y México.

*Clytostoma callistegioides* (Cham.) Baill., Dama del monte.  
Argentina, S Brasil.

*Delostoma integrifolia* D. Don = *D. speciosum* (H. Karst. et Triana)  
K. Schum. ex B.D. Jacks., Perú.

*Dolichandra unguis-cati* (L.) L.G. Lohmann = *Macfadyena unguis-  
cati* (L.) A. H. Gentry, e México a Argentina.

*Jacaranda mimosifolia* D. Don = *J. ovalifolia* R. Br., Jacaranda,  
Palo santo. NO Argentina.

*Kigelia africana* (Lam.) Benth. = *K. pinnata* (Jacq.) DC., Árbol de las salchichas. África.

*Mansoa alliacea* (Lam.) A.H.Gentry, Flor de Ajo. Amazonia.

*Markhamia lutea* (Benth.) k. Schum., Tulipero amarillo. África.

*Pandorea jasminoides* (Lindl.) K. Schum. = *Tecoma jasminoides* Lindl., Bignonia blanca. Australia.

*Pandorea pandorana* (Andrews) Steenis = *Bignonia australis* (R. Br.) Aiton = *Bignonia pandorana* Andrews, Arbusto de Pandora. Malaysia, Australia.

*Podranea ricasoliana* (Tanfani) Sprague, Bignonia rosa. S África.

*Pyrostegia venusta* (Ker-Gawl.) Miers = *P. ignea* (Vell.) C. Presl, Brasil, Paraguay.

*Spathodea campanulata* P. Beauv., Tulipero del Gabón. C África.

*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC., Apamate, Roble negro. De México a Venezuela, Ecuador.

*Tecoma capensis* (Thunb.) Lindl. = *Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach, S África.

*Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth, De Florida a México.

### *Blechnaceae*

*Blechnum gibbum* Mett., Nueva Caledonia.

*Woodwardia prolifera* Hook. & Arn., China, Japón y el Himalaya.

### *Boraginaceae*

*Anchusa azurea* Mill., Región mediterránea.

*Cynoglossum creticum* Mill., S Europa.

*Echium aculeatum* Poir., Tenerife; Gomera, Hierro (Islas Canarias).



*Echium callithyrsum* Webb & Bolle, Taginaste azul. Gran Canaria (Islas Canarias).

*Echium candicans* L. f. = *E. fastuosum* Jacq., Plumero azul. Madeira (Portugal).

*Echium plantagineum* L., S, O Europa.

*Glandora nitida* (Ern) D.C. Thomas = *Lithodora nitida* (Ern) R. Fern., S de la Península Ibérica. Sierra Mágina, Trevenque-Almijara (alcanza las sierras de Horconera y Rute, Córdoba).

*Heliotropium arborescens* L. = *H. peruvianum* L., Heliotropo, Vainilla de jardín. Perú.

*Heliotropium europaeum* L., S, C Europa, O Asia, N África.

### Brassicaceae

*Alyssum serpyllifolium* Desf. subsp. *malacitanum* Rivas Goday, S<sup>a</sup> Bermeja, Serranía de Ronda (Málaga).

*Coronopus didymus* (L.) Sm., Europa.

*Erysimum myriophyllum* Lange, Sierras de Tejada y Almijara (Málaga), sierras de la mitad occidental de Granada y Serranía de Cazorla (Jaén).

*Sinapis alba* L. = *Brassica hirta* Moench, Europa, N África, O Asia.

*Sisymbrium officinale* (L.) Scop., Europa, N África, oriente próximo.

*Biscutella auriculata* L., Península Ibérica, Marruecos, Argelia.

*Biscutella baetica* Boiss & Reut., SO España, NO África

*Capsella bursa-pastori* (L.) Medik., Europa.

*Crambe filiformis* Jacq., S España, N África.

*Diplotaxis eruroides* (L.) DC., Región mediterránea, C Europa, W Asia.

*Diplotaxis virgata* (Cav.) DC., Península Ibérica.

*Iberis sempervirens* L., Región mediterránea.

*Lobularia maritima* (L.) Desv. = *Alyssum maritimum* (L.) Lam., S  
Europa.

### **Bromeliaceae**

*Acanthostachys strobilacea* (Link) Klotzsch & Otto, Brasil, N  
Argentina.

*Aechmea brazil* Witt. 'Brazil', Origen hortícola.

*Aechmea blanchetiana* (Baker) L.B.Sm., Brasil.

*Aechmea blanchetiana* (Baker) L.B.Sm. 'Orange', Origen hortícola.

*Aechmea bromeliifolia* (Rudge) Baker, America tropical.

*Aechmea caudata* Lindm. = *A. caudata* f. *albiflora* W. Weber &  
Roeth, Brasil.

*Aechmea coelestis* (K.Koch) E.Morren = *A. coelestis* var. *coelestis*,  
Brasil.

*Aechmea distichantha* Lem., N Argentina, Paraguay, Uruguay.

*Aechmea fasciata* (Lind.) Baker Morgana', Origen hortícola

*Aechmea fasciata* (Lindl.) Baker 'Morgana', Origen hortícola.

*Aechmea fasciata* (Lindl.) Baker = *Billbergia fasciata* Lindl. = *B.*  
*rhodocyanea* Lem., Brasil.

*Aechmea gamosepala* Wittm., Brasil.

*Aechmea mcvanghii* L. B. Sm. = *Ursalaea mcvanghii* (L.B. Sm.)  
Read & Baensch, México.

*Aechmea* Ruiz & Pav. 'Blue rain', Origen hortícola.

*Aechmea weberbaueri* Harms, América tropical.

*Aechmea werdermannii* Harms, Brasil.

*Ananas comosus* (L.) Merr., Piña. América del Sur.

*Billbergia nutans* H.Wendl. ex Regel, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina.

*Billbergia sp.* Thunb.

*Billbergia zebrina* (Herb.) Lindl., Brasil.

*Catopsis paniculata* E. Morren, Costa Rica, México.

*Cryptanthus bivittatus* (Hook.) Regel., Brasil.

*Cryptanthus praetextus* E.Morren ex Baker, Brasil.

*Dyckia brevifolia* Baker, Brasil.

*Fosterella penduliflora* (C.H. Wright) L.B. Sm., Argentina, Bolivia, Perú.

*Guzmania dissitiflora* (André) L. B. Sm., América tropical.

*Guzmania donnellsmithii* Mez ex Donn.Sm., Costa Rica, Panamá; Nicaragua, Ecuador.

*Guzmania lingulata* (L.) Mez, C América, Perú, Brasil.

*Guzmania monostachia* (L.) Rusby ex Mez, México, S América.

*Guzmania sp.* Ruíz & Pav. 'Pasion', Origen hortícola.

*Guzmania sp.* Ruíz & Pav. 'Torch', Origen hortícola.

*Guzmania sp.* Ruíz & Pav. De Florida a América tropical.

*Neoregelia carolinae* (Beer) L. B. Sm., Brasil.

*Neoregelia* L.B. Sm. 'Jill', Origen hortícola.

*Neoregelia* L.B. Sm. 'Fireball', Origen hortícola.

*Neoregelia sp* L.B. Sm. 'Hannibal Lecter', Origen hortícola.

*Orthophytum sanctum* L.B. Sm., Brasil.

*Pitcairnia altensteinii* (Link, Klotzsch & Otto) Lem., Venezuela.

*Pitcairnia heterophylla* (Lindl.) Beer, Costa Rica, México, Venezuela, Ecuador.

*Puya venusta* (Baker) Phil, Chile.

*Tillandsia aeranthos* (Loisel.) L. B. Sm., Brasil. Argentina.

*Tillandsia albertiana* Verv., Argentina.

*Tillandsia andreana* E. Morren ex André, Colombia.

*Tillandsia argentea* Griseb., Cuba.

*Tillandsia baileyi* Rose ex Small, S. Texas (EEUU), Tamaulipas (México).

*Tillandsia balbisiana* Schult. & Schult. f., Florida (EEUU).

*Tillandsia bergeri* Mez, Argentina.

*Tillandsia brachycaulos* Schldtl. var. *abdida*, México, Venezuela, Panamá.

*Tillandsia bulbosa* Hook., México. Colombia. Brasil.

*Tillandsia butzii* Mez, Costa Rica, México.

*Tillandsia caliginosa* W. Till = *T. crocata* var. *tristis* Rauh, Bolivia, Argentina.

*Tillandsia capitata* Griseb 'Peach', República Dominicana, Cuba, México.

*Tillandsia crispa* (Baker) Mez = *Racinaea crispa* (Baker) M.A. Spencer & L.B. Sm., Colombia.

*Tillandsia cyanea* Linden ex K. Koch., Ecuador.

*Tillandsia disticha* Kunth, Colombia, Ecuador, Perú.

*Tillandsia fasciculata* Sw., México, Brasil.

*Tillandsia filifolia* Schldtl. & Cham., México, Costa Rica.

*Tillandsia fuchsii* W. Till var. *argentea*, México.

*Tillandsia fuchsii* W. Till, Oaxaca (México).

*Tillandsia gardneri* Lindl., Brasil, Venezuela.

*Tillandsia harrisii* Ehlers, Guatemala.

*Tillandsia juncea* (Ruiz & Pav.) Poir 'Juncifolia' Regel, Origen hortícola.

*Tillandsia kolbii* W. Hill & Schatzl, México.

*Tillandsia* L 'Samantha', O Mexico.

*Tillandsia magnusiana* Wittm., México, Guatemala, Honduras.

*Tillandsia mallemonitii* Glaz. ex Mez, Brasil.

*Tillandsia mauryana* L.B. Sm., México.

*Tillandsia montana* Reitz, Brasil.

*Tillandsia neglecta* E. Pereira, Brasil.

*Tillandsia oaxacana* L.B. Sm., México.

*Tillandsia pohliana* Mez, Brasil.

*Tillandsia reichenbachii* Baker, Bolivia, Argentina.

*Tillandsia schiedeana* Steud., Costa Rica, México, Venezuela.

*Tillandsia seleriana* Mez = *T. ehlersiana* Rauh, Chiapas (México).

*Tillandsia seleriana* Mez, México.

*Tillandsia streptophylla* Scheidw. ex E.Morren, México.

*Tillandsia stricta* Sol. ex Ker Gawl., Sudamérica.

*Tillandsia* sp. L., *Bromeliaceae*. Sudamérica.

*Tillandsia tectorum* E. Morren, Perú, Ecuador.

*Tillandsia tricolor* Schldl. & Cham. = *T. melanocrater* L. B. Sm., Guatemala, Costa Rica, Panamá.

*Tillandsia usneoides* (L.) L., Musgo español. De EE UU a Argentina.

*Tillandsia velutina* Ehlers, México.

*Tillandsia xerographica* Rohweder, Guatemala.

*Vriesea hieroglyphica* (Carrière.) E. Morr., Brasil.

*Vriesea procera* (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm., Brasil,  
Venezuela.

*Vriesea splendens* (Brongn.) Lem. = *Tillandsia splendens* Brongn.,  
Venezuela, Guayana, Trinidad y Tobago.

*Vriesea x poelmanii* Leon Duval, Origen hortícola.

### *Buxaceae*

*Buxus balearica* Lam., Boj. Cerdeña, Islas Baleares, N África, S  
España, S Turquía.

*Buxus sempervirens* L. = *B. colchica* Pojark. = *B. hyrcana* Pojark.,  
Boj común. C, S Europa, N África, SO Asia.

### *Cactaceae*

*Astrophytum myriostigma* Lem., Bonete de obispo. México.

*Astrophytum ornatum* (DC.) Britton. & Rose, México.

*Austrocylindropuntia subulata* (Muehlenpf.) Backeb. = *Opuntia*  
*subulata* (Muehlenpf.) Engelm., S Perú.

*Brasiliopuntia brasiliensis* (Willd.) A.Berger = *Opuntia brasiliensis*  
(Willd.) Haw., Brasil.

*Cactus muehlenpfordtii* Kuntze = *Mammillaria muehlenpfordtii*  
Foerster, Quanaajuato, Querétaro, San Luis de Potosi (México).

*Cactus sp* mix Juss., America del norte y del sur .

*Carnegiea gigantea* (Engelm.) Britton & Rose, Saguaro. Desierto de  
Sonora-Arizona (EEUU).

*Cereus jamacaru* DC., Brasil.

*Cereus repandus* (L.) Mill. = *C. peruvianus* (L.) Mill., Brasil, Argentina.

*Cereus repandus*(L.) Mill. 'Monstruosus', Origen hortícola.

*Cleistocactus hildegardiae* F. Ritter, Bolivia.

*Cleistocactus sp.* Lem., Perú, Uruguay, Bolivia, Argentina.

*Cleistocactus straussii* (Heese) Backeb. = *Borzicactus strausii* (Heese) A. Berger, Bolivia, Argentina.

*Cochemiea maritima* G.E. Linds. = *Mammillaria pondii* subsp. *maritima* (G.E. Linds.) D.R. Hunt, Costa del Pacífico de Baja California (México).

*Consolea moniliformis* (L.) A. Berger, Islas del Caribe, Florida.

*Copiapoa gigantea* Backeb., Chile.

*Copiapoa haseltoniana* Backeb., Chile.

*Copiapoa lembeckii* F. Ritter, Chile.

*Cryptocereus antiridaceaeonianus* Alexander, México.

*Cylindropuntia bigelovii* (Engelm.) F.M. Knuth = *Opuntia bigelovii* Engelm., México, California y Arizona.

*Cylindropuntia imbricata* (Haw.) F.M. Knuth = *Opuntia imbricata* (Haw.) DC., México.

*Cylindropuntia leptocaulis* (DC.) F.M. Knuth = *Opuntia leptocaulis* DC., De Oklahoma a Arizona, S México.

*Cylindropuntia rosea* (DC.) Backeb. = *O. pallida* Rose = *O. rosea* DC., Cactus rosa. México.

*Cylindropuntia rosea* (DC.) Backeb. = *Opuntia pallida* Rose, México.

*Cylindropuntia spinosior* (Engelm.) F.M.Knuth = *Opuntia spinosior* (Engelm.) Toumey, Arizona, Nuevo México, N México.

*Cylindropuntia tunicata* (Lehm.) F.M.Knuth = *Opuntia tunicata* (Lehm.) Pfeiff., Desierto Arizona (México).

*Disocactus nelsonii* (Britton. & Rose) Linding., México.

*Echinocactus grusonii* Hildm. 'Brevispinus' Y. Ito, Origen hortícola.

*Echinocactus grusonii* Hildm. var. *albispina*, México.

*Echinocactus grusonii* Hildm., Asiento de suegra. México.

*Echinocactus platyacanthus* Link & Otto = *E. ingens* Zucc. ex Pfeiff., México.

*Echinocereus pectinatus* (Scheidew.) Engelm., N México.

*Echinocereus pentalophus* (DC.) Lem., México.

*Echinocereus sp.* Engelm., SE EEUU, México.

*Echinocereus triglochidiatus* Englm., Nuevo México.

*Echinopsis camarguensis* (Cárdenas) Friedrich & G.D.Rowley, Bolivia.

*Echinopsis huascha* (Web.) Friedrich & G.D.Rowley = *Trichocereus huascha* (F.A.C. Weber) Britton & Rose, Argentina.

*Echinopsis huascha* (Web.) Friedrich & Rowley, Argentina.

*Echinopsis multiplex* (Pfeiff.) Zucc., S Brasil.

*Echinopsis schickendantzii* F.A.C.Weber, Tucumán (Argentina).

*Echinopsis scopulicola* (F. Ritter) Mottram, Bolivia.

*Echinopsis sp.* Zucc, Sudamérica.

*Echinopsis subdenudata* Cárdenas, Bolivia, Paraguay.

*Echinopsis terscheckii* (Parm.) Friedrich & G.D.Rowley, Argentina, Bolivia.

*Epiphyllum anguliger* (Lem.) G.Don, México.

*Epiphyllum crenatum* (Lindl.) G. Don, De México a Honduras.



*Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw., México y Guatemala.

*Epithelantha micromeris* (Engelm.) F.A.C. Weber ex Britton & Rose, O Texas a N México.

*Eriosyce subgibbosa* subsp. *clavata* (Söhrens ex K.Schum.) Katt. =  
*Neoporteria nigrihorrida* Backeb., Costa de Chile.

*Espostoa guentheri* (Kupper) Buxb., E Bolivia.

*Espostoa lanata* (Kunth) Britton & Rose, N Perú.

*Espostoa sp.* Britton & Rose, Desde los Andes hasta el S Ecuador,  
Perú.

*Ferocactus chrysacanthus* (Orcutt) Britton & Rose, México.

*Ferocactus emoryi* subsp. *rectispinus* (Engelm.) N.P. Taylor = *F.*  
*rectispinus* (Engelm.) Britton & Rose, Baja California (México).

*Ferocactus glaucescens* (DC) Britton & Rose var. *nudum*, Origen  
hortícola.

*Ferocactus glaucescens* (DC.) Britton & Rose, Cactus de barril azul.  
México.

*Ferocactus gracilis* H.E.Gates, México.

*Ferocactus gracilis* subsp. *coloratus* (H.E.Gates) N.P.Taylor = *F.*  
*coloratus* H.E. Gates, Baja California (México).

*Ferocactus gracilis* subsp. *gatesii* (G.E. Linds) N.P. Taylor =  
*Ferocactus gatesii* G.E. Linds., Baja California (México).

*Ferocactus herrerae* J.G. Ortega, México.

*Ferocactus histrix* (DC.) G.E. Linds., México central.

*Ferocactus macrodiscus* (Mart.) Britton & Rose, San Luis de Potosí,  
Guanajuato, Querétaro, Puebla, Oaxaca (México).

*Ferocactus peninsulae* (A.A.Weber) Britton & Rose = *F. horridus*  
Britton & Rose, Baja California (México).

*Ferocactus pilosus* (Galeotti ex Salm-Dick) Werder = *F. stainesii* var. *pringlei* (J.M. Coult.) Backeb., San Luis de Potosí, Zacatecas, Coahuila (México).

*Ferocactus recurvus* (Mill.) Borg = *F. latispinus* (Haw.) Britton & Rose, Lengua del demonio. E,C México.

*Ferocactus schwarzii* G.E. Linds., Sinaloa (México).

*Gymnocalycium baldianum* (Speg.) Speg., Argentina.

*Gymnocalycium horstii* Buining, Uruguay, E Paraguay, S Brasil, N Argentina.

*Gymnocalycium saglionis* (Cels) Britton & Rose, Argentina.

*Hattoria salicornioides* Britton. & Rose f. (F.A.C. Weber) Supplie, Brasil.

*Hattoria salicornioides* Britton. & Rose, Brasil.

*Hylocereus escuintlensis* Kimmach, Guatemala.

*Hylocereus sp* (A. Berger) Britton & Rose, América tropical.

*Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose, Dama de la noche. C América.

*Lepismium cruciformis* (Vell.) Miq. = *Rhypsalis cruciformis* (Vell.) A. Cast., Argentina, Brasil.

*Leuchtenbergia principis* Hook., México.

*Mammillaria albescens* Tiegel subsp. *maritimus*, México.

*Mammillaria albicans* (Britton & Rose) Berger., Baja California.

*Mammillaria albicans* subsp. *fraileana* (Britton & Rose) D.R. Hunt. = *M. fraileana* (Britton & Rose) Boed., México.

*Mammillaria albilanata* Backeb subsp. *oaxacana* D.R. Hunt, Oaxaca (México).

*Mammillaria albilanata* Backeb, México.

*Mammillaria apozolensis* Repp. var. *saltensis* Repp, México, Zacatecas.

- Mammillaria bachmannii* Boed. ex Berger, México.
- Mammillaria backebergiana* F.G. Buchenau subsp. *ernestii* (Fittkan) Hunt, Guerrero (México).
- Mammillaria backebergiana* F.G. Buchenau, México.
- Mammillaria blossfeldiana* Boed., Baja California , México.
- Mammillaria bocasana* Poselg. = *M. bocasana* subsp. *bocasana*, San Luis de Potosi (México).
- Mammillaria bocasana* Poselg., San Luis de Potosi (México).
- Mammillaria bocasana* subsp. *eschauzieri* (J.M. Coult.) Fitz Maurice & B. Fitz Maurice = *M. hirsuta* Boed., San Luis de Potosi, Zacatecas (México).
- Mammillaria boelderiana* Wohlschl., México, Zacatecas.
- Mammillaria bombycina* Quehl, México.
- Mammillaria boolii* G.E. Linds., México
- Mammillaria bravoae* R.T. Craig subsp. *maritimus*, México.
- Mammillaria carnea* Zucc. ex Pfeiff., México: Puebla.
- Mammillaria chica* Repp., Durango (México).
- Mammillaria columbiana* (Werd.) Dugand var. *bogotensis*, Colombia, Venezuela.
- Mammillaria compressa* DC., México.
- Mammillaria confusa* Orcutt, México.
- Mammillaria crinita* DC., México.
- Mammillaria crinita* subsp. *scheinvariana* (R. Ortega & Glass in Glass) Fitz Maurice & B. Fitz Maurice = *M. scheinvariana* Ortega-Varela & Glass in Glass, Queretaro, Hidalgo (México).
- Mammillaria crinita* subsp. *wildii* (A. Dietr.) D.R. Hunt = *M. wildii* Dietr., Hidalgo (México).

*Mammillaria crucigera* Mart., México.

*Mammillaria diacentra* Jacobi, México.

*Mammillaria dixanthocentron* Backeb., México: Puebla, Oaxaca.

*Mammillaria duoformis* R.T. Craig & E.Y. Dawson, Puebla,  
Oaxaca, Morelos (México).

*Mammillaria eichlamii* Quehl = *M. voburnensis* var. *eichlamii*  
(Quehl) Repp., Honduras, Chiapas (México).

*Mammillaria elongata* DC., C México.

*Mammillaria erythrosperma* Boed. var. *robusta*, México.

*Mammillaria evermanniana* (Britton & Rose) Orcutt, Isla Cerralvo  
(México).

*Mammillaria flavicentra* f. *hamata*, *Cactaceae*. Puebla (México).

*Mammillaria flavescens* var. *nivosa* (Link ex Pfeiff.) Backeb, Cactus  
Pezón Lanudo. Caribe y Puerto Rico.

*Mammillaria geminispina* Haw., México.

*Mammillaria glassii* R.A. Foster, Nuevo León, Coahuila,  
Tamaulipas (México).

*Mammillaria gracilis* Pfeiff. = *M. vetula* subsp. *gracilis* (Pfeiff.)  
D.R. Hunt, Hidalgo, Queretaro, Guanajuato (México).

*Mammillaria grahamii* Engelm. = *M. oliviae* Orcutt, México,  
Arizona, Nuevo México, Texas, California (EEUU).

*Mammillaria gueldemanniana* Bakeb., Sierra de Álamos, Sonora  
(México).

*Mammillaria guelzowiana* Werderm., Durango (México).

*Mammillaria guerreronis* (Bravo) Boed., México.

*Mammillaria haageana* Pfeiff. subsp. *conspicua* (J.A. Purpus) D.R.  
Hunt = *M. albidula* Backeb., Puebla, Morelos, Oaxaca (México).

*Mammillaria hahniana* Werdem. subsp. *mendeliana* (Bravo ) D.R.  
Hunt Neomammillaria mendeliana Bravo, Guanajuato (México).

*Mammillaria hahniana* Werdem. subsp. *woodsii* (R.T. Craig) D.R.  
Hunt, México.

*Mammillaria halhingeri* Boed., Oaxaca (México).

*Mammillaria heyderi* Muehlenpf., México.

*Mammillaria icamolensis* Boed., Nuevo León (México).

*Mammillaria karwinskiana* subsp. *beiselii* (Diers) D.R. Hunt = *M.*  
*beiselii* Diers, México.

*Mammillaria knippeliana* Quehl, México, Morelos.

*Mammillaria lloydii* (Britton & Rose) Orcutt, México, Zacatecas,  
San Luis de Potosí.

*Mammillaria longimamma* DC., México, EEUU.

*Mammillaria magnimamma* Haw. = *M. centricirrho* Lem. = *M.*  
*phymatothele* A. Berger, México.

*Mammillaria mammillaris* (L.) H. Karst., México, S EEUU, Antillas  
holandesas, Venezuela.

*Mammillaria marksiana* Krainz, C México.

*Mammillaria matudae* Bravo, Michoacan (México).

*Mammillaria mazatlanensis* K. Schum. = *M. mazatlanensis* subsp.  
*mazatlanensis* = *M. occidentalis* Boed., Sinaloa, Sonora, Jalisco,  
Colima., Michoacan (México).

*Mammillaria meyranii* Bravo, México.

*Mammillaria microhelia* Werderm., Queretaro (México).

*Mammillaria miegiana* W. Earle, México.

*Mammillaria multihamata* Boed. = *M. marcosii* Fitz Maurice, Fitz  
Maurice & Glass, México, Guanajuato.

*Mammillaria mystax* Mart., C México.

*Mammillaria nana* Backeb. subsp. **nana** = *M. monancistracantha* Backeb., Santa M<sup>a</sup> del Rio, san Luis del Potosi (México).

*Mammillaria nana* Backeb., Guanajuato (México).

*Mammillaria napina* J.A. Purpus, México.

*Mammillaria neocoronaria* F.M. Knuth, México.

*Mammillaria nunezii* subsp. **bella** (Backeb.) D.R. Hunt = *M. bella* Backeb., México, Guerrero.

*Mammillaria nunezii* subsp. **bella** (Backeb.) D.R. Hunt = *M. bella* Backeb. . México, Guerrero.

*Mammillaria ortegae* (Britton & Rose) Orcutt, México.

*Mammillaria pacifica* (H.E. Gates) Boed., S Baja California (México).

*Mammillaria parkinsonii* Ehrenb., México.

*Mammillaria pennispinosa* subsp. **nazasensis** (Glass & R. Foster) D.R. Hunt = *M. pennispinosa* var. *nazasensis* Glass & R. Foster, Coahuila, Durango (México).

*Mammillaria petterssonii* Hildm., México.

*Mammillaria polythele* Mart. = *M. hidalgensis* Purpus, Hidalgo, Queretaro, Guanajuato (México).

*Mammillaria prolifera* (Mill.) Haw. subsp **haitiensis** (K. Schum.) D.R. Hunt, México.

*Mammillaria prolifera* (Mill.) Haw., México, Texas (EEUU).

*Mammillaria rectispina* (E.Y. Dawson) Repp., Baja California, México.

*Mammillaria rekoi* Vaupel subsp. **leptocantha** (Lau) Hunt. var. **aurespina**, Oaxaca (México).

*Mammillaria rhodantha* Link & Otto = *M. rhodantha* Link & Otto subsp. *rhodantha*, Hidalgo, Michoacan, Queretano, Guanajuato (México).

*Mammillaria rhodantha* Link & Otto subsp. *mccartenii* Repp.,  
Michoacan, Zacatecas (México).

*Mammillaria roseoalba* Boed., México.

*Mammillaria schiedeana* Ehrenb. ex Schldl. = *M. schiedeana*  
subsp. *schiedeana* Ehrenberg., Hidalgo, Queretaro (México).

*Mammillaria schiedeana* Ehrenberg. subsp. *giselae* Lüthy,  
Tamaulipas (México).

*Mammillaria schiedeana* Ehrenberg., México.

*Mammillaria scrippsiana* (Britton & Rose) Orcutt var. *autlanensis*,  
México.

*Mammillaria setispina* Englm. ex J.M. Copult., Baja California.

*Mammillaria sheldonii* (Britton & Rose) Boed., Sonora, Chihuahua  
(México).

*Mammillaria sphacelata* Mart., Puebla, Oaxaca.

*Mammillaria sphacelata* subsp. *viperina* (J.A. Purpus) D.R. Hunt =  
*M. viperina* J.A. Purpus, México.

*Mammillaria spinosissima* Lem. subsp. *pilcayensis* (Bravo) D.R.  
Hunt, México.

*Mammillaria spinosissima* Lem. subsp. *spinossisima* = *M.*  
*gasterantha*, Morelos, Guerrero (México).

*Mammillaria spinosissima* Lem., var. *auricoma* 'Cristata', México.

*Mammillaria spinosissima* Lem., var. *auricoma* (A.Dietr.) Gürke,  
Morelos (México).

*Mammillaria tayloriorum* Glass. & R.A. Foster, México.

*Mammillaria varieaculeata* Bucheanu, Puebla (México).

*Mammillaria verhaertiana* Boed. = *M. phitauiana* (E.M. Baxter)  
Werderm., México.

*Mammillaria wagneriana* Boed., México.



*Mammillaria winterae* Boed., México.

*Mammillaria winterae* subsp. *aramberri* Hunt, Nuevo León (México).

*Mammillaria zeilmanniana* Boed. var. *alba*, Guanajuato (México).

*Marginatocereus marginatus* (DC.) Backeb. = *Pachycereus marginatus* (DC.) Britton & Rose, Organo, Jarritos. México central.

*Marginatocereus marginatus* (DC.) Backeb. = *Stenocereus marginatus* (DC.) A. Berger & Buxb., México.

*Matucana aureiflora* F. Ritter, Perú.

*Matucana madisoniorum* (Hutchison) G.D. Rowley, Perú.

*Melocactus conoideus* Biuning & Brederoo, Brasil

*Myrtillocactus geometrizans* (Mart. ex Pfeiff.) Console, México.

*Neomammillaria graessneriana* (Boed.) Britton & Rose = *Mammillaria graessneriana* Boed., Coahuila (México).

*Neoporteria napina* (Phil.) Backeb., Chile.

*Opuntia aciculata* Griffiths, Texas, N México.

*Opuntia articulata* (Pfeiff.) D.R. Hunt var. *inermis* Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backeb., Argentina.

*Opuntia engelmannii* Salm-Dyck ex Engelm., México, Arizona (EEUU).

*Opuntia engelmannii* var. *linguiformis* (Griffiths) B.D. Parfitt & Pinkava = *O. linguiformis* Griffiths, S de Tejas a San Antonio (EEUU).

*Opuntia ficus-indica* (L.) Mill., Chumbera, Tuna. México.

*Opuntia galapageia* Hemsl., Islas Galapagos (Ecuador).

*Opuntia macrocentra* Engelm. = *O. violacea* Engelm., México.

*Opuntia microdasys* subsp. *rufida* (Engelm.) U. Guzmán & Mandujano = *O. rufida* Engelm., Texas, N México.



*Opuntia monacantha* (Willd.) Haw., S Brasil, Paraguay.

*Opuntia picardoi* Marn.-Lap., N Argentina.

*Opuntia robusta* J.C. Wendl., Cholla. México central.

*Opuntia salmiana* Parm. ex Pfeiff., Brasil, Paraguay, Argentina.

*Opuntia santarita* (Griffiths & Hare) Rose = *O. violacea* var. *santarita* (Griffiths & Hare) L.D. Benson, De Texas a Arizona.

*Opuntia tomentosa* Salm-Dyck, México central.

*Oreocereus celsianus* (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob, Bolivia, Bolivia, NE Chile, SE Perú.

*Oreocereus fossulatus* (Labour.) Backeb., Chile, Perú, Argentina y Bolivia.

*Oreocereus leucotrichus* (Phil.) Wagenkn., *e.* Chile.

*Oreocereus trollii* Kupper, Viejo hombre de los Andes. S Bolivia, N Argentina.

*Ortegocactus macdougallii* Alexander, Oaxaca (México).

*Pachycereus pringlei* (S. Watson) Britton & Rose, México, Baja California.

*Parodia concinna* (Monv.) N. P. Taylor, Brasil.

*Parodia leninghausii* (Haage) F.H. Brandt, Balón dorado. Brasil, Argentina.

*Parodia magnifica* (F.Ritter) F.H. Brandt, Brasil

*Pereskia aculeata* Mill., América tropical.

*Pereskia diazromeroana* Cárdenas, Bolivia.

*Pereskia humboldtii* Britton & Rose var. *humboldtii*, O de S América.

*Pereskia marcanoi* Areces, De Brasil a Mexico.

*Pereskia sacharosa* Griseb., América tropical.

*Pereskia weberiana* K. Schum., Bolivia.

*Pfeiffera asuntapatense* (M. Kessler, Ibisch & Barthlott) Ralf Bauer  
= *Lepismium asuntapatense* M. Kessler, Ibisch & Barthlott, Bolivia.

*Pilosocereus azulensis* N.P.Taylor & Zappi, Brasil.

*Polaskia chende* Gibson & Horak, Oaxaca (México).

*Polaskia chichipe* (Grosselin) Backeb., México.

*Pseudorhipsalis ramulosa* (Salm-Dyck) Barthlott = *Disocactus ramulosus* (Salm-Dyck) Kimmach, De México a N Suramérica.

*Rebutia heliosa* Rausch, Bolivia.

*Rebutia pulvinosa* F. Ritter & Buininig, Bolivia.

*Rhipsalis agudoensis* N.P.Taylor, Rio Grande do Sul (Brasil).

*Rhipsalis angustissima* F.A.C. Weber = *Pseudorhipsalis ramulosa*  
(Salm-Dyck) Barthlott, Costa Rica.

*Rhipsalis baccifera* (J.S.Muell.) Stearn = *Rhipsalis coralloides*  
Rauh, América Centra, America del Sur, caribe, Florida (EEUU).

*Rhipsalis boliviana* (Britton) Lauterb. = *Lepismium bolivianum*  
(Britton) Barthlott, Bolivia.

*Rhipsalis cereoides* (Backeb. & Voll) Backeb., Brasil.

*Rhipsalis cereuscula* Haw., Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay,  
Argentina.

*Rhipsalis crispata* (Haw.) Pfeiff., Brasil.

*Rhipsalis ewaldiana* Barthlott & N.P.Taylor, Brasil.

*Rhipsalis hoelleri* Barthlott. & N.P. Taylor, Brasil.

*Rhipsalis mesembryanthemoides* Haw., Brasil.

*Rhipsalis neves-armondii* K.Schum., Brasil.

*Rhipsalis pachyptera* Pfeiff., Brasil.

*Rhipsalis paradoxa* (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck, Brasil.

*Rhipsalis pilocarpa* f. *pilocarpa* Loefgr., Brasil.

*Rhipsalis pilocarpa* Loefgr. f. *minima* Süpplie, Brasil.

*Rhipsalis rauhiorum* Barthlott, Perú, Ecuador.

*Rhipsalis sp.* Gaertn., América, África, Ceilán (Asia).

*Rhipsalis sulcata* F.A.C.Weber, Espirito santo (Brasil).

*Rhipsalis teres* f. *prismatica* (Vell.) Steud., Brasil.

*Rhipsalis sp.* Gaertn., C, S de América, Caribe.

*Schlumbergera truncata* (Haw.) Moran = *Zygocactus truncatus*  
(Haw.) K. Schum., Brasil.

*Selenicereus anthonyanum* (Alexander) D.R. Hunt., Reina de la  
noche. México.

*Selenicereus chrysocardium* (Alexander) Kimmach, América  
Central, América del Sur, Caribe.

*Selenicereus grandiflorus* Britt. & Rose subsp. *lautner* Ralf Bauer,  
México.

*Selenicereus hondurensis* (K.Schum.) Britton & Rose, Honduras,  
Guatemala.

*Selenicereus macdonaldiae* (Hook.) Britton. & Rose, Honduras.

*Selenicereus macranthus*

*Selenicereus pteranthus* (Link ex A. Dietr.) Britton & Rose,  
Princesa de la Noche. México.

*Stenocactus crispatus* (DC.) A. Berger ex A.W. Hill, México.

*Stenocereus pruinosus* (Otto ex Pfeiff.) Buxb., México.

*Stenocereus sp.* (A.Berger) Riccob, Baja California, Arizona  
(EEUU), México, Colombia, Costa Rica.

*Stetsonia coryne* (Salm-Dyck) Britton & Rose, Palillo de dientes.  
Bolivia, Argentina.

*Sulcorebutia arenacea* (Cárdena) F. Ritter, Cochabamba (Bolivia).

*Tunilla erectoclada* (Backeb.) D. R. Hunt & J. Iliff, Argentina.

*Weberbauerocereus winterianus* F. Ritter, Perú.

*Weberocereus glaber* (Eichlam) G.D. Rowley, Costa Rica,  
Guatemala, México.

*Weberocereus sp* Britton. & Rose, Costa Rica, Guatemala, México.

*Weingartia neocumingii* Backeb., Bolivia.

### Campanulaceae

*Jasione montana* L., Europa, NO África, Turquía.

### Cannabaceae

*Celtis australis* L., Almez, Almencino. S Europa, N África, O Asia.

*Celtis julianae* C.K. Schneid., China.

*Celtis occidentalis* L., Almez americano. SE Canadá, EE UU.

### Cannaceae

*Canna x generalis* L.H. Bailey & E.Z. Bailey, Origen hortícola.

### Capparaceae

*Capparis spinosa* L. subsp. *spinosa*, Región mediterránea.

### Caprifoliaceae

*Abelia chinensis* R. Br. *A. rupestris* Lindl., Abelia. China.

*Abelia x grandiflora* (Ravelli ex André) Rehder. Abelia. Origen hortícola.

*Lonicera fragrantissima* Lindl. & J. Paxton, China.

*Lonicera japonica* Thunb., Madreselva. E Asia.

*Scabiosa stellata* L., SO Europa.

*Symphoricarpos albus* (L.) S.F. Blake, E EEUU.

### Caricaceae

*Carica papaya* L. 'BH-65', Papaya BH-65. Origen hortícola.

*Carica papaya* L. 'Exótica', Papaya Exótica. Origen hortícola.

*Carica papaya* L. f. 'Leide', Origen hortícola.

### Caryophyllaceae

*Dianthus anticarius* Boiss. & Reut, SO Región mediterránea.

*Dianthus caryophyllus* L. 'Cornelia', Clavel común. Origen hortícola.

*Paronychia argentea* Lam., Paroniquia. Región mediterránea.

*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L., O, C Europa, Región mediterránea, S, O Asia, África.

*Sagina procumbens* L., Europa.

*Sagina subulata* (Sw.) C.Presl, O, C Europa, Península Balcánica.

*Silene colorata* Poir, Región mediterránea, N Irán, Arabia, Is. Canarias (Lanzarote).

### Casuarinaceae

*Casuarina cunninghamiana* Miq., Nueva Gales del Sur (Australia).

*Casuarina equisetifolia* L., Australia, Malasia, Polinesia.

### Celastraceae

*Brexia madagascarensis* (Lam.) Thouars ex Ker Gawl., E África.

*Catha edulis* (Vahl.) Endl., Té de Abisinia. De SO Arabia a S África.

*Gymnosporia senegalensis* (Lam.) Loes. = *Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell subsp. *europaeus* (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes et M.B. Crespo, Arto, Espino cambrón. SE Península Ibérica, N África (Marruecos y Argelia).

*Maytenus canariensis* (Loes) G. Kunkel & Sunding, Peralillo Islas Canarias.

### Cephalotaceae

*Cephalotus follicularis* Labill., Cephalotaceae. Australia.

### Chenopodiaceae

*Beta vulgaris* L. = *B. vulgaris* subsp. *maritima* (L.) Arcang., Región mediterránea.

*Chenopodium murale* L., Zona meridional de Euroasia.

*Chenopodium opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz, Región mediterránea, C Europa, C Asia, África tropical.

### Cichorioideae

*Carlina corymbosa* L., Región mediterránea.

### Cistaceae

*Cistus albidus* L., Jara blanca. Región mediterránea occidental.

*Cistus crispus* L., Región mediterránea occidental.

*Cistus ladanifer* L., Región mediterránea occidental.

*Cistus monspeliensis* L., Región mediterránea, Madeira, Tenerife.

*Cistus salviifolius* L., *Cistaceae*. Jara. Región mediterránea.

*Cistus x corbariensis* Pourr., Origen hortícola.

*Cistus x purpureus* Lam., Origen hortícola.

*Fumana thymifolia* (L.) Spach, Región mediterránea.

### Clusiaceae

*Mammea americana* L., Jamaica, Is. La Española, Puerto Rico, Las Antillas.

*Webbia canariensis* (L.) Webb & Berthel., Islas Canarias.

### Combretaceae

*Combretum indicum* (L.) DeFilipps = *Quisqualis indica* L.,  
Cuisqualis. De La Unión de Myanmar a Nueva Guinea.

### Commelinaceae

*Callisia fragans* (Lindl.) Woodson = *Spirocnema fragans* Lindl.,  
México.

*Callisia repens* (Jacq.) L., América tropical.

*Tradescantia pallida* (Rose) D.R. Hunt 'Purple Heart' = *Setcreasea*  
*purpurea* Boom, Origen hortícola.

*Tradescantia zebrina* Bosse, México.

*Tradescantia x andersoniana* W.Ludw. & Rohweder 'Blue & Gold',  
Origen hortícola.

### Compositae

*Ajania pacifica* (Nakai) K.Bremer & Humphries, C, E Asia.

*Andryala integrifolia* L., SO Europa, Región mediterránea, macaronesia.

*Anthemis arvensis* L., Manzanilla bastarda. Europa.

*Arctotis x hybrida* Hort., Origen hortícola.

*Argyranthemum pinnatifidum* (L.f.) Lowe = *A. pinnatifidum* (L.f.)  
Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) Humphries, Madeira (Portugal).

*Artemisia argentea* L'Hér, Madeira.

*Atractylis cancellata* L., S Europa, N África, Macaronesia

*Bartlettina sordida* (Less.) R.M. King & H. Rob. = *Eupatorium sordidum* Less., Eupatorio. México.

*Berkheya purpurea* (DC.) Benth. & Hook.f. ex Mast., S África.

*Bidens ferulifolia* (Jacq.) Sweet, De S EEUU a C América.

*Calendula arvensis* M. Bieb., Región mediterránea.

*Calendula officinalis* L., Caléndula. Región mediterránea.

*Carthamus arborescens* L., S España, NO África.

*Centaurea carratracensis* Lange, Ronda (Sierra de Aguas y Sierra de la Robla, Málaga).

*Centaurea melitensis* L., Europa, África.

*Centaurea prolongoi* Pau, Sierras béticas andaluzas.

*Centaurea pullata* L., España, Portugal.

*Centaurea solstitialis* L., Abrepuño amarillo. Región mediterránea.

*Cheirolophus falcisectus* Svent. ex Montelongo & Moraleda, Gran Canaria (Islas Canarias).

*Chrysanthemum morifolium* Ramat., Crisantemo, Margarita. China.

*Cichorium intybus* L., N África, Europa, Asia.

*Coreopsis grandiflora* Hogg ex Sweet, EE UU.



*Cosmos sp.* Cav., S EEUU, México, Panamá.

*Crepis vesicaria* L., O, S, Europa.

*Dittrichia viscosa* (L.) Greuter = *Inula viscosa* (L.) Aiton, Región mediterránea.

*Dymondia margaritae* Compton, Dimondia, Alfombra del Cabo. Sudáfrica.

*Erigeron karwiskianum* DC. = *E. mucronatus* DC., C América.

*Eriocephalus africanus* L., S África.

*Euryops evansii* Schltr. *Compositae*. S África.

*Farfugium japonicum* (L.) Kitam. `Aureomaculatum' = *F. tussilagineum* (Burm. f.) Kitam. `Aureomaculatum', Origen hortícola.

*Farfugium japonicum* (L.) Kitam. = *Ligularia tussilaginea* (Burm. f.) Makino, Boina, Ligularia. Japón, China.

*Felicia amelloides* (L.) Voss = *Agathea caelestis* (L.) DC., Margarita azul. S África.

*Felicia amelloides* (L.) Voss `Variegata', Margarita azul. Origen hortícola.

*Filago pyramidata* L., SO Europa, NO África, S Asia, Macaronesia

*Galactites tomentosa* Moench, Región mediterránea.

*Gazania rigens* (L.) Gaertn. = *G. splendens* Hend. & A.A.Hend., S África.

*Glebionis coronaria* (L.) Cass. ex Spach = *Chrysanthemum coronarium* L., Región mediterránea, C,S Portugal.

*Gonospermum canariense* (DC.) Less., Islas Canarias.

*Hedynopsis rhagadioloides* (L.) F.W. Schmidt = *H. cretica* (L.) Dum.Cours., S Europa, N, O África, SE Asia.

*Helichrysum italicum* (Roth) G. Don, Región mediterránea.

*Helichrysum obconicum* Dc., Madeira (Portugal).

*Hymenolepis parviflora* (L.) DC. = *Athanasia parviflora* L.,  
Provincia del cabo (Sudáfrica).

*Jacobaea maritima* (L.) Pelsers & Meijden = *Senecio cineraria* DC.,  
Región mediterránea.

*Kleinia longiflora* DC. = *Senecio longiflorus* (DC.) Sch.Bip., S  
África.

*kleinia neriifolia* Haw. = *Senecio kleinia* (L.) Less., Verode. Islas  
Canarias.

*Leontodon longirostris* (French & P.D. Sell.) Talavera, S Europa,  
NO África, Macaronesia.

*Leontodon tinginatus* (Boiss. & Reuter) Ball, S España, NO  
Marruecos.

*Leucophyta brownii* Cass. = *Calocephalus brownii* (Cass.) F. Muell.,  
Australia.

*Matricaria chamomilla* L., Europa.

*Montanoa bipinnatifida* (Kunth) K. Koch, Árbol margaritero,  
Margaritero arbóreo. México.

*Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl. = *Dimorphotheca ecklonis* DC.,  
Margarita del Cabo. S África.

*Pallenis maritima* (L.) Greuter = *Asteriscus maritimus* (L.) Less., O  
Región mediterránea.

*Pallenis spinosa* (L.) Cass., S Europa.

*Phagnalon rupestre* (L.) DC., Región mediterránea.

*Phagnalon saxatile* (L.) Cass., S Europa, N África, Macaronesia.

*Reichardia intermedia* (Sch. Bip) Samp., S Europa, N África, SO  
Asia.

*Reichardia tingitana* (L.) Roth, Región mediterránea.

*Rhodanthemum hosmariense* (Ball) "B.H.Wilcox, K.Bremer & Humphries" Casablanca', Origen hortícola.

*Roldana petasitis* (Sims.) H. Rob. & Brettel = *Senecio petasitis* (Sims) DC., Senecio. México.

*Rudbeckia hirta* L. EEUU.

*Santolina chamaecyparissus* L. = *S. incana* Lam., Santolina, Abrótano hembra. Región mediterránea.

*Scorzonera angustifolia* Asso, Península Ibérica, NO Marruecos.

*Senecio articulatus* (L. f.) Sch.Bip. = *Kleinia articulata* (L. f.) Haw., S África.

*Senecio barbertonicus* Klatt, S África.

*Senecio citriformis* G. D. Rowley, S África.

*Senecio crassissimus* Humbert, Madagascar.

*Senecio herreianus* Dinter, Namibia, S África.

*Senecio jacobsenii* G. D. Rowley, Kenia, Tanzania.

*Senecio lineatus* (L. f.) DC. = *Cineraria lineata* L. f., Sudáfrica.

*Senecio macroglossus* DC., África Austral.

*Senecio rowleyanus* H. Jacobsen = *Kleinia rowleyana* (H. Jacobsen) G. Kunkel, Namibia.

*Senecio scaposus* DC. = *S. calamifolius* Hook., S África.

*Sonchus oleraceus* (L.) L., Cerrojo Euroasia, Región mediterránea.

*Sonchus tenerrimus* L., Región mediterránea.

*Sphagneticola trilobata* (L.) Pruski = *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc., América tropical.

*Tagetes erecta* L. = *T. patula* L., México.

*Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A. Gray, De México a N de S América.

*Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, Euroasia.

*Volutaria muricata* (L.) Maire = *Cyanopsis muricata* L.) Dostál, S España, NO África.

### Convallariaceae

*Aspidistra elatior* Blume, China.

### Convolvulaceae

*Convolvulus althaeoides* L., S Europa.

*Convolvulus arvensis* L., Europa.

*Convolvulus cneorum* L., Campanilla. Región mediterránea

*Convolvulus floridus* L., Islas Canarias.

*Convolvulus lanuginosus* Desr., S, E España, S Francia.

*Convolvulus sabatius* Viv., Campanilla azul. Región mediterránea, N África.

*Convolvulus siculus* L., Región mediterránea, Macaronesia.

*Convolvulus tricolor* L., Región mediterránea, Portugal.

*Dichondra repens* J. R. Forst. & G. Forst., C América, O India, China, S Japón, Islas Ryu kyu.

*Ipomoea cairica* (L.) Sweet, África tropical, Asia.

### Costaceae

*Costus afer* Ker Gawl., África tropical.

*Costus pulverulentus* C. Pres, México.

### Crassulaceae

*Aeonium arboreum* L. 'Atropurpureum', Origen hortícola.

*Aeonium arboreum* L., = *A. manriqueorum* C. Bolle, Hierba puntera. Gran Canaria (Islas Canarias). Islas Canarias (España).

*Aeonium ciliatum* (Willd.) Webb & Berth., Islas Canarias.

*Aeonium glandulosum* (Aiton) Webb & Berthel., Madeira (Portugal).

*Aeonium glutinosum* (Aiton) Webb & Berthel., Madeira (Portugal).

*Aeonium gomerense* (Praeger) Praeger, La Gomera (Islas Canaria).

*Aeonium lancerottense* (Praeger) Praeger, Lanzarote (Islas Canarias).

*Aeonium nobile* (Praeger) Praeger, Islas Canarias.

*Aeonium percarneum* (R.P.Murray) Pit. & Proust., Bejeque rosado. Gran Canaria (Islas Canarias).

*Aeonium smithii* (Sims) Webb & Berthel., Islas Canarias (España).

*Bryophyllum fedtschenkoi* (Raym.-Hamet & H. Perrier) Lauz.-March. = *Kalanchoe fedtschenkoi* Raym.-Hamet & H. Perrier, Madagascar.

*Crassula arborescens* (Mill.) Willd. 'Gollum', Sudáfrica.

*Crassula arborescens* (Mill.) Willd., Sudáfrica.

*Crassula ausensis* Hutch. subsp. *titanopsis* Pavelka, S Namibia.

*Crassula ausensis* Hutch., Namibia.

*Crassula capitella* (Thunb.) Toelken subsp. *thyrsiflora*, S África.

*Crassula columnella* Marloth & Schönland, De Costa Oeste de S África a Namibia.

*Crassula conmutata* Friedr., Namibia.

*Crassula corymbulosa* Link and Otto, S África.

*Crassula dejecta* Jacq. = *C. albiflora* Sims, Sudáfrica.

*Crassula falcata* J. C. Wendl., S África.

*Crassula lactea* Sol., S África.

*Crassula mesembryanthemoides* (Haw.) Dietr., Namibia.

*Crassula muscosa* L. = *C. lycopodioides* Lam., Sudáfrica, Namibia.

*Crassula nudicaulis* L. = *C. obvallata* L., S África.

*Crassula orbicularis* L. = *C. rosularis* Haw., S África.

*Crassula ovata* (Mill.) 'Druce Minor', Origen hortícola.

*Crassula ovata* (Mill.) Druce, África del Sur.

*Crassula pellucida* L. subsp. *marginalis* (Dryand.) Toelken, S África.

*Crassula perforata* Thunb., S África.

*Crassula rupestris* Thunb., S África.

*Crassula socialis* Schönland, S África.

*Crassula spathulata* Thunb., Sudáfrica.

*Crassula tetragona* L., África del Sur.

*Echeveria agavoides* Lem., México.

*Echeveria elegans* Rose, México.

*Echeveria gibbiflora* DC., México.

*Echeveria pilosa* J. Purpus, México.

*Echeveria setosa* Rose & Purpus, México.

*Echeveria sp.* DC. América

*Echeveria sp.* DC. 'Madiba', Origen hortícola.

*Echeveria sp.* DC., 'Afterglow', Origen hortícola.

*Echeveria tolimanensis* Matuda, Toliman (México).

*Echeveria x undulata* De Smet ex E.Morren, Origen hortícola.

*Graptopoveria* sp. 'Rowley 'Demie Lune', Origen hortícola.

*Kalanchoe beharensis* Drake var. *subnuda* H. Jacobsen,  
Madagascar.

*Kalanchoe beharensis* Drake, Madagascar.

*Kalanchoe blossfeldiana* Poelln., Madagascar.

*Kalanchoe daigremontiana* Raym.-Hamet & H. Perrier,  
Madagascar.

*Kalanchoe longiflora* Schltr ex J.M. Wood, S África (Natal).

*Kalanchoe luciae* Raym.-Hamet 'Oricula', Origen hortícola.

*Kalanchoe orgyalis* Baker, Madagascar.

*kalanchoe pumila* Baker, Madagascar.

*Kalanchoe tetraphylla* H. Perrier *Kalanchoe tetraphylla* H. Perrier,  
Sudáfrica.

*Kalanchoe tomentosa* Baker, Madagascar.

*Kalanchoe tubiflora* (Harv.) Raym.-Hamet, S África, Madagascar.

*Pachyphytum compactum* Rose, México.

*Pachyphytum oviferum* Purpus, México.

*Pachyveria roseana* Jabcosen,

*Sedum burrito* Moran, . México, Honduras .

*Sedum lineare* Thunb., E Asia.

*Sedum morganianum* E.Walther, S México.

*Sedum mucizonia* (Ortega) Raym.-Hamet = *Mucizonia hispida* A:  
Berger, C y S de la Península Ibérica y el NW de África.

*Sedum nussbaumerianum* Bitter, México.

*Sedum nussbaumerianum* Bitter, México.

*Sedum pachyphyllum* Rose, Platanitos. México.

*Sedum palmeri* S. Watson, México.

*Sedum sediforme* (Jacq.) Pau, Uña de gato. Región mediterránea, Europa meridional.

*Sempervivum sp.* L., Siempreviva. N África, Oriente medio, Europa.

*Umbilicus horizontalis* (Guss.) DC., Is. Canarias, S y E España, Is. Baleares.

*Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy, Región mediterránea, Macaronesia.

*Villadia batesii* (Hemsl.) Baehni & Macbride, México.

### Cucurbitaceae

*Kedrostis africana* (L.) Cogn., África.

### Cupressaceae

*Calocedrus decurrens* (Torr.) Florin 'Aureovariegata', Origen hortícola.

*Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. 'Ellwoodii', Origen hortícola.

*Chamaecyparis obtusa* (Siebold & Zucc.) Endl. 'Nana Gracilis', Origen hortícola.

*Cupressus lusitanica* Mill. = *C. coulteri* J. Forbes = *C. lindleyi* Klotsch, Ciprés de México. C América.

*Cupressus sempervirens* L., Ciprés mediterráneo, ciprés común. Región mediterránea, S Europa.

*Cupressus sempervirens* L. var. *sempervirens*, Ciprés. Región mediterránea.

*Cupressus sempervirens* L. var. *horizontalis* (Mill.) Loudon, Ciprés. Región mediterránea.



*Cupressus sempervirens* L., 'Stricta', Región mediterránea, S Europa.

*Cryptomeria japonica* (Thunb. Ex L.f.) D.Don., Cedro japonés. China, Japón.

*Juniperus communis* L., Enebro común. Zona templada del Hemisferio Norte.

*Juniperus horizontalis* Moench, Enebro rastrero. N EEUU.

*Juniperus macrocarpa* Sm. = *J. oxycedrus* subsp. *macrocarpa* (Sm.) Neilr, Enebro de dunas. Región mediterránea, W Asia.

*Juniperus oxycedrus* L., Enebro de la miera. Región mediterránea, Caucaso e Irán.

*Juniperus phoenicea* L., Región mediterránea, Macaronesia.

*Juniperus phoenicea* L. var. *turbinata* (Guss.) Parl. = *J. turbinata* L. subsp. *canariensis* (Guyot & Mathou) Rivas Mart., Sabina. Región mediterránea Occidental.

*Metasequoia glyptostroboides* Hu & W.C.Cheng, Sichuan-Hubei (China).

*Platycladus orientalis* (L.) Franco = *Thuja orientalis* L., Tuya, Árbol de la vida. N y O China, Manchuria, Corea.

*Sequoia sempervirens* (D, Don.) Endl., Secuoya. California (EEUU).

*Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz, Secuoya gigante. N California (EEUU).

*Taxodium distichum* (L.) Rich., Ciprés de los pantanos. SE EEUU.

*Taxodium huegelii* C.Lawson = *T. mucronatum* Ten., México.

*Tetraclinis articulata* (Vahl) Mast., SE España, N África.

### Cyatheaceae

*Sphaeropteris cooperi* (F. Muell.) R.M. Tryon = *Cyathea cooperi* (F. Muell.) Domin, Árbol helecho australiano. Australia.

### Cycadaceae

*Cycas circinalis* L., Cica, Palmera helecho, Palma del sagú, Sagú de Nueva Holanda. India, La Unión de Myanmar, Sri Lanka, Islas del Pacífico sur.

*Cycas riuminiana* Porte ex Regel = *C. circinalis* subsp. *riuminiana* (Porte ex Regel) J.Schust., Islas Palawan.

*Cycas revoluta* Thunb., Cica, Palma Sagú, Sagú del Japón. Islas Ryu Kyu, S Isla Kyushu (Japón).

*Cycas rumphii* Miq., India, Sri Lanka, Islas del Pacífico sur.

*Cycas taiwaniana* Carruth., Isla de Taiwan, Isla de Hainan, SE China.

### Cyperaceae

*Cyperus haspan* L., México.

*Cyperus involucratus* Rottb. = *C. flabelliformis* Rottb., Sombrillita, Paragüita. Madagascar, Islas Reunión, Islas Mauricio.

*Cyperus papyrus* L., Papiro. C África y Valle del Nilo (Egipto).

*Ficinia truncata* (Thunb.) Schrad. 'Ice crystal', Origen hortícola.

*Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla = *Scirpus lacustris* L., Cosmopolita.

### Davalliaceae

*Davallia canariensis* (L.) Sm., Islas Canarias, N África.

### Dianellaceae

*Dianella tasmanica* C. Pynaert. 'Variegata', Tasmania (Australia).

### Dicksoniaceae

*Balantium antarcticum* (Labill.) C. Presl. = *Dicksonia antártica*  
Labill., Helecho arborescente. S y E Australia, Tasmania .

### Didiereaceae

*Portulacaria afra* Jacq., S África.

*Portulacaria afra* Jacq. var. *foliis-variegatis* H. Jacobsen .,  
Mozambique, S África.

### Dioscoreaceae

*Dioscorea elephantipes* (L`Hert) Engl., S África.

*Dioscorea macrostachya* M. Martens & Galleotti, S México, N  
Sudamérica.

### Doryanthaceae

*Doryanthes palmeri* W. Hill ex Benth., E Austrtalia.

### Droseraceae

*Dionaea muscipula* J. Ellis, Carolina (EEUU).

*Dionaea muscipula* 'Dentata' B. Meyers-Rice, Origen hortícola.

*Dionaea muscipula* 'Red Dragon' R. gagliardo, Origen hortícola.

*Drosera aliciae* Raym.-Hamet., Sudáfrica.

*Drosera anglica* Huds., S Europa, S Japón.

*Drosera binata* Labill., Australia, Nueva Zelanda.

*Drosera burkeana* Planch., África, Madagascar.

*Drosera capensis* L. 'Rubra', Origen hortícola.

*Drosera kaiteurensis* Brumm.-Ding., Guayana, Venezuela.

*Drosera spatulata* Labill., Asia, Australia.

*Drosera leucostigma* (N.G.Marchant & Lowrie) Lowrie & Conran  
'Yellow Plant', Origen hortícola.

*Drosera nitidula* subsp. *omissa* (Diels) N.G.Marchant & Lowrie =  
*Drosera omissa* Diels, Australia occidental.

*Drosera nitidula* subsp. *omissa* (Diels) N.G.Marchant & Lowrie  
'Pink Flower', Origen hortícola.

*Drosera pulchella* Lehm., SO Australia.

### Dryopteridaceae

*Cyrtomium falcatum* (L.) C. Presl = *Polystichum falcatum* (L. f.)  
Diels, De S África a Hawaii.

*Cyrtomium yamamotoi* var. *intermedium* (Diels) Ching & K.H.  
Shing = *C. fortunei* J. Sm var. *clivicolum* (Makino) Tagawa, Japón,  
Korea, China.

### Ebenaceae

*Diospyros kaki* L., Caqui, Kaki, Palo santo China, Japón.

*Diospyros kaki* L. var. *sharon*, Origen hortícola.

*Diospyros kaki* L. var. *fuyu*, Caqui Fuyu. Origen hortícola.

*Diospyros virginiana* L., Caqui de Virginia De Connecticut a  
Florida, Iowa, Kansas (E EE UU).

*Diospyros nigra* (J.F.Gmel.) Perrier = *D. digyna* Jacq., Zapote negro  
C America.

### *Ephedraceae*

*Ephedra chilensis* C.Presl, Chile.

*Ephedra fragilis* Desf. = *E. fragilis* Desf. subsp. *fragilis*, Efedra, hierba de las coyunturas. O región mediterránea, Macaronesia.

### *Equisetaceae*

*Equisetum hyemale* L., Cola de caballo. Hemisferio norte.

*Equisetum fluviatile* L., Cola de caballo. EE UU.

### *Ericaceae*

*Arbutus canariensis* Duhamel, Madroño. Tenerife, La Palma, Gran Canaria (Islas Canarias).

*Arbutus unedo* L., Madroño. S Europa, Irlanda, Palestina, Macaronesia; N África.

*Erica mackaiana* subsp. *andevalensis* (Cabezudo & Rivera) D.C.McClint. & E.C.Nelson = *E. andevalensis* Cabezudo & J. Rivera, *Ericaceae*. Brezo de las minas. Comarca del Ádevalo, Valle del río Odiel (Huelva).

*Kalmia latifolia* L., Laurel americano, Laurel de montaña. EE UU.

*Pieris floribunda* (Pursh) Benth. & Hook f., *Ericaceae*. EEUU.

### *Escacalloniaceae*

*Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers., Escalonia. Chile.

### *Euphorbiaceae*

*Breynia disticha* J.R. Forst. & G. Forst., Polinesia.

*Codiaeum variegatum* (L.) Rumph. ex A.Juss. `Aucubifolia`, Croton. Origen hortícola.

*Euphorbia abyssinica* J.F. Gmel. = *E. acrurensis* N.E.Br., Etiopía.

*Euphorbia aeruginosa* Schweick., S África.

*Euphorbia aggregata* A. Berger, S. África.

*Euphorbia alluaudii* Drake = *E. leucodendron* Drake, S  
Madagascar.

*Euphorbia aphylla* Brouss. ex Willd., Tolda. Gran Canaria, Tenerife,  
la Gomera (Islas Canarias).

*Euphorbia baioensis* S. Carter, Kenia.

*Euphorbia balsamifera* Aiton, Tabaiba dulce. África, Islas Canarias.

*Euphorbia bicompecta* Bruyns = *Synadenium compactum* N.E.Br.,  
Kenia, Ruanda.

*Euphorbia bravoana* Svent., Gomera (Islas Canarias).

*Euphorbia canariensis* L., Cardón. Islas Canarias.

*Euphorbia candelabrum* Tremant ex Kotschy, África tropical.

*Euphorbia caput-medusae* L. 'Cristata', Origen hortícola.

*Euphorbia confinalis* R. A. Dyer, S África, Mozambique, Zimbawe.

*Euphorbia cotinifolia* L., Lechero rojo. México.

*Euphorbia cylindrifolia* Marn.-Lap. & Rauh, Madagascar.

*Euphorbia deightonii* Croizat, Sierra Leona.

*Euphorbia densiflora* (Klotzsch) Klotzsch, México, Guatemala.

*Euphorbia densiflora* (Klotzsch) Klotzsch, México.

*Euphorbia desmondii* Keay & Milne-Redh., Nigeria, Camerún.

*Euphorbia exigua* L., Europa, O Asia, N África, Macaronesia.

*Euphorbia franckiana* A. Berger, S África.

*Euphorbia fruticosa* Forssk. 'Blue', Origen hortícola.

*Euphorbia fruticosa* Forssk. 'Blue', Origen hortícola.

- Euphorbia gorgonis* A. Berger, Sudáfrica
- Euphorbia grandialata* R.A. Dyer, Transval (S África).
- Euphorbia grandidens* Haw., S África.
- Euphorbia helioscopia* L., Europa, Asia, N África, Macaronesia.
- Euphorbia horrida* Boiss., S África.
- Euphorbia inermis* Mill., S África.
- Euphorbia ledienii* A. Berger, Sudáfrica.
- Euphorbia mammillaris* L., S África.
- Euphorbia medicaginea* Boiss., S Península Ibérica, O África.
- Euphorbia milii* Des Moul. 'Lutea', Origen hortícola.
- Euphorbia milii* Des Moul. 'Rosea', Origen hortícola.
- Euphorbia milii* Des Moul., Madagascar.
- Euphorbia monteiroi* Hook., África tropical.
- Euphorbia neriifolia* L., India.
- Euphorbia nyikae* Pax ex Engl., África tropical.
- Euphorbia obesa* Hook. f., Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Euphorbia officinarum* subsp. *echinus* (Hook. F. & Coss.) Vindt., Macaronesia, Marruecos.
- Euphorbia pentagona* Haw., Sudáfrica.
- Euphorbia peplus* L., Europa, O Asia, N África, Macaronesia.
- Euphorbia pteroneura* A. Berger, México.
- Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch = *Poinsettia pulcherrima* (Willd. ex Klotzsch) Graham, Pascuero, Flor de Pascua, Poinsetia. C México.
- Euphorbia pulvinata* Marloth, S. África.

*Euphorbia regis-jubae* J. Gay, Tabaiba morisca. Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura (Islas Canarias), Marruecos occidental.

*Euphorbia resinifera* O. Berg., Marruecos.

*Euphorbia segetalis* L., Europa, N África, Macaronesia.

*Euphorbia stellata* Willd., Sudáfrica.

*Euphorbia stenoclada* Baill., Madagascar.

*Euphorbia tirucalli* L., De África tropical a Sudáfrica.

*Euphorbia trigona* Mill. 'Rubra', Origen hortícola.

*Euphorbia trigona* Mill., O África tropical.

*Euphorbia umbellata* (Pax) Bruyns 'Rubra', Origen hortícola.

*Euphorbia umbellata* (Pax) Bruyns = *Synadenium grantii* Hook. f., Lechero africano. Mozambique, Uganda, Zimbawe.

*Euphorbia xyllophylloides* Brongn. ex Lem., Madagascar.

*Jatropha integerrima* Jacq., Peregrina. Cuba.

*Jatropha multifida* L., América central.

*Jatropha podagrica* Hook., Guatemala, Panamá.

*Monadenium arborescens* P.R.O. Bally, África central.

*Pedilanthus tithymaloides* (L.) Poit 'Variegatus', Origen hortícola.

*Pilosocereus odilensis*, Sudamérica.

*Ricinus communis* L. 'Sanguineus', Ricino rojo. Origen hortícola..

*Ricinus communis* L., Ricino. E, NE África y Europa.

### Fagaceae

*Quercus berberidifolia* Liebm., California (EEUU).

*Quercus coccifera* L., Coscoja. Región mediterránea.



*Quercus faginea* Lam., Quejigo, Roble enciniego. N África, S Europa.

*Quercus ilex* L., Encina. Región mediterránea, De SO Francia a Portugal.

*Quercus john-tuckeri* Nixon & C.H. Müll., California (EEUU).

*Quercus robur* L. = *Q. pedunculata* Hoffm., Roble. Europa, N África, O Asia.

*Quercus rotundifolia* Lam., Encina. S Península Ibérica, N.África.

*Quercus suber* L., Alcornoque. N África, S Europa.

*Quercus x acutidens* Torr., Origen hortícola.

### Fouquieriaceae

*Fouquieria macdougalii* Nash, N México.

### Geraniaceae

*Erodium chium* (Burm. f.) Willd., África.

*Erodium malacoides* (L.) L'Hér., S Europa.

*Erodium moschatum* (L.) L'Hér., S, O Europa.

*Geranium purpureum* Vill., Región mediterránea, Macaronesia.

*Pelargonium carnosum* (L.) L'Hér = *P. ferulaceum* Willd., Africa del sur, Namibia.

*Pelargonium citriodorum* Breiter, S África.

*Pelargonium ferulaceum* Willd., *Geraniaceae*. Sudáfrica, Namibia.

*Pelargonium graveolens* L' Hér., Geranio de olor. S África.

*Pelargonium klinghardtense* R. Knuth, Sudáfrica.

*Pelargonium laxum* Steud, Sudáfrica.

*Pelargonium mutans* Voster = *P. grandiflorum* Willd. = *P. alchemilloides* (L.) Aiton Geranio de pensamiento. Natal (Sudáfrica).

*Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér., Gitanilla. S África.

*Pelargonium tomentosum* Jacq., Sudáfrica.

*Pelargonium zonale* (L.) L'Hér. ex Aiton, Geranio. S África.

### Ginkgoaceae

*Ginkgo biloba* L., Árbol sagrado, Árbol de los cuarenta escudos. China, Japón.

### Haemodoraceae

*Anigozanthos flavidus* DC. = *A. coccineus* Paxton, Australia

### Haloragaceae

*Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Verdc., Sudamérica.

### Hamamelidaceae

*Loropetalum chinense* (R. Br.) Oliv., China, Japón.

*Loropetalum chinensis* (R. Br.) Oliv. Fire Dance', Origen hortícola.

### Helioconiaceae

*Heliconia pseudoaemygdiana* Emygdio & E. Santos, Brasil.

### Hemionitidaceae

*Cosentinia vellea* (Aiton) Tod., Región macaronésica, región mediterránea.

### Hyacinthaceae

*Leopoldia comosa* (L.) Parl. = *Muscari comosum* (L.) Mill., Región mediterránea.

### Hydrangeaceae

*Deutzia scabra* Thunb., Celinda de espigas. China, Japón.

*Philadelphus coronarius* L., Celindo, Filadelfo. S Europa, SO Asia.

### Hydrocharitaceae

*Elodea canadensis* Michx., EEUU.

*Stratiotes aloides* L., Euroasia.

*Vallisneria spiralis* L., SE Asia, N África, S Europa.

### Hypericaceae

*Hypericum calycinum* L., Hierba de San Juan. SE Bulgaria, N Turquía.

*Hypericum canariense* L., Islas Canarias.

*Hypericum hircinum* L., Hierba de San Juan Región mediterránea.

*Hypericum olympicum* L., SE Europa.

*ypericum patulum* Thunb., China.

### Hypoxidaceae

*Molineria capitulata* (Lou.) Herb. = *Curculigo capitulata* (Lour.)  
Kuntze. Indochina.

### Iridaceae

*Aristea ecklonii* Baker, C, S África.

*Aristea ensifolia* J.Muir, S África, Madagascar.

*Chasmanthe floribunda* (Salisb.) N.E.Br., Sudáfrica.

*Coprosmia sp.* (Pappe ex Hook.) Planch., Provincia del Cabo  
(Sudáfrica).

*Crocus sp.* L., N África, Asia, Europa.

*Dietes bicolor* Sweet & G. Don, Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

*Dietes grandiflora* N.E.Br., S África.

*Fressia sp* Klatt., África.

*Iris x germanica* L., Lirio azul. Origen hortícola.

*Iris japonica* Thunb., Japón, China.

*Iris pseudoacorus* L., De Europa y N África a Siberia Occidental.

*Iris xiphium* L., S Europa, Región mediterránea.

*Neomarica gracilis* (Herb.) Sprague, Centroamérica

### Juglandaceae

*Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch, S EE UU.

### Juncaceae

*Juncus acutus* L., Junco silvestre. Región mediterránea.

*Juncus maritimus* Lam., C, W Europa, Región mediterránea, W Asia, N África.

### Lamiaceae

*Ajuga reptans* L., Europa, N África hasta Iran.

*Ajuga reptans* L. 'Burgundy Glow', Origen hortícola.

*Lamium amplexicaule* L., Europa.

*Lavandula angustifolia* Mill., Espliego. Región mediterránea.

*Lavandula dentata* L., Lavanda. S y E España, Islas Baleares.

*Lavandula multifida* L., Lavanda. O Región mediterránea.

*Lavandula pinnata* L., Madeira (Portugal).

*Lavandula stoechas* L., Región mediterránea, Macaronesia.

*Lavandula x heterophylla* Viv., Origen hortícola

*Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel., Origen hortícola.

*Leonotis leonurus* (L.) R.Br.= *Phlomis leonorus* L., S África.

*Marrubium vulgare* L., Euroasia, Región mediterránea, Macaronesia.

*Mentha suaveolens* Ehrh., Mastranzo. Región mediterránea.

*Micromeria graeca* (L.) Benth.ex Rchb., Región mediterránea, C, S Portugal.

*Origanum vulgare* L., Orégano. Europa.

*Perovskia atriplicifolia* Benth., Salvia Rusa. Afganistán, Rusia.

*Phlomis fruticosa* L., Flomis, Oreja de liebre. Región mediterránea.

*Phlomis purpurea* L., Matagallo. Península Ibérica, N Marruecos.

*Plectranthus neochilus* Schltr., África Austral.

*Plectranthus socotranus* A.B. Sm., Menta de Socotra. Isla de Socotra (Yemen).

*Plectranthus verticillatus* (L.f.) Drude, Planta del dinero. S África, Mozambique.

*Plectranthus* sp. L'Hér, 'Mona Lavender', *Lamiaceae*. Origen hortícola.

*Rosmarinus officinalis* L., Romero. Región mediterránea.

*Rosmarinus officinalis* L. 'Postratus', Romero rastrero. Origen hortícola.

*Rotheca myricoides* (Hochst.) Steane-Mabb. = *Clerodendrum ugandense* Prain, África.

*Salvia canariensis* L., Islas Canarias.

*Salvia leucantha* Cav., Salvia. México.

*Salvia microphylla* Kunth. = *S. grahamii* Benth., México.

*Salvia nemorosa* L., De Europa a W Asia.

*Salvia splendens* Sellow ex Schult., Salvia roja. S Brasil.

*Salvia x sylvestris* L. = *Salvia x superba* (Silva Tar. & C.K. Schneid.) Stapf, Salvia híbrida. Origen hortícola.

*Stachys ocymastrum* (L.) Briq., SO Europa.

*Teucrium fruticans* L., Región mediterránea occidental.

*Teucrium lusitanicum* Schreb., O, S Península Ibérica, NO África.

*Teucrium pseudochamaepitys* L., SO Europa.

*Teucrium rotundifolium* Schreb., E, S España, NW África (Marruecos).

*Thymbra capitata* (L.) Cav. = *Coridothymus capitatus* (L.) Rchb.f., Tomillo blanco, Carrasqueño. España.

*Thymus mastichina* (L.) L., Mejorana, Tomillo blanco. Península Ibérica, N África.

*Thymus vulgaris* L., Tomillo. O región mediterránea.

*Vitex agnus-castus* L., Sauzgatillo. De Región mediterránea a C Asia.

*Westringia fruticosa* (Willd.) Druce = *W. rosmariniformis* Sm., Romero australiano. Nueva Gales del Sur (Australia).

### Lauraceae

*Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl, China, Taiwan, Japón.

*Laurus azorica* (Seub.) Franco. Macaronesia.

*Laurus nobilis* L., Región mediterránea.

*Ocotea foetens* (Aiton) Baill., Til. Islas Canarias occidentales.

*Persea americana* Mill. = *P. gratissima* C. F. Gaertn. f., Aguacate. C América.

*Persea americana* Mill. Hass Nachan', Aguacate Hass Nachan. Origen hortícola.

*Persea americana* Mill. Fuerte Nachan', Aguacate Fuerte Nachan. Origen hortícola.

### Leguminosae

*Acacia dealbata* Link, Mimosa plateada. Nueva Gales del Sur, Victoria, Tasmania (Australia).

*Acacia* sp. Mill., Australia.

*Adenocarpus telonensis* (Loisel) DC., S Francia, España, Portugal, N África.

*Albizia julibrissin* Durazz. = *Acacia julibrissin* (Durazz.) Willd. = *Mimosa japonica* Thunb., De Irán a Japón.

*Amorpha californica* Torr. & A.Gray, C, S California (EEUU).

*Anthyllis cytisoides* L., Albaida. Región mediterránea.

*Anthyllis tejedensis* Boiss subsp. *plumosa* (E. Domínguez) Benedí, Sur de la Península Ibérica (Sierra de Cómpea, En medio, Tejada y Almirajara). Gr y Ma.

*Astragalus echinatus* Murray, S Europa, Turquía, NO África.

*Astragalus hamosus* L., Región mediterránea, Macaronesia.

*Bauhinia variegata* L., Árbol de las orquídeas. Himalaya, China.

*Bituminaria bituminosa* (L.) C.H.Stirt. = *Psoralea bituminosa* L., S Europa, N África, SO Asia.

*Bolusanthus speciosus* (Bolus) Harms, S África.

*Calliandra haematocephala* Hassk. = *C. inaequilatera* Rusby, Bolivia.

*Ceratonía siliqua* L., Región mediterránea.

*Cercis siliquastrum* L., Región mediterránea.

*Colvillea racemosa* Bojer, Madagascar.

*Coronilla valentina* subsp. *glauca* (L.) Batt., = *C. glauca*, Coronilla. Región mediterránea.

*Coronilla juncea* L., S Europa, NO África.

*Cytisus racemosus* Hort. Cf. Marcock, Europa, Oriente medio, N África.

*Cytisus grandiflorus* (Brot.) DC., O, S Península Ibérica, NO Marruecos.

*Cytisus proliferus* L.f. = *Chamaecytisus proliferus* (L. f.) Link, Escobón. Islas Canarias.

*Cytisus scoparius* (L.) Link. = *Sarothamnus scoparius* (L.) W.D.J. Koch, Retama negra. O, SE y C Europa, Macaronesia.



*Delonix decaryi* (R. Vig.) Capuron = *Poinciana decaryi* R. Vig., S, SO Madagascar.

*Delonix elata* (L.) Gamble = *Poinciana elata* L., Etiopía a Egipto, Arabia e India.

*Delonix floribunda* (Baill.) Capuron, Madagascar.

*Delonix pumila* Du Puy, Phillipson & R. Rabev, Madagascar.

*Delonix regia* (Hook) Raf., Madagascar.

*Dorycnium pentaphyllum* Scop., Región mediterránea occidental.

*Enterolobium cyclocarpum* (Jacq.) Griseb., De México hasta Brasil.

*Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morog., S América.

*Erophaca baetica* (L.) Boiss. = *Astragalus lusitanicus* Lam., S Península Ibérica, NO África.

*Erythrina caffra* Thunb., Árbol del coral. E y S África.

*Erythrina speciosa* Andrews, Árbol coral. Brasil, Antillas.

*Genista haenseleri* Boiss., S Península Ibérica (Serranía de Ronda. Málaga).

*Genista lydia* Boiss., Europa.

*Genista spartioides* Spach subsp. *retamoides* (Spach ex Cosson) Rivas-Mart. & Cantó, Retama basta. Europa, Oriente medio, N África.

*Genista ternera* (Murray) Kuntze, Madeira (Portugal).

*Genista umbellata* (L`Hér) Poir. subsp. *equisetiformis* (Spach) Rivas Goday & Rivas Mart. = *Spartium umbellatum* L`Hér., Bolina. S Península Ibérica.

*Genista monspessulana* (L.) L.A.S.Johnson = *Teline monspessulana* (L.) K. Koch., SO Península Ibérica, NO Marruecos.

*Gleditsia triacanthos* L. = *Gleditsia triacanthos* f. *inermis* Willd., Acacia negra sin espinas. E EEUU.

*Hardenbergia comptoniana* (Andrews) Benth. = *Glycine comptoniana* Andrews, Australia.

*Hardenbergia violacea* (Schneev.) Stearn = *Glycine violacea* Schneev., Australia.

*Hedysarum glomeratum* F. Dietr., Región mediterránea.

*Hippocrepis biflora* Spreng., Región mediterránea.

*Hippocrepis ciliata* Wild, Región mediterránea.

*Inga edulis* Mart., Brasil

*Lathyrus clymenum* L., S Europa, Asia menor, N África, Macaronesia.

*Lathyrus tingitanus* L., Península Ibérica, S Francia, Cerdeña, NO África, Macaronesia.

*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit = *L. glauca* Benth., América Tropical, Florida Tejas (EE UU).

*Lotus edulis* L., S Europa, SO Asia, N África.

*Lotus ornithopodioides* L., S, E Europa, N África, SO Asia.

*Medicago arborea* L, SE Europa, Asia menor.

*Medicago orbicularis* (L.) Bartal., Región mediterránea, Macaronesia, O Asia.

*Medicago polymorpha* L., Europa, Región mediterránea, Macaronesia, SO Asia.

*Medicago rigidula* (L.) All., S Europa, N África, SO Asia.

*Melilotus albus* Medik., Europa, Asia, N África.

*Melilotus elegans* Salzm. ex Ser. in DC., Región mediterránea, Macaronesia, Etiopía.

*Melilotus indicus* (L.) All., Europa, SO y C Asia, N África.

*Melilotus sulcatus* Desf., Región mediterránea, Macaronesia.

*Neptunia plena* (L.) Benth, Sensitiva de agua. América, Asia y África.

*Ononis natrix* L., Europa, N África, Macaronesia.

*Ononis speciosa* Lag., Gatuña. S España, NO África.

*Paraserianthes lophantha* (Willd.) I.C.Nielsen = *Albizia lophantha* (Willd.) Benth., Albizia pluma. SO Australia.

*Peltophorum dubium* (Urb.) Barneby var. *berteroarum* = *P. berteroarum* Urb., Abey. República Dominicana.

*Retama monosperma* (L.) Boiss. = *R. rhodorhizoides* Webb et Berthel., Retama blanca. Región mediterránea.

*Retama sphaerocarpa* (L.) Boiss., Retama. Península Ibérica, NO África.

*Robinia pseudoacacia* L., Falsa acacia. E EE UU.

*Robinia pseudoacacia* L. var. *fresia*, C,E EEUU.

*Schizolobium parahyba* (Vell.) S.F. Blake, Gallinazo. De México a Brasil.

*Schotia afra* (L.) Thunb., Provincia del Cabo (Sudáfrica), Namibia.

*Schotia brachypetala* Sond., Rhodesia, Mozambique, NE, S África.

*Schotia latifolia* Jacq., S África.

*Scorpiurus vermiculatus* L., O Región mediterránea, Macaronesia.

*Spartium junceum* L., Retama de olor, Gayomba. Región mediterránea, Macaronesia.

*Styphnolobium japonicum* (L.) Schott = *Sophora japonica* L., Sófora. China, Corea.

*Teline canariensis* (L.) Webb & Berthel., Tenerife, Gran Canaria (Islas Canarias).

*Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze, Palo rosa. De S Brasil a Bolivia.

*Trifolium angustifolium* L., Región mediterránea, Macaronesia.

*Trifolium campestre* Schreb., SO Asia, NO África, Europa.

*Trifolium tomentosum* L., Región mediterránea.

*Tripodion tetraphyllum* (L.) Fourr. = *Anthyllis tetraphylla* L. f.,  
Región mediterránea.

*Vicia sativa* L., Península Ibérica, Baleares.

*Wisteria floribunda* (Willd.) DC., Glicinia japonesa. Japón.

*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet = *W. chinensis* DC., Glicinia. China.

### Lemnaceae

*Lemna minor* L., Lenteja de agua. Cosmopolita.

### Lentibulariaceae

*Pinguicula esseriana* B. Kirchn., México.

*Pinguicula sp.* L. C,S América

*Utricularia bisquamata* Schrank., S África.

*Utricularia calycifida* Benj., N Sudamérica.

*Utricularia lateriflora* R. Br., Australia.

*Utricularia livida* E. Mey., Trópico, S África.

*Utricularia parthenopipes* P. Taylor., Brasil.

*Utricularia praelonga* A.St.-Hil. & Girard., Sudamérica.

*Utricularia sandersonii* Oliv., África tropical.

*Utricularia tricolor* A. St.-Hil., S América.

*Utricularia vulgaris* L., Europa, Asia, América Boreal.

### Liliaceae

*Drimia maritima* (L.) Stearn = *Urginea maritima* (L.) Baker, Región mediterránea.

### Linaceae

*Linum strictum* L., De Europa, Región mediterránea a Afganistán.

### Lythraceae

*Cuphea hyssopifolia* HBK, Cufea. México, Guatemala.

*Cuphea ignea* A. DC., Cigarrillo. México, Jamaica.

*Lagerstroemia indica* L. = *L. elegans* Wall. ex Paxton, Árbol de Júpiter. China.

*Punica granatum* L., Granada. Desde Iran al Himalaya  
*Punica granatum* L. 'Motrileño', Granada motrileño. Origen hortícola.

*Punica granatum* L. 'Nana', Granada enano. Origen hortícola.

### Magnoliaceae

*Liriodendron tulipifera* L., Tulípero de Virginia E EEUU.

*Magnolia grandiflora* L., zona costera del SE EE UU.

### Malvaceae

*Abutilon megapotamicum* (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin, Abutilón. Brasil.

*Abutilon pictum* (Gillies ex Hook.) Walp., Abutilón. Brasil, naturalizado en C y S América.

*Adansonia digitata* L., África central.

*Adansonia grandidieri* Baill., Madagascar.

*Adansonia gregorii* F. Muell. = *A. gibbosa* (A. Cunn.) Guymer ex D.A. Baum, N, NE Australia.

*Adansonia madagascariensis* Baill. = *A. bernieri* Baillon. ex Poiss., Madagascar.

*Adansonia suarezensis* H. Perrier, Madagascar.

*Adansonia za* Baill., Baobab. Madagascar.

*Adansonia fony* (Jum. & H.Perrier) H.Perrier var. *rubrostipa* = *A. rubrostipa* Jum. & H.Perrier, Madagascar.

*Alcea rosea* L., Alcea. Cosmopolita.

*Alcea rosea* L. 'Flore pleno', Origen hortícola.

*Alcea rosea* L. 'Nigra', Origen hortícola.

*Alyogyne huegelii* (Endl.) Fryxell, SO Australia.

*Alyogyne hakeifolia* (Giord.) Alef. 'Melissa Anne', Origen hortícola.

*Anisodonteia capensis* (L.) D.M.Bates, Sudáfrica.

*Bombax ceiba* L. *Malvaceae*. Algodonero rojo. India.

*Brachychiton acerifolius* (A. Cunn. ex G. Don) F. Muell. = *Sterculia acerifolia* A. Cunn., Árbol de las llamas. De Queensland a Nueva Gales del Sur (Australia).

*Brachychiton bidwillii* Hook., Australia.

*Brachychiton discolor* F. Muell. = *B. luridus* C. Moore ex F. Muell., Árbol sombrero. De Queensland a Nueva Gales del Sur.

*Brachychiton populneus* (Schott & Endl.) R. Br., Queensland, Nueva Gales Del Sur, Victoria (Australia).

*Brachychiton rupestris* (T.Mitch. ex Lindl.) K.Schum = *Sterculia rupestris* (T.Mitch. ex Lindl.) Benth., Queensland (Australia).

*Brachychiton* × *incarnatus* Guymer, Australia.

*Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir = *Chorisia insignis* Kunth, Palo borracho amarillo, Barrilito, Yuchán, Árbol botella. Perú.

*Ceiba pentandra* (L.) Gaertn., América tropical, África.

*Ceiba pubiflora* (A.St.-Hil.) K.Schum., Barrigudo, Árbol botella. Sudamérica.

*Ceiba speciosa* (A. St.-Hil.) Ravenna = *Chorisia speciosa* A. St.-Hil., Palo borracho rosado, Somohú, Árbol de los pájaros. Brasil, Argentina.

*Dombeya burgessiae* Gerrard ex Harv. = *D. mastersii* Hook. f., S, E África.

*Dombeya natalensis* Sond. = *D. tiliacea* (Endl.) Planch., S África.

*Dombeya x cayeuxii* André, Árbol de las hortensias. Origen hortícola.

*Firmiana simplex* (L.) W. Wight = *F. platanifolia* (L. f.) Marsili = *Sterculia platanifolia* L. f., Parasol de China. De Islas Ryu Kyu (Japón) a Vietnam.

*Guazuma ulmifolia* Lam., Guácima. América Tropical.

*Hibiscus arnottianus* A. Gray, Hawaii (EE UU).

*Hibiscus integrifolius* (Chapm.) Small, *H. coccineus* var. *integrifolius* Chapm., Florida, Georgia (EE UU).

*Hibiscus elatus* Sw., *Malvaceae*. Jamaica, Cuba.

*Hibiscus heterophyllus* Vent., Nueva Gales del Sur, Queensland (Australia).

*Hibiscus mutabilis* L., China.

*Hibiscus rosa-sinensis* L., Asia Tropical, China.

*Hibiscus rosa-sinensis* L. 'White swan', Cisne blanco. Origen hortícola

*Hibiscus schizopetalus* (Dyer) Hook. f., Cayena péndula. África tropical.

*Hibiscus syriacus* L., Altea, Rosa de Siria. Zona tropical de Europa, subtropical de Europa, Asia y África.

*Hibiscus tilliaceus* L., India.

*Lagunaria patersonia* (Andrews) G. Don, Lagunaria. Islas de Lord Howe, Isla de Norkfolk (Australia).

*Malva multiflora* (Cav.) Soldado, Banfi & Galasso = *Lavatera cretica* L., SO Europa, N África, SO Asia.

*Malva sylvestre* L., Europa, N África, SO Asia.

*Malvaviscus penduliflorus* Moc. & Sessé ex DC, Malvavisco. México.

*Pachira aquatica* Aubl., De C a N de S America.

*Pseudobombax ellipticum* (Kunth) Dugand, América Tropical (México y Guatemala).

### Marantaceae

*Calathea lancifolia* Boom = *C. insignis* Petersen, Brasil.

*Thalia geniculate* L., S América.

*Ctenanthe oppenheimiana* (E. Morren) K. Schum. = *Calathea oppenheimiana* E. Morren, Maranthaceae. E Brasil.

*Ctenanthe setosa* (Roscoe) Eichler, SE Brasil.

### Marsileaceae

*Marsilea batardae* Launer, Península Ibérica.

*Marsilea strigosa* Willd., Región mediterránea.



### Meliaceae

*Azadirachta indica* A. Juss., Myanmar.

*Melia azedarach* L., Melio. India, De China a Australia.

### Menispermaceae

*Cocculus laurifolius* DC., Cóculo. De India e Himalaya a China y Japón, Islas de Java (Indonesia).

### Menyanthaceae

*Nymphoides peltata* (S.G.Gmel.) Kuntze, Euroasia.

### Moraceae

*Artocarpus heterophyllus* Lam. Black Gold', Origen hortícola.

*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Hér. ex Vent. = *Morus papyrifera* L., China, Japón, Corea, Polinesia.

*Ficus benjamina* L. = *F. nitida* Thunb., Ficus. India, S China, SE Asia, N Australia.

*Ficus binnendijkii* Miq., De SE Asia a Filipinas.

*Ficus carica* L., S Península Ibérica.

*Ficus carica* L. Cuello paloma', Higuera cuello paloma. Origen hortícola.

*Ficus cyathistipula* Warb., África Tropical.

*Ficus deltoidea* Jack, Malasia.

*Ficus drupacea* Thunb. = *F. mysorensis* Roth ex Roem. & Schult, Asia

*Ficus elastica* Roxb. ex Hornem, Ficus, Higuera del caucho. De Himalaya a Península de Malaca, Sumatra e Isla De Java (Indonesia).

*Ficus elastica* Roxb. ex Hornem 'Decora', Origen hortícola.

*Ficus lyrata* Warb., África Tropical.

*Ficus macrophylla* Desf ex Pers. = *F. magnolioides* Borzí, Ficus hoja de magnolio. Australia.

*Ficus microcarpa* L. f., India, Sri Lanka y China, de SE Asia a E Australia.

*Ficus pumila* L. = *F. stipulata* Thunb. = *F. scandens* Lam., Ficus tapizante. China, Japón, Vietnam.

*Ficus pumila* L. 'Variegata', Origen hortícola.

*Ficus religiosa* L., Higuera de las pagodas. De India a SE Asia.

*Ficus rubiginosa* Desf. ex Vent. = *F. australis* Willd., Higo oxidado. E Australia.

*Ficus sycomorus* L., Sicomoro. S África.

*Maclura pomifera* (Raf.) C.K. Schneid., De Arkansas a Texas (EEUU).

*Morus alba* L., 'Fruit Less', Origen hortícola

*Morus alba* L., Morera. C y E China.

*Morus alba* L. 'Pendula', Morera llorona. Origen hortícola.

*Morus nigra* L., Morera negra. O Asia.

### Moringaceae

*Moringa borziana* Mattei, África tropical.

*Moringa oleifera* Lam., NO India.

*Moringa ovalifolia* Dinter & A. Berger, Namibia Central, SO Angola.

*Moringa rivae* Chiov., Kenia, SE Etiopía.

*Moringa stenopetala* (Baker f.) Cufod., Kenia, Etiopía.

## Musaceae

*Ensete ventricosum* (Welw.) Cheesman 'Maurelii', Plátano etíope, plátano rojo. Origen hortícola.

*Ensete ventricosum* (Welw.) Cheesman, Plátano etíope, plátano rojo. Etiopía.

*Musa acuminata* Colla = *M. cavendishii* Lamb., Platanera. SE Asia, De Tailandia a N Australia.

*Musa velutina* H. Wendl & Drude, Regiones tropicales se Asia.

## Myrtaceae.

*Acca sellowiana* (O. Berg.) Burret = *Feijoa sellowiana* (O.Berg) O.Berg, Paraguay, N Argentina, S Brasil, Uruguay.

*Callistemon rigidus* R. Br., Limpiatubos. Nueva Gales del Sur (Australia).

*Callistemon viminalis* (Sol ex Gaertn.) G. Don, Limpiatubos. Nueva Gales Del Sur, Queensland (Australia).

*Corymbia citriodora* (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson., Eucalipto limón. E Australia.

*Eucalyptus camaldulensis* Dehnh., Australia.

*Eucalyptus deglupta* Blume, Eucaliptus arcoíris. Indonesia, Mindanao (Filipinas).

*Eucalyptus diversifolia* F. Muell., Karri. SO Australia.

*Eucalyptus globulus* Labill., Eucaliptus común, eucalipto de Tasmania. SE Australia.

*Eugenia uniflora* L., = *E. myrtifolia* Salisb., Pitanga. América del Sur tropical.

*Leptospermum scoparium* J.R. Forst. & G. Forst., Australia, Nueva Zelanda.

*Melaleuca acuminata* F.J. Muell, De Nueva Gales del Sur a O Australia.

*Melaleuca styphelioides* Sm., Nueva Gales del Sur (Australia).

*Metrosideros excelsa* Sol. ex Gaertn., Árbol de navidad. Nueva Zelanda.

*Myrtus communis* L., Mirto, Arrayán. S Europa, NO África, Asia Menor, Oriente próximo.

*Psidium cattleianum* Afzel. ex Sabine = *P. littorale* Raddi, Guayabo rosa. Brasil.

*Psidium guajava* L., Guayabo. América Tropical.

*Psidium guayava* L. 'Guayabito limón', Guayabito limón. Origen hortícola.

*Psidium guayava* L. 'Guayabito rojo', Guayabito rojo. Origen hortícola.

*Psidium guayava* L. 'Guayabo rojo, Guayabo rojo. Origen hortícola.

*Syzygium jambos* (L.) Alston, Pomarroza. Asia tropical, África.

### Nelumbonaceae

*Nelumbo nucifera* Gaertn. = *N. speciosa* Willd., Flor de loto. Egipto, India, China, Japón, Filipinas.

*Nelumbo nucifera* Gaertn. var. *rosea*, Loto rosa. China, Japón.

*Nelumbo nucifera* Gaertn. 'Heilongjiang Lian', Loto. Origen hortícola.

*Nelumbo nucifera* Gaertn. 'Xiangshan Lian', Loto. Origen hortícola.

### Nepenthaceae

*Nepenthes* L. 'Miranda', Origen hortícola.

*Nepenthes* 'Bloody Mary', Origen hortícola.

*Nepenthes* 'Alata' Blanco, tropical.

### *Nyctaginaceae*

*Bougainvillea glabra* Choisy, Brasil.

*Bougainvillea spectabilis* Willd., Buganvilla. Brasil.

*Bougainvillea x buttiana* Holttum & Standl., Origen hortícola.

*Mirabilis jalapa* L., Don Diego de noche, Don Pedro. América Tropical.

### *Nymphaeaceae*

*Euryale ferox* Salisb., Nenúfar gigante. De india a Japón.

*Nuphar lutea* (L.) Sm., Europa, N África y N Asia.

*Nymphaea* Lat.-Marl. 'Attraction', Nenúfar. Origen hortícola.

*Nymphaea* Dreer 'James Brydon', Nenúfar. Origen hortícola.

*Nymphaea* Perry D. Slocum 'King of Blues', Nenúfar. Origen hortícola.

*Nymphaea* Lat.-Marl. 'Madama Wilfron Gonner', Nenúfar. Origen hortícola.

*Nymphaea* Perry D. Slocum 'Yellow Sensation', Nenúfar. Origen hortícola.

*Nymphaea x marliacea* Lat.-Marl. 'Albida', Nenúfar. Origen hortícola.

*Nymphaea sp.* L. Mayla', Origen hortícola.

*Nymphaea sp.* L. Murasaki Shikibu', Origen hortícola.

*Nymphaea sp.* L. Wanbisia', Origen hortícola.

*Nymphaea sp.* L. Perry's Pink', Origen hortícola.

*Nymphaea sp.* L. Black Princess', Origen hortícola.

*Nymphaea sp.* L. Daubenyana', Origen hortícola.

*Nymphaea sp.* L. 'Tanzanite', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

*Victoria cruziana* A.D. Orb., Victoria. Argentina, Brasil, Paraguay

### Oleaceae

*Forsythia x intermedia* Zabel, Campanita china. Origen hortícola.

*Fraxinus americana* L., De Florida a Tejas (E EE UU).

*Fraxinus angustifolia* Vahl = *F. rotundifolia* Mill., S Europa, So Asia.

*Fraxinus excelsior* L., Europa, Asia menor.

*Fraxinus griffithii* C. B. Clarke = *F. formosana* Hayata, De China y Birmania a Filipinas, Archipiélago Malayo.

*Fraxinus ornus* L., Europa, O Asia.

*Jasminum azoricum* L., Jazmín de las azores. Azores (Portugal).

*Jasminum humile* L., Jazmín italiano. De Afganistan a SO China.

*Jasminun multipartitum* Hochst, Sudáfrica.

*Jasminum officinale* L., Jazmín común, Jazmin real. Himalaya, SO China.

*Jasminum polyanthum* Franch., Jazmín de invierno, Jazmín de china. Yunnan (SO China).

*Jasminum sambac* (L.) Ait., Jazmín de Arabia. S Asia.

*Jasminum simplicifolium* G. Forst., Jazmín mandarino. Australia, Islas del Pacífico.

*Ligustrum japonicum* Thunb., Aligustre. Hong Kong (China), Japón, Corea.

*Ligustrum japonicum* Thunb. `Variegatum´, Aligustre matizado.  
rigen hortícola.

*Ligustrum ovalifolium* Hassk., Japón.

*Olea europaea* L., Olivo. Región mediterránea.

*Olea europaea* L. subsp. *sylvestris* (Mill.) Rouy ex hegi, Acebuche.  
Región mediterránea.

*Olea europaea* L. subsp. *cuspidata* (Wall. & G.Don) Cif., De África  
a India.

*Olea europaea* L. subsp *guanchica* P.Vargas et al. = *O. cerasiformis*  
Rivas Mart. & del Arco, Acebuche. Islas Canarias, Madeira.

*Olea exasperata* Jacq., Provincia del cabo (Sudáfrica).

*Olea paniculata* R. Br., E Australia, SE Asia

*Phillyrea angustifolia* L., Labiérnago, Ladierna. Región  
mediterránea occidental.

*Phillyrea latifolia* L., Labiérnago negro. Región mediterránea.

*Syringa oblata* Lindl., China, Corea.

### Oleandraceae

*Nephrolepis biserrata* (Sw.) Schott, Tropical, Subtropical.

*Nephrolepis cordifolia* (L.) C. Presl, Pantropical.

*Nephrolepis exaltata* (L.) Schott, Helecho. América Tropical, África,  
Polinesia.

### Onagraceae

*Gaura lindheimeri* Engelm. & A. Gray, México.

*Oenothera speciosa* Nutt., SE EEUU, México.

### Orchidaceae

*Brassia* sp. R. Br., C. América, S América tropical.

*Cattleya amethystoglossa* Linden & Rchb. f. ex R. Warner, Brasil.

*Cattleya aurantiaca* (Bateman ex Lindl.) P.N. Don, México. C América.

*Cattleya fidelensis* (Pabst) Van der Berg = *Laelia fidelensis* Pabst, Río de Janeiro (Brasil).

*Cattleya maxima* Lindl., Colombia, Ecuador, Perú.

*Epidendrum radicans* Pav. ex Lindl., C América, N Sudamérica, O India.

*Epidendrum* sp. L., América tropical.

*Ophrys fusca* Link., Abejera. Región mediterránea occidental.

*Paphiopedium* sp. Pfitzer, SE Asia Tropical.

*Phalaenopsis* sp. Blume,

*Vanda* Jones ex R. Br. Blue magic', Origen hortícola.

*Vanda* Jones ex R. Br. Cerise purple', Origen hortícola.

*Vanilla planifolia* Jacks. ex Andrews, México.

*Vanilla* sp. Mill., Regiones tropicales y subtropicales

### Orobanchaceae

*Orobanche gracilis* Sm., Jopo. S, C, E Europa.

### Oxalidaceae

*Averrhoa carambola* L., Carambola. Malasia.

*Averrhoa carambola* L. B-10', Carambola B-10. Origen hortícola.



*Averrhoa carambola* L. Fwang Tung', Carambola Fwang Tung.  
Origen hortícola.

*Oxalis corniculata* L., S Europa.

*Oxalis pes-caprae* L., Región mediterránea, O Europa.

*Oxalis debilis* Kunth var. *corymbosa* (DC.) Lourteig = *Oxalis corymbosa* DC., S América.

### Pandanaceae

*Pandanus utilis* Bory, Madagascar.

### Papaveraceae

*Fumaria officinalis* L., Europa, de Región mediterránea a Irak.

*Fumaria parviflora* Lam., S, C Europa.

*Papaver dubium* L., Europa, Asia, N África, Macaronesia.

*Papaver hybridum* L., Europa, SO Asia, N África, Macaronesia.

*Papaver rhoeas* L., Europa, Asia, N África, Macaronesia.

### Passifloraceae

*Passiflora caerulea* L., Pasionaria. De Brasil a Argentina.

*Passiflora edulis* Sims, Maracuyá. Brasil.

### Paulowniaceae

*Paulownia tomentosa* Steud., Paulonia. China.

### Phormiaceae

*Phormium tenax* J.R. Forst & G. Forst, Formio, Lino de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda.

*Phormium tenax* J. R. Forst. & G. Forst. `Nana´, Formio. Origen hortícola.

*Phormium tenax* J.R. Forst & G. Forst cv. Jack spratt, Australia.

### Pinaceae

*Abies nordmanniana* (Steven) Spach, Abeto del Cáucaso. Cáucaso, N Asia Menor.

*Abies pinsapo* Boiss. = *A. hispanica* Chambray, Abeto español, Pinsapo. España, N África.

*Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrière = *C. africana* Gordon ex Knight, Cedro del Atlas. Argelia y Marruecos.

*Cedrus deodara* (Roxb ex D. Don) G. Don = *C. Indica* Chambray, Cedro del Himalaya. Himalaya.

*Cedrus libani* A. Rich. = *C. libanotica* Link, Cedro del Líbano. Asia Menor.

*Picea pungens* Engelm. Glauca globosa', Origen hortícola.

*Pinus canariensis* C. Sm., Pino canario. Islas Canarias occidentales

*Pinus halepensis* Mill., Pino carrasco, Pino de Alepo. Región mediterránea.

*Pinus pinaster* Aiton, Pino marítimo. Región mediterránea.

*Pinus pinea* L. = *P. maderensis* Ten., Pino piñonero. S Europa, O Asia.

### Pittosporaceae

*Hymenosporum flavum* F.Muell., Plumaria australiana. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

*Pittosporum bicolor* Hook., Pitosporo. E Australia.

*Pittosporum tenuifolium* Banks & Sol. ex Gaertn., Nueva Zelanda.

*Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton, Pitosporo, Azahar de China. China, Japón, Corea.

*Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton `Nana`, Azahar de China. Origen hortícola.

*Pittosporum undulatum* Vent., Pitosporo. E Australia.

### Plantaginaceae

*Russelia equisetiformis* Schldl. & Cham. = *R. juncea* Zucc., Lagrimas de amor, Planta del coral. México.

### Plantaginaceae

*Plantago afra* L., S Europa.

*Plantago albicans* L., Región mediterránea.

*Plantago coronopus* L., Europa, Macaronesia, SO Asia, N África.

*Plantago lagopus* L., S Europa.

### Platanaceae

*Platanus orientalis* L. var. *acerifolia* Dryand. = *P. acerifolia* (Dryand.) Willd., Plátano de sombra. Mediterráneo oriental.

### Plumbaginaceae

*Armeria hirta* Willd., Región mediterránea.

*Armeria malacitana* Nieto Fel., Sierras de Nmalaga, Mijas, Ojen (Málaga), Sierras de Grazalema y Blanca (Cádiz)

*Armeria marítima* (Mill.) Willd., Armeria, clavelina de mar. Zonas costeras de Europa.

*Armeria villosa* Girard subsp. *carratracensis* (Bernis) Nieto Fel., Málaga (Sierra de Aguas, Próximo a Álora y Sierra Parda, Tolox).

*Limoniastrum monopetalum* (L.) Boiss., Región mediterránea.

*Limonium preauxii* Kuntze, Gran Canaria (Islas Canarias).

*Limonium sinuatum* (L.) Mill., Región mediterránea.

*Plumbago auriculata* Lam. = *P. capensis* Thunb., Jazmín azul, Celestina. S África.

### Poaceae

*Aegilops geniculata* Roth, S Europa.

*Ammophila arenaria* (L.) Link subsp. *arundinacea* H. Lindb. f., Costas Mediterráneas y atlántica (desde Francia a Marruecos).

*Aristida adscensionis* L., EE UU.

*Arundo donax* L., Cañavera, Región mediterránea.

*Avena sterilis* L., S Europa.

*Bambusa textilis* McClure, S China.

*Bambusa tuldoides* Munro = *B. ventricosa* McClure, China.

*Bambusa ventricosa* McClure, China.

*Bambusa vulgaris* Schrad., Bambú común. Tropical.

*Briza maxima* L., S Europa.

*Briza* sp L., Hemisferio norte.

*Bromus rigidus* Roth = *B. matritensis* Cav., Región mediterránea.

*Bromus rubens* L., SO Europa, N África, SO Asia, Macaronesia.

*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. = *Desmazeria rigida* (L.) Tutin, S, O Europa.

*Cortaderia selloana* (Schult. & Schult.) Asch. & Graebn. =  
*Gynerium argenteum* Ness., S América.

*Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf, Lemongrass'. Ceilan, Malasia.

*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle, Citronela. Ceilan, Malabar.

*Cynodon dactylon* (L.) Pers., Hierba de las Bermudas. Región  
templada Hemisferio Sur.

*Dactylis glomerata* L., Caracolillo. Europa.

*Festuca arundinacea* Schreb., Europa, N África.

*Festuca glauca* Vill., Castañuela azul. Europa.

*Hordeum murinum* L. subsp *leporinum* (Link.) Arcang. = *H.*  
*leporinum* Link., Región mediterránea.

*Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf = *H. sinaica* (Delile) G. López,  
Cerrillo. Región mediterránea, Portugal.

*Indocalamus tessellatus* (Munro) Keng f. = *Sasa tessellata*  
(Munro) Makino & Shibata, China.

*Lagurus ovatus* L., O Europa, Región mediterránea, Macaronesia.

*Lamarckia aurea* (L.) Moench, Región mediterránea, Portugal.

*Lolium rigidum* Gaudin, Euroasia.

*Otatea acuminata* (Munro) Calderon & Soderstr., México.

*Phalaris minor* Retz., Región mediterránea, O Asia.

*Phyllosasa tranquillans* (Koidz.) Demoly Shiroshima' =  
*Hibanobambusa tranquillans* (Koidz.) Maruy. & H.Okamura,  
Origen hortícola.

*Phyllostachys aurea* Rivière & C. Rivière, Bambú caña de pescar.  
SE China.

*Phyllostachys aureosulcata* McClure, Bambú acanalado amarillo.  
NE China.

*Phyllostachys bambusoides* Siebold & Zucc., Bambú. China.

*Phyllostachys nigra* (Lodd. ex Lindl.) Munro, Bambú negro. E  
China.

*Phyllostachys sulphurea* (Carrière) Rivière & C. Rivière = *P.*  
*viridis* (R.A. Young) McClure, China.

*Piptatherum miliaceum* (L.) Coss., Región mediterránea,  
Macaronesia, N África, SO Asia.

*Pleiblastus argenteostriatus* (Regel) Nakai = *Arundinaria pumila*  
Mitford = *Pleiblastus chino* 'Elegantissimus' (Franchet & Savatier)  
Makino, Japón.

*Pleiblastus fortunei* (Van Houtte) Nakai = *Pleiblastus variegatus*  
(Siebold ex Miq.) Makino, Japón.

*Pleiblastus gramineus* (Bean) Nakai, Nueva Zelanda.

*Pleiblastus linearis* (Hack.) Nakai, S. Japón.

*Poa annua* L., Europa.

*Poa infirma* Kunth, Inglaterra, Región mediterránea, Irano-  
Turanica, Macaronesia.

*Polypogon monspeliensis* (L.) Desf., Europa.

*Pogonatherum paniceum* (Lam.) Hack., Bambú de interior. Asia

*Pseudosasa disticha* (Mitford) Nakai = *Pleiblastus distichus*  
(Mitford) Nakai, Japón.

*Pseudosasa japonica* (Steud) Makino = *Arundinaria japonica*  
Siebold & Zucc. ex Steud., Bambú flecha. Japón, Corea.

*Rostraria cristata* (L.) Tzvelev, Región mediterránea.

*Saccharum officinarum* x *Saccarum spontaneum* L. var. 70/3370,  
Caña de azúcar. Origen hortícola.

*Saccharum officinarum* x *Saccarum spontaneum* L. var. 71/6180,  
Caña de azúcar. Origen hortícola

*Saccharum officinarum* x *Saccarum spontaneum* L. var. 71/799,  
Caña de azúcar. Origen hortícola

*Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum* L. var. **78/1233**,  
Caña de azúcar. Origen hortícola

*Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum* L. var. **CO 11-48**,  
Caña de azúcar. Origen hortícola

*Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum* L., Caña de  
azúcar. Origen hortícola.

*Sasa veitchii* (Carrière) Rehder, Japón.

*Semiarundinaria fastuosa* (Mitford) Makino = *Bambusa fastuosa*  
Lat.-Marl. ex Mitford, Japón.

*Shibataea kumasasa* (Steud.) Makino, S Japón.

*Stipa bromoides* (L.) DRaörf., N África.

*Stipa tenacissima* L. = *Macrochloa tenacissima* (L.) Kunth, W  
Región mediterránea.

### Podocarpaceae

*Podocarpus neriifolius* D. Don = *P. discolor* Blume, Podocarpo.  
De Himalaya a China, La Unión de Myanmar, Laos, Malasia.

### Polygalaceae

*Polygala myrtifolia* L., Poligala. E del Cabo, Natal (Sudáfrica).

*Polygala rupestris* Pourr., Región mediterránea.

### Polygonaceae

*Coccoloba uvifera* (L.) L., América tropical.

*Emex spinosa* (L.) Compd., Región mediterránea, Macaronesia.

*Muehlenbeckia complexa* Meisn., Nueva Zelanda.

*Persicaria capitata* (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross = *Polygonum capitatum*  
Buch.-Ham. ex D. Don, Himalaya, E Asia.

*Phlebodium sp.* (R.Br.) J.Sm. Regiones tropicales y subtropicales de América.

*Polygonum aviculare* L., Euroasia.

*Rumex aculeatus* subsp. *induratus* (Boiss & Reuter) Maire & Weiller in Mare, Acedera redonda. C, S Península Ibérica, NO África.

*Rumex bucephalophorus* L., Región mediterránea, SO Asia, Macaronesia.

*Rumex crispus* L., Península Ibérica, Baleares.

### *Polypodiaceae*

*Didymochlaena truncatula* (Swartz) Js. Sm., S América, África, Madagascar, India, Nueva Guinea, Islas Fiji.

*Microsorium musifolium* Copel., Helecho cocodrilo. Malasia, Indonesia, Filipinas, Nueva guinea, Polinesia.

*Phlebodium aureum* (L.) J. Sm., C, S América, O India.

*Phymatosorus diversifolius* (Willd.) Pic. Serm., Australia, Nueva Zelanda.

*Phymatosorus scolopendria* (Burm. f.) Pic. Serm., Tropical.

*Platynerium bifurcatum* (Cav.) C. Chr. = *P. alpicorne* Hort., Cuerno de alce. Queensland, Nueva Gales Del Sur (Australia).

*Platynerium stemaria* (P. Beauv.) Desv., África tropical, Madagascar.

*Platynerium superbum* De Joch. & Hennipman, Nueva Gales del Sur, Queensland.

*Lecanopteris celebica* Hennipman, Célebes (Indonesia).

*Myrmecopteris lomarioides* (Kunze ex Mett.) Pic. Serm., Célebes (Indonesia).



*Myrmecophila sinuosa* (Hook.) T. Nakai ex H. Itô, Malasia a Isla Salomón .

*Lecanopteris pumila* Blume, Indonesia, Malasia, Islas Filipinas.

*Lecanopteris pumila x celebica* (Baker) Jessop, Origen hortícola

### Pontederiaceae

*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms., Jacinto de agua. América Tropical.

*Pontederia cordata* L., De E EE UU a Caribe.

### Portulacaceae

*Cistanthe grandiflora* (Lindl.) Schltl. = *Calandrinia grandiflora* Lindl., Pata de Guanaco. Chile.

### Potamogetonaceae

*Potamogeton nodosus* Poir, Euroasia.

### Primulaceae

*Anagallis arvensis* L., N, C, S Europa, W Asia, N África.

*Cyclamen persicum* Mill., SE Europa.

*Primula* L. *sp.* 'Wanda Supreme Series', Origen hortícola.

### Proteaceae

*Stenocarpus sinuatus* (A. Cunn.) Endl., Australia.

*Grevillea lanigera* A. Cunn. ex R.Br. 'Compacta' = *G. Lanigera* A. Cunn. 'Mount Tamboritha', Origen hortícola.

*Grevillea robusta* A. Cunn. ex R. Br., Arbol del fuego, Roble australiano, Zosle plateado australiano. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

*Hakea salicifolia* (Vent.) B.L. Burtt, Australia.

*Macadamia ternifolia* F. Muell., Nuez de Macadamia. Queensland (Australia).

### Pteridaceae

*Cheilanthes pteridioides* C. Chr., Región mediterránea y macaronesia.

*Pellaea rotundifolia* (G. Forst.) Hook, Nueva Zelanda.

*Pteris cretica* L., Trópical y Subtropical.

*Pteris cretica* L. `Albo lineata, Origen hortícola.

*Pteris cretica* L. `Parkeri´, Origen hortícola.

*Pteris cretica* L. `Wimsettii´, Origen hortícola.

*Pteris ensiformis* Burm. f. `Evergemiensis´, Origen hortícola.

*Pteris vittata* L., S África, Madagascar, Asia, Malasia, Nueva Guinea, Australia. ´

*Pteris sp.*, L.

### Ranunculaceae

*Aquilegia vulgaris* L., Aguiluña. Europa, Asia.

*Clematis cirrhosa* L., Clemátide. Región mediterránea.

*Clematis flammula* L., Vidriera, Gata rabiosa. Euroasia.

*Nigella gallica* Jord., N África, S Europa.

### Resedaceae

*Reseda alba* L., Región mediterránea.

*Reseda lutea* L., Europa, N África, SO Asia, Macaronesia.

### Restionaceae

*Elegia tectorum* (L.f.) Moline & H.P.Linder, Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

### Rhamnaceae

*Rhamnus alaternus* L., Aladierno, Sanguino. Región mediterránea.

*Rhamnus lycioides* L., Espino negro. Región mediterránea, Portugal.

*Rhamnus lycioides* L. subsp. *oleoides* (L.) Jahand. & Maire, Región mediterránea.

*Ziziphus lotus* (L.) Lam., Región mediterránea.

### Rosaceae

*Bencomia caudata* (Aiton) Webb & Berthel., Becomia de monte. Islas Canarias occidentales, Madeira.

*Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai = *C. lagenaria* (Loisel.) Koidz., China, La Unión de Myanmar.

*Cotoneaster horizontalis* Decne., Cotoneaster. O China.

*Cotoneaster lacteus* W.W.Sm., Cotoneaster. Yunnan (China).

*Crataegus azarolus* L., Región mediterránea, Oriente próximo.

*Crataegus monogyna* Jacq., Majuelo, Espino albar. O, C Europa, Caucaso, Anatolia, Oriente Próximo, NO África.

*Cydonia oblonga* Mill. 'Coinos', Membrillos coínos. Origen hortícola.

*Cydonia oblonga* Mill., Membrillero. SE Asia, SE Arabia.

*Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., Níspero. Japón, China.

*Malus domestica* L., var. *coino*, Origen hortícola.

*Malus domestica* L., var. *ronda*, Origen hortícola.

*Malus domestica* L. 'Arena', Origen hortícola.

*Malus domestica* L. 'Sevillano', Origen hortícola.

*Mespilus germanica* L., Níspero de invierno. Europa Asia Menor.

*Photinia x fraseri* Dress, 'Red Robin', Origen hortícola.

*Potentilla sp.* L., Hemisferio norte.

*Prunus cerasifera* Ehrh. 'Nigra', Ciruelo rojo. SO Asia, Cáucaso.

*Prunus domestica* L., Ciruelo púrpura. SE Europa, SO Asia.

*Prunus domestica* L. 'Abrehueso', Ciruela abrehueso. Origen hortícola.

*Prunus domestica* L. 'Safranera', Ciruela safranera. Origen hortícola.

*Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb. = *P. amygdalus* Batsch = *P. communis* (L.) Arcangeli, Almendro. Balcanes, SO Asia, N África.

*Prunus persica* (L.) Batsch Stark 'Red Gold', Nectarina Stark Red Gold. Origen hortícola.

*Prunus persica*. (L.) Batsch var. *independence*, Nectarina independence. Origen hortícola.

*Pyracantha coccinea* M. Roem., Espino de fuego. SE Europa.

*Pyrus communis* L., Peral. Caucaso, E Europa.

*Pyrus communis* L. Franco', Peral. Origen hortícola.

*Rhaphiolepis x delacourii* Andr, Origen hortícola.

*Rosa banksiae* R.Br., Rosal de Banks. O y C China.

*Rosa sempervirens* L., Mosqueta. S Europa, NO África, Turquía.

*Rubus ulmifolius* Schott, Zarzamora. Europa, NO África,  
Macaronesia.

*Sorbus domestica* L., Serbal común. C, S Europa, NW África,  
Chipre, Anatolia, Cáucaso.

*Spiraea cantoniensis* Lour. = *S. reeversiana* Lindl., Espírea,  
Escoba. China, Japón.

*Spiraea japonica* L. f. 'Little Princess', Pequeña princesa. Origen  
hortícola.

*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel, Origen hortícola.

### Rubiaceae

*Asperula hirsuta* Desf., S Peninsula Ibérica, NO África.

*Coffea arabica* L. var. *la robusta*, Origen hortícola.

*Coffea arabica* L., África tropical.

*Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner = *C. robusta* L. Linden,  
Cafeto robusto. O África tropical.

*Coprosma repens* A. Rich. Marple Queen', Origen hortícola.

*Coprosma repens* A. Rich., Nueva Zelanda.

*Crucianella maritima* L., Región mediterránea.

*Galium aparine* L., Euroasia, Sudamérica.

*Galium tricornerutum* Dandy, S, O, C Europa.

*Galium viridiflorum* Boiss & Reut., S de España: Serranía de  
Ronda, Sierra Bermeja, Sierra Tejeda y valle del río Guadalfeo.

*Hydnophytum moseleyanum* Becc., Sudeste de Asia

*Hydnophytum puffii* Y.W.Low, Sugau & K.M.Wong, Sabah (Malasia).

*Hydnophytum sp.* Jack, Asia Sudoriental.

*Myrmecodia beccarii* Hook.f., Australia.

*Pennisetum clandestinum* Hochst. ex Chiov. var. *kikuyu*. E África.

*Pentas lanceolata* (Forssk.) Deflers, De E África a S Arabia.

*Plocama pendula* Aiton, Balo. Islas Canarias.

*Rogiera amoena* Planch. = *Rondeletia amoena* (Planch) Hemsl., México , Belice , Guatemala , El Salvador , Nicaragua , Costa Rica y Panamá

*Rondeletia odorata* Jacq. = *R. speciosa* Lodd., Cuba, Panamá.

*Rubia peregrina* L., S, O Europa.

*Sherardia arvensis* L., Europa.

*Valantia hispida* L., Región mediterránea, S Portugal.

### Rutaceae

*Diosma hirsuta* L. = *D. ericoide* L., Sudáfrica.

*Citrus australasica* F.Muell, Lima dedo, Caviar cítrico. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

*Calodendrum capense* (L. f.) Thunb., Castaño del Cabo. S África.

*Casimiroa edulis* La Llave, México, C América.

*Casimiroa tetrameria* Millsp., Matasano. C América.

*Citrus x aurantium* L., Naranja amargo. Origen hortícola.

*Citrus x bergamia* Risso & Poit., Bergamota. Origen hortícola.

*Citrus hystrix* DC., Combava. SE Asia.

*Citrus japonica* Thunb. = *Fortunella margarita* (Lour.) Swingle,  
Kumquat. SE China.

*Citrus limon* (L.) Osbeck, Limonero. SE Asia.

*Citrus maxima* (Burm.) Merr. = *C. grandis* (L.) Osbeck, Pomelo.  
Malasia, Polinesia.

*Citrus medica* L. = *C. medica* var. *digitata* Risso ex Guillaumin.  
cidro, citrón. SE Asia

*Citrus medica* L. var. *sarcodactylis* (Siebold ex Hoola van Nooten)  
Swingle, Mano de Buda. Nordeste de la India y China.

*Citrus sinensis* (L.) Osbeck, Naranja dulce. China.

*Citrus reticulata* Blanco, *Rutaceae*. Mandarino. Filipinas, SE Asia.

*Citrus trifoliata* L. = *Poncirus trifoliata* (L.) Raf., Naranja  
espinoso. N China.

*Murraya paniculata* (L.) Jack. = *M. exotica* (L.) Millsp., Jazmín de  
la India. SE Asia, Malasia.

*Ruta graveolens* L., Ruda. S Europa.

### Salicaceae

*Populus alba* L., Álamo blanco. C, S Europa, O Asia, N África.

*Populus nigra* L., Chopo, Álamo negro. Europa oriental, O Asia.

*Salix babylonica* L., Sauce llorón. E Asia.

*Salix pedicellata* Desf., Sauce. Región mediterránea.

### Salviniaceae

*Salvinia natans* (L.) All., Euroasia, N África.

### Santalaceae

*Osyris alba* L., Retama loca, Guardalobo. S Europa, N África, SO Asia.

### Sapindaceae

*Acer negundo* L., América del Norte y América Central.

*Acer negundo* L. f. *variegatum*, América del Norte.

*Acer tataricum* L., Acer de Tataria. SE Europa.

*Cupaniopsis anacardioides* (A. Rich.) Radlk, Cupania de hojas de anacardo. E, N Australia.

*Dimocarpus longan* Lour. = *Euphoria longan* (Lour.) Steud., Longan. India, Sri Lanka.

*Dodonaea viscosa* (L.) Jacq. 'Purpurea', Origen hortícola.

*Koelreuteria bipinnata* Franch., Árbol de la lluvia chino. China.

*Koelreuteria elegans* (Seem.) A. C. Sm., Árbol de la lluvia de oro. Taiwan, Fiji.

*Koelreuteria paniculata* Laxm. = *K. apiculata* Rehder & E.H. Wilson, Jabonero de China, Árbol de los farolillos. China.

*Litchi chinensis* Sonn., Lichi. China.

*Litchi chinensis* Sonn. 'B-10', Lichi B-10. Origen hortícola.

*Litchi chinensis* Sonn. 'Kawai-Mai-Pink', Litchi Kawai-Mai-Pink. Origen hortícola.

*Ungnadia speciosa* Endl., California (EEUU).

### Sapotaceae

*Argania spinosa* (L.) Skeels, Argán. Marruecos, Sahara.



*Manilkara zapota* (L.) P. Royen, Chicozapote, Sapodilla. México, C América.

*Pouteria campechiana* (Kunth) Baehni 'Canistel Fes', Canistel Fes. Origen hortícola.

*Pouteria campechiana* (Kunth) Baehni 'Canistel Bruce', Canistel Bruce. Origen hortícola.

*Pouteria lucuma* (Ruiz & Pav.) Kuntze, Lucumo. Perú, Bolivia.

*Pouteria lucuma* (Ruiz & Pav.) Kuntze 'La Molina', Lucumo La Molina. Origen hortícola.

### Sarraceniaceae

*Sarracenia alata* (Alph. Wood.) Alph. Wood., S Alabama, E texas (EEUU).

*Sarracenia leucophylla* Raf., NE Alabama (EE UU).

*Sarracenia minor* Walter, SE EEUU.

*Sarracenia minor* subsp. *minor* Walter, SE EEUU.

*Sarracenia oreophila* Wherry., NE Alabama (EE UU).

*Sarracenia purpurea* L., N América.

### Saururaceae

*Houttuynia cordata* Thunb., China, Japón.

### Saxifragaceae

*Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch = *B. cordifolia* (Haw.) Sternb., Siberia, Mongolia.

*Saxifraga stolonifera* Curtis, China, Japón.

### Scrophulariaceae

*Alonsoa meridionalis* (L.f.) Kuntze, Chile.

*Antirrhinum majus* L., Conejitos. Región mediterránea.

*Hebe andersonii* (Lindl. & Paxt.) Cockayne `Variegata`, Origen hortícola.

*Hebe pinguifolia* (Hook. f.) Cockayne & Allan `Pagei`, Origen hortícola.

*Linaria platycalyx* Boiss., Sierra de Ronda (Málaga)

*Misopates orontium* (L.) Raf., S Europa, N África.

*Scrophularia peregrina* L., Región mediterránea, SO Asia.

### Selaginellaceae

*Lycopodioides apoda* (L.) Kuntze = *Selaginella apoda* (L.) C. Morren, E, N América.

*Selaginella kraussiana* (Kunze) A. Braun, S África.

*Selaginella martensii* Spring `Variegata`, Origen hortícola.

*Selaginella sp.*, P. Beauv. Trópicos

### Simaroubaceae

*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle = *A. glandulosa* Desf. = *Toxicodendron altissimum* Mill., China.

### Smilacaceae

*Smilax aspera* L., S Europa, O Asia, Macaronesia, N África.

### Solanaceae

*Brugmansia x candida* Pers. = *Datura x candida* (Pers.) Voigt,  
Origen hortícola.

*Brugmansia suaveolens* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.  
Presl, SE Brasil.

*Brugmansia x insignis* (Barb.Rodr.) Lockwood ex R.E.Schult,  
Origen hortícola.

*Brunfelsia pauciflora* (Cham. & Schltld.) Benth. = *B. calycina*  
Benth., Brasil.

*Cestrum aurantiacum* Lindl, Galán anaranjado. C América.

*Cestrum elegans* (Brongn. ex Neumann) Schltld. = *C. purpureum*  
(Lindl.) Standl, México.

*Cestrum x cultum* Francey, Galán rosado. Origen hortícola.

*Cestrum nocturnum* L, Sudamérica.

*Juanulloa mexicana* (Schltld.) Miers, dedo dotrado.Perú.

*Lycianthes rantonnetii* (Carrière ex Lesc.) Bitter, = *Solanum*  
*rantonnetii* Carrière, Argentina, Paraguay.

*Lycium barbarum* L., Goji. China.

*Lycium chilense* Bertero, Chile

*Lycium intricatum* Boiss, S Europa, N África.

*Petunia hybrida* Vilm, Origen hortícola.

*Petunia hybrida* Vilm., 'Grandiflora'. Origen hortícola.

*Solandra maxima* (Moc. & Sessé ex Dunal) P.S.Green = *S.*  
*hartwegii* C.F. Ball, Trompetas. México.

*Solanum jasminoides* J. Paxton, Solano de flor blanca. Brasil.

*Solanum americanum* Mill. = *S. nigrum* L, N Europa.

*Streptosolen jamesonii* (Benth) Miers, Estreptosolen. Andes  
colombianos, Ecuador, Perú.

*Whitania frutescens* (L.) Pauquy, Oroval. Región mediterránea.

### Strelitziaceae

*Ravenala madagascariensis* Sonn., Árbol del viajero, palma del viajero. Madagascar.

*Strelitzia juncea* (Ker Gawl.) Link, Sudáfrica.

*Strelitzia nicolai* Regel & K. Koch, Ave gigante del paraíso. Regiones costera Del S De Natal y NE Provincia Del Cabo (Sudáfrica).

*Strelitzia reginae* Banks = *S. parvifolia* W.T. Aiton, Ave del paraíso. S África.

### Stylidiaceae

*Stylidium adnatum* R. Br., Australia.

*Stylidium debile* F. Muell, Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

*Stylidium graminifolium* SW. ex Willd., Tasmania (Australia).

### Tamaricaceae

*Tamarix parviflora* DC., Taraje. NE región mediterránea.

### Taxaceae

*Taxus baccata* L., Región mediterránea.

### Thelypteridaceae

*Christella dentata* (Forssk.) Brownsey & Jermy, Tropical, subtropical.

### Thymelaeaceae

*Thymelaea hirsuta* (L.) Endl., Bolaga, Matapollo. Región mediterránea.

### Tiliaceae

*Tilia cordata* Mill., Tilo de hojas pequeñas. Europa.

*Tilia platyphyllos* Scop., Tilo, Tilo de hojas grandes. C, S Europa.

*Tilia tomentosa* Moench = *T. argentea* Desf., Tilo plateado. *Europa oriental, N Anatolia.*

### Tropaeolaceae

*Tropaeolum majus* L, Capuchina Perú.

*Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pav, Andes centrales.

### Typhaceae

*Typha angustifolia* L., Totorá. Hemisferio norte

### Ulmaceae

*Ulmus minor* Mill. = *U. angustifolia* (Weston) Weston, Olmo. Europa, NO Asia, N América.

### Urticaceae

*Parietaria judaica* L. = *P. diffusa* Merlet & W.D.J.Koch, O, S Europa.

*Pilea depressa* (Sw.) Blume, SO EEUU.

*Pilea nummulariifolia* (Sw.) Wedd., De O del S EEUU a N de S América.

*Soleirolia soleirolii* (Req.) Dandy, España, Francia, Italia.

*Urtica dioica* L., Euroasia.

### Verbenaceae

*Aloysia citriodora* Palau = *A. triphylla* (L'Hér.) Britton, Hierba Luisa. Argentina, Chile.

*Aloysia looseri* Moldenke, Chile.

*Citharexylum spinosum* L. = *C. quadrangulare* Jacq., Antillas, N América del Sur.

*Duranta erecta* L. 'Geisha girl', Duranta. Origen hortícola.

*Duranta erecta* L. = *D. repens* L., Duranta. Brasil.

*Glandularia canadensis* (L.) Small = *Verbena canadensis* (L.) Britton, Verbena rosa. América del Norte.

*Lantana camara* L. 'Flava', Origen hortícola.

*Lantana camara* L. 'Nana', Origen hortícola.

*Lantana camara* L., Banderita española. América Tropical.

*Lantana montevidensis* (K. Spreng.) Briq. = *L. sellowiana* Link et Otto = *Lippia montevidensis* Spreng., Lantana rastrera. S América.

*Petrea volubilis* L., América tropical.

*Phyla nodiflora* (L.) Greene var. *rosea* (D. Don) Moldenke = *Lippia repens* Spreng., Tropical y subtropical.

*Verbena x hybrida* Groenl. & Rumpler 'Chambray', Origen hortícola.

*Verbena x hybrida* Voss., Verbena. Origen hortícola.

## Violaceae

*Viola hederacea* Labill., Violeta australiana. Australia.

*Viola odorata* L., Violeta. Asia occidental, Región mediterránea, Macaronesia.

## Vitaceae

*Cissus alata* Jacq. = *C. rhombifolia* Vahl., Ciso, Parra de interior. Trinidad y Tobago.

*Cissus antarctica* Vent., Vid canguro. E Australia.

*Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, Antillas, Panamá, Colombia y Venezuela.

*Cyphostemma juttae* (Dinter & Gilg) Desc., Parra del desierto Namibia.

*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. = *Ampelopsis quinquefolia* Michx. = *Vitis quinquefolia* (L.) Lam., Viña virgen. NE EE UU a México.

*Parthenocissus tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch., Parra virgen. De China a Japón.

*Tetrastigma voinierianum* (Baltet) Gagnep., SE Asia.

*Vites herlandieri x Vitis rupestris* F. Richter 110R, Origen hortícola.

*Vitis vinifera* L., Vid común. Región mediterránea.

*Vitis vinifera* L., 'Airén'. Vid común. Origen hortícola.

*Vitis vinifera* L., 'Alicante'. Vid común. Origen hortícola.

*Vitis vinifera* L., 'Beba'. Vid común. Origen hortícola.

*Vitis vinifera* L., 'Ciutí'. Origen hortícola.

*Vitis vinifera* L., 'Cojonata'. Origen hortícola.

- Vitis vinifera* L., ‘Doradilla’. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Jaén blanco’. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Jaén tinto’. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Mollar negro’. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Moscatel fino’. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Pedro Ximenez’. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Perruna blanca’. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Perruna negra’. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Perruno’. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Piñuela’. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Plateado’. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Rome blanco’. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Rome tinto’. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Santa Paula’. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Uva del rey’. Vid común. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Vijiriega’. Vid común. Origen hortícola.

### *Xanthorrhoeaceae*

- Aloe aculeata* Pole-Evans., Sudáfrica.
- Aloe acutissima* H. Perrier, Sudáfrica.
- Aloe arborescens* Mill., Aloe. De N Sudáfrica a Malauí.
- Aloe brevifolia* Mill., Sudáfrica.
- Aloe ciliaris* Haw., Sudáfrica.
- Aloe clarkei* L.E. Newton, Etiopía.



*Aloe comosa* Marloth & A.Berger, Sudáfrica.

*Aloe conífera* H.Perrier, *Xanthorrhoeaceae*. Madagascar.

*Aloe descoingsii* Reynolds, SO Madagascar.

*Aloe dichotoma* Masson, Sudáfrica.

*Aloe divaricata* A. Berger, Madagascar.

*Aloe ellenbeckii* A. Berger, Etiopía, Somalia y Kenia.

*Aloe erythrophylla* Bosser, Madagascar.

*Aloe falcata* Baker, Sudáfrica.

*Aloe ferox* Mill., Sudáfrica.

*Aloe glauca* Mill., Sudáfrica.

*Aloe harlana* Reynolds, E Etiopía.

*Aloe ibitiensis* H.Perrier, Madagascar.

*Aloe jacksonii* Reynolds, Etiopía, Somalia.

*Aloe jucunda* Reynolds, Somalia.

*Aloe juvenna* Brandham & S.Carter, Sudáfrica.

*Aloe karasbergensis* Pillans, Sudáfrica, Namibia.

*Aloe kedongensis* Reynolds, Kenia.

*Aloe maculata* All. = *A. saponaria* (Aiton) Haw., Sudáfrica.

*Aloe microstigma* Salm-Dyck, Sudafrica.

*Aloe morijensis* S.Carter & Brandham, Kenia.

*Aloe perfoliata* L. = *A. mitriformis* Mill., S África.

*Aloe plicatilis* (L.) Mill., Aloe abanico. Sudáfrica.

*Aloe praetermissa* T.A.McCoy & Lavranos, Omán.

*Aloe ramossisima* Pillans, S África.

*Aloe rauhii* Reynolds, Madagascar.

*Aloe rivierei* Lavranos & L.E.Newton, Yemen, Arabia Saudí.

*Aloe striata* Haw., Suidáfrica.

*Aloe tomentosa* Deflers, N Yemen.

*Aloe vaombe* Decorse & Poiss., Madagascar.

*Aloe variegata* L., Sudáfrica, Namibia.

*Aloe vera* (L.) Burm. f. = *A. barbadensis* Mill., SO Arabia.

*Asphodelus fistulosus* L., Región mediterránea.

*Asphodelus ramosus* L., Región mediterránea.

*Bulbine frutescens* (L.) Willd., E Provincia del Cabo (Sudáfrica).

*Dianella revoluta* R.Br., Australia. Rocalla (Australia)

*Gasteria acinacifolia* (J.Jacq.) Haw., Sudáfrica.

*Gasteria carinata* (Mill.) Duvall, S África.

*Gasteria carinata* var. *verrucosa* (Mill.) van Jaarsv. = *Aloe repens* Schult. & Schult.f., S África.

*Gasteria obliqua* (Aiton) Duval = *G. liliputana* (Poelln.) Van Jaarsv., S África.

*Gasteria* sp. Duval, Sudáfrica.

*Haworthia angustifolia* Haw., S África.

*Haworthia batesiana* Uitew., S África.

*Haworthia chloracantha* Haw., S África.

*Haworthia coarctata* Haw., = *H. resendeana* Poelln. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

*Haworthia cymbiformis* (Haw.) Duval, S África.

*Haworthia fasciata* (Willd.) Haw., S África.

*Haworthia limifolia* Marloth, S África.

*Haworthia mucronata* Haw., S África.

*Haworthia pumila* (L.) Duval = *H. margaritifera* (L.) Haw., S África.

*Haworthia reinwardtii* (Salm.-Dyck) Haw., S África.

*Haworthia reticulata* (Haw.) Haw., S África.

*Hemerocallis* sp., L. Hemerocallis. Asia

*Kniphofia* sp Moench, África.

*Aloe praetermissa* T.A.McCoy & Lavranos,  
*Xanthorrhoeaceae*. Omán.

*Aloe conífera* H.Perrier, *Xanthorrhoeaceae*. Madagascar.

*Aloe karasbergensis* Pillans, *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica,  
Namibia.

*Aloe tomentosa* Deflers, *Xanthorrhoeaceae*. N Yemen.

*Aloe harlana* Reynolds, *Xanthorrhoeaceae*. E Etiopía.

*Aloe vaombe* Decorse & Poiss, *Xanthorrhoeaceae*. Madagascar.

*Haworthia coarctata* Haw., *Xanthorrhoeaceae*. Provincia del Cabo  
(Sudáfrica).

*Gasteria* sp. Duval, *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.

*Kniphofia* sp Moench, *Xanthorrhoeaceae*. África.

*Dianella revoluta* R.Br., *Xanthorrhoeaceae*. Australia. Rocalla  
(Australia)

### Zamiaceae

*Dioon califanoi* De Luca & Sabato, Oaxaca (México).

*Dioon edule* Lindl., México.

*Dioon mejiae* Staudl. & L. O. Willians, Honduras.

*Dioon rzedowskii* De Luca, A. Moretti, Sabato & Vázquez-Torres,  
Oaxaca (México).

*Dioon spinulosum* Dyer, México.

*Encephalartos laurentianus* De Wild., Encefalarto. Sudáfrica.

*Encephalartos sp.* Lehm., África.

*Encephalartos villosus* Lem., Cica espina, Encefalarto. S África.

*Macrozamia communis* L. A. S. Johnson, E Nueva Gales del Sur  
(Australia).

*Macrozamia johnsonii* D.L. Jones & K. D. Hill, Nueva Gales del  
Sur (Australia).

*Macrozamia moorei* F. Muell., Queensland (Australia).

*Zamia floridana* A.DC, SE EE UU.

*Zamia furfuracea* L. f. ex Aiton, Veracruz (México).

### Zingiberaceae

*Alpinia caerulea* (R.Br.) Benth., Origen hortícola.

*Alpinia malaccensis* (Burm. f.) Roscoe, Indonesia, Malasia.

*Alpinia nutans* (L.) Roscoe, SE Asia.

*Alpinia zerumbet* (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. = *A. speciosa*  
(Wendl.) Schum., Asia Tropical y subtropical.

*Alpinia zerumbet* (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. variegata', Origen  
hortícola.

*Hedychium coronarium* J. Koenig, Asia Tropical.

*Hedychium flavescens* Carey ex Roscoe, China, India, Nepal.

*Hedychium gardnerianum* Sheppard ex Ker Gawl., Jengibre blanco. Himalaya.

*Hedychium greenii* W.W.Sm., Jengibre rojo. Bután.

*Hedychium horsfieldii* R.Br. ex Wall., Isla de Java (Indonesia).