

CATÁLOGO DE ESPECIES ORDENADO POR FAMILIAS (julio 2026)

Acanthaceae

Acalypha wilkesiana Müll. Arg. = *A. tricolor* Seem., Acalifa. Islas del Pacífico.

Acanthus mollis L., Acanto. C, E Región mediterránea.

Barleria obtusa Ness, S África.

Brillantaisia owariensis P. Beauv., *Acanthaceae*. África.

Dicliptera suberecta (André) Bremek. = *Jacobinia suberecta* André, Uruguay.

Eranthemum pulchellum Andrews = *E. nervosum* (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult., India.

Justicia adhatoda L. = *Adhatoda vasica* Ness, India, Sri Lanka.

Justicia aurea Schltdl., México a Panamá.

Justicia brandegeana Wassh. & L. B. Sm = *Beloperone guttata* Brandege. Cola de camarón. México.

Justicia carnea Lindl., Sudamérica.

Megaskepasma erythrochlamys Lindau, Venezuela.

Odontonema tubaeforme (Bertol.) Kuntze = *O. strictum* (Ness) Kuntze. C América.

Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin =
Pseuderanthemum atropurpureum (W.Bull) Radlk., Malasia, India, Sri Lanka.

Ruellia elegans Poir. = *R. rosea* (Ness) Hemsl., México.

Ruellia simplex C.Wright = *R. tweediana* Griseb., Petunia mexicana. México.

Sanchezia pavibracteata Sprangue & Hutch., Sanchezia. América tropical.

Strobilanthes anisophylla (Wall. Ex Hook.) T. Anderson =
Strobilanthes persicifolia (Lindl.) J.R.I. Wood, Asia.

Thunbergia erecta (Benth) T. Anderson = *Meyenia erecta* Benth,
África Tropical.

Thunbergia fragrans Roxb., *Thunbergia fragrans*. India, SE Asia y
China.

Thunbergia grandiflora (Roxb. & Rottler) Roxb., *Thunbergia*. N
India.

Adiantaceae

Adiantum capillus-veneris L. Subcosmopolita.

Adiantum raddianum C. Presl = S América, México.

Agavaceae

Hesperaloe parviflora (Torr.) J.M. Coult., Texas (EE. UU.).

Aizoaceae

Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus, Sudáfrica.

***Delosperma* sp.** N.E.Br., S, E África.

Drosanthemum hispidum (L.) Schwantes, Namibia, S África.

Glottiphyllum depressum (Haw.) N.E., Br., Sudáfrica.

Glottiphyllum difforme (L.), N.E., Br., Sudáfrica.

Lampranthus spectabilis (Haw.) N. E. Br., ‘Alba’, Uña de gato.
Origen hortícola.

Mesembryanthemum crystallinum L., Escarcha. África, Asia
occidental, Europa.

Ruschia crassa (L. Bolus) Schwantes = *Messembrianthemum crassum* L. Bolus, Flor de hielo. Sudáfrica.

Smicrostigma viride (Haw.) N. E. Br., S África.

Alliaceae

Allium ampeloprasum L., Euroasia, N África.

Allium neapolitanum Cirillo, Región mediterránea, Portugal.

Allium rouyi Gaut., Sierra bermeja de Estepona (Málaga). España.

Tulbaghia violacea Harv., S África.

Alstroemeriaceae

Alstroemeria pelegrina L., Azuzena de Quito. Chile.

Altingiaceae

Liquidambar styraciflua L., De Conecticut a C América.

Amaranthaceae

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze, Alternantera. Brasil

Atriplex halimus L., Salado. Región mediterránea, S África.

Iresine herbstii Hook., S América.

Amaryllidaceae

Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. ‘Peter Pan’, Agapanto, Lirio africano. Origen hortícola.

Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. = *A. umbellatus* L’Hér., S África.

Clivia miniata (Lindl.) Bosse, Clivia. S África.

Clivia nobilis Lindl. = *Imantophyllum aitonii* Hook. f., Clivia. S África.

Crinum asiaticum var. ***pedunculatum*** (R.Br.) Fosberg & Sachet = *Crinum pedunculatum* R. Br., Australia.

Crinum x amabile Donn ex Ker Gawl. = *Crinum x augustum* Roxb., Origen hortícola.

Crinum x powellii Baker, Origen hortícola.

Cyrtanthus brachyscyphus Bakeri, Sudáfrica.

Haemanthus albiflos Jacq., Brocha de pintor. Sudáfrica.

Haemanthus sp. L., Sudáfrica.

Hippeastrum puniceum (Lam.) Voss = *Amaryllis belladonna* L., Amarilis. Sudáfrica.

Hippeastrum vittatum (L'Her.) Herb., Argentina, Brasil.

Hymenocallis sp. Salisb., América tropical y subtropical.

Ismene narcissiflora (Jacq.) M.Roem. = *Hymenocallis narcissiflora* (Jacq.) J.F.Macbr., C, S Perú.

Pancratium maritimum L., Azucena de mar. Región mediterránea, macaronesica, atlántica.

Rauhia multiflora (Kunth) Ravenna = *R. peruviana* Traub, Perú.

Anacardiaceae

Mangifera indica L. 'Irwin', Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. 'Keitt', Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. 'Kent', Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. ‘Osteen’, Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. ‘Tony Atkins’, Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. var. ***maya***, MangoMaya. Origen hortícola.

Mangifera indica L. var. ***palmer***, Mango Palmer. Origen hortícola.

Mangifera indica L. var. ***rosa***, Mango Rosa. Origen hortícola.

Mangifera indica L., Mango. De N India a La Unión de Myanmar.

Pistacia atlantica Desf., Almácigo. Islas Canarias (España), S, E región mediterránea, Pakistán, Afganistán.

Pistacia lentiscus L., Lentisco. Región mediterránea.

Pistacia terebinthus L., Cornicabra. Región mediterránea.

Pistacia vera L., Pistacho. Asia occidental, Asia menor.

Pleiogynium timoriense (DC.) Leenh., Ciruela Burdekin. Malasia, Australia y las islas del Pacífico.

Rhus coriaria L., Zumaque. S Europa.

Rhus punjabensis J. L. Stewart ex Brandis, E Asia, Himalaya.

Rhus typhina L. f. ***dissecta*** Rehder, Origen hortícola.

Schinus molle L., Falso pimentero. C de Suramérica.

Searsia lancea (L.f.) F.A.Barkley, *Anacardiaceae*. Zumaque africano. S África.

Spondias mombin L. = *S. lutea* L., Jobo, Jobo amarillo. América tropical.

Annonaceae

Annona cherimola Mill., Chirimoyo. Andes peruanos y Ecuador.

Apiaceae

Astydamia latifolia Baill., Lechuga de mar, servilleta. Islas Canarias (España), NO África.

Bupleurum fruticosum L., Región mediterránea.

Bupleurum gibraltarium Lam., Península Ibérica, N África.

Bupleurum handiense (Bolle) G. Kunkel, Islas Canarias orientales (España).

Crithmum maritimum L., Región mediterránea, atlántica, macaronésica.

Daucus carota L., Europa, Asia, N África, Macaronesia.

Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García-Martín & Silvestre, S, E Península Ibérica.

Elaeoselinum foetidum (L.) Boiss., SO Península ibérica, NO África.

Eryngium maritimum L., Cardo marino. Región mediterránea.

Foeniculum vulgare Mill. = *Foeniculum vulgare* subsp. *piperitum* (C.Presl.) Bég., Hinojo., Región mediterránea.

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. = *O. daucoides* L., Región mediterránea, Cáucaso, Azerbaiyán, N Irán, N Iraq.

Peucedanum officinale L. subsp. *brachyradium* García Martín et Silvestre, Sierra Bermeja (Ronda. Málaga).

Scandix pecten-veneris L., O, C, S Europa.

Torilis arvensis (Huds.) Link., C, S Europa, NO África, Macaronesia, SO Asia.

Apocynaceae

Acokanthera oblongifolia Benth. & Hook.f. = *A. spectabilis* (Sond.)
Hook. f., SO África.

Asclepias curassavica L., Flor de sangre. América tropical.

Asclepias physocarpa E. Mey., SE África.

Beaumontia grandiflora Wall., Trompeta blanca. E del Himalaya.

Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. = *C. grandiflora* (E. Mey.) A.
DC., Cerezo del Natal. S África.

Cascabela thevetia (L.) Lippold = *T. peruviana* (Pers.) K. Schum.,
Oleandro amarillo. América Tropical.

Ceropegia dichotoma Haw., Cordoncillo, Mataperros. Islas Canarias
(España).

Cryptostegia grandiflora Roxb. ex R.Br., SE Madagascar.

Dischidia vidalii Becc. = *D. pectenoides* H. Person, Islas Filipinas.

Fockea edulis (Thunb.) K. Schum., Namibia, Sudáfrica.

Gomphocarpus physocarpus E. Mey., SE África.

Hoya bella Hook., SE Asia, Australia.

Hoya kerrii Craib, Sian, Tailandia, Laos.

Huernia thureti Cels ex Hérincq. ‘Keiskamma’. Origen hortícola.

Huernia thureti Cels ex Hérincq. Sudáfrica. Namibia.

Huernia zebrina N.E.Br., Huernia. S. África, N Sudáfrica.

Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson, Jazmín chileno. Chile.

Mandevilla sanderii Woodson, Jazmín brasileño. Rio de Janeiro
(Brasil).

Nerium oleander L. ‘Nana’, Adelfa enana. Origen hortícola.

Nerium oleander L., Adelfa. De región mediterránea a Japón.

Orbea variegata (L.) Haw. = *Stapelia variegata* L., Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Pachypodium bispinosum A. DC., Sudáfrica.

Pachypodium geayi Castantin & Bois, SE Madagascar.

Pachypodium lamerei Drake, S Madagascar.

Periploca laevigata Aiton, Región mediterránea.

Plumeria alba L., Plumeria, Frangipani. De México a Antillas Mayores y Menores.

Plumeria obtusa L., La Española, Cuba, Península del Yucatán (México).

Plumeria rubra L. ‘Balang Tabtim’, Plumeria, Frangipani. Origen hortícola

Plumeria rubra L. ‘Chompoo Sin’, Plumeria, Frangipani. Origen hortícola

Plumeria rubra L. ‘Elsie’, Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. ‘Kled Tabtim’, Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. ‘Muang Jack’, Plumeria Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. ‘Muang Puang Roi’, Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. ‘Puang Yok’, Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. ‘Thong Tawee Choke’, Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. ‘Yellow’, Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Alba', Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L., Plumeria, Frangipani. De México a Panamá.

Stapelia variegata N.E. Br., var. ***retusa*** (Haw.) N.E. Br.,
Apocynaceae. S África.

Stapelianthus pilosus Lavranos & D.S. Hardy = *S. decaryi*. Choux, .
Madagascar.

Stephanotis floribunda Brongn. Schltr., Jazmín de Madagascar.
Madagascar.

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. = *Rhynchospermum*
jasminoides Lindl., Jazmín estrella. China.

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 'Mandianum'. Origen
hortícola.

Vinca difformis Pourr., Vincapervinca. O Región mediterránea.

Vinca major L., Región mediterránea, Europa, Asia menor.

Vinca minor L., Vincapervinca. Europa.

Aquifoliaceae

Ilex aquifolium L., O Asia, Europa.

Ilex aquifolium L. 'Alaska Cream'. Origen hortícola.

Araceae

***Aglaonema* sp.** Schott, SE Asia.

Alocasia cucullata (Lour.) G. Don., Oreja de elefante. China, India,
Sri Lanka y Birmania

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don, SE Asia.

Alocasia odora (G. Lodd.) Spach, Oreja de elefante. Asia Tropical.

Alocasia sp. (Schott) G.Don ‘Low Rider’, Origen hortícola.

Alocasia wentii Engl. & Krause ., Nueva Guinea.

Alocasia x caliodora Parentales: *A. odora* x *A. odora* ‘California’.
Origen hortícola.

Alocasia x portodora Parentales: *A. odora* x *A. ‘Portei’*. Origen hortícola.

Amorphophallus bulbifer (Roxb.) Blume, India.

Anthurium coriaceum G. Don, Brasil.

Arisarum simorrhinum Durieu, Europa.

Colocasia esculenta (L.) Schott, Taro. SE Asia.

Epipremnum aureum (Linden & André) G.S. Bunting = *Pothos aureus* Linden et André, Islas Salomón.

Homalomena rubescens (Roxb.) Kunth., SE Asia.

Monstera adansonii Schott ex Van Houtte, C,S América.

Monstera deliciosa Liebm., Costilla de Adán. De México a Panamá.

Philodendrom erubescens K. Koch & Augusti ‘Green Congo’,
Origen hortícola.

Philodendrom erubescens K. Koch & Augusti ‘Pink Princess’,
Origen hortícola.

Philodendrom erubescens K. Koch & Augusti ‘Red Congo’, Origen hortícola.

Philodendrom erubescens K. Koch & Augusti ‘Red Sun’, Origen hortícola.

Philodendron brandtianum K. Krause, S Colombia, N Brasil, Bolivia.

Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott = *P. scandens* K.Koch & Sello, Filodendro. C América, Caribe.

Philodendron panduliforme (Kunth) Kunth, Brasil.

Philodendron subhastatum K. Krause ‘Silver Swod’, Origen hortícola.

Philodendron warszewiczii K.Koch & C.D.Bouché ‘Aurea’, Origen hortícola.

Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott, India, Sri Lanka, La Unión de Myanmar.

Rhaphidophora tetrasperma Hook. f., S Tailandia, Malasia.

Spathiphyllum wallisii Regel, Colombia.

Syngonium podophyllum Schott = *S. gracile* (Miq.) Schott, Singonio. México, Brasil, Bolivia.

Syngonium podophyllum Schott, ‘Mojito’, Origen hortícola.

Thaumatophyllum bipinnatifidum (Schott) Sakur., Calazans & Mayo = *Philodendron bipinnatifidum* Schott ex Endl., S Brasil.

Thaumatophyllum xanadu (Croat, Mayo & J.Boos) Sakur., Calazans & Mayo, Brasil.

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng = *Calla aethiopica* L., Cala, Lirio de agua. Provincia del Cabo, Natal, Transvaal, Lesotho (Sudáfrica).

Zantedeschia aetiopica (L.) Spreng ‘Callaifornia’, Cala. Origen hortícola.

Araliaceae

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch., Japón.

Hedera algeriensis Hibberd., Hiedra de Argelia. N África.

Hedera canariensis Willd. ‘Gloire de marengo’, Origen hortícola.

Hedera helix L. ‘Glacier’, Origen hortícola.

Hedera helix L., Europa, O Asia, N África.

Heptapleurum actinophyllum (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett =
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms, Árbol de los paraguas.
Australia, S Nueva Guinea.

Heptapleurum arboricola (Hayata) Merr. ‘Gold Capella’, Origen
hortícola.

Heptapleurum arboricola Hayata, Cheflera. Isla de Formosa
(Taiwan).

Plerandra elegantissima (H.J.Veitch ex Mast.) Lowry, G.M.Plunkett
& Frodin = *Schefflera elegantissima* (H.J.Veitch ex Mast.) Lowry &
Frodin, Falsa aralia, Planta araña. Nueva Caledonia, Polinesia.

Araucariaceae

Agathis microstachya J.F. Bailey & C.T. White, N Queensland
(Australia).

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, S Brasil, Argentina.

Araucaria bidwillii Hook, Araucaria. SE Queensland (Australia).

Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. = *A. excelsa* (Lamb.) R. Br.,
Pino de Nueva Caledonia. Nueva Caledonia.

Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco, Pino de pisos, Pino de
Norfolk. Isla de Norfolk (Australia).

Wollemia nobilis W.G. Jones, K.D. Hill & J.M. Allen, Nueva Gales
del Sur (Australia).

Areaceae

Acoelorrhaphe wrightii H. A. Wendl. ex Becc. = *Paurotis wrightii*
(Griseb. et H. A. Wendl.) Brittonx ex Brittonx, Tasiste, Guano
prieto. México, Belice, Bahamas y Cuba.

Acrocomia aculeata Lodd. ex Mart., Totaí, Macaúba. De México a Argentina.

Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & Drude = *Ptychosperma alexandrae* F. Muell., N Queensland (Australia).

Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude = *Ptychosperma cunninghamiana* H. Wendl., Palmera de Cunningham, Palmera rey Piccabeen. Nueva Gales del Sur, Queensland (Australia).

Arenga engleri Becc., Palmera de Formosa. Isla de Formosa e Islas Ryu-Kyu.

Bismarckia nobilis Hildebrandt & Y. H. Wendl., Palmera de Bismarck. Madagascar.

Brahea armata S. Watson = *Erythea armata* (S. Watson) S. Watson, Palmera azul mexicana. Baja California y Sonora (NO México).

Brahea brandegeei (Purpus) H. E. Moore = *Erythea brandegeei* Purpus, Palmera negra mexicana. NO México.

Brahea dulcis (Kunth) Mart., Palmera dulce. Desde México a Perú.

Butia capitata (Mart.) Becc., Brasil, Uruguay.

Butia yatay Becc. = *Cocos yatay* Mart., Yatay, Palma yatay. Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Caryota furfuracea Blume ex Mart. (ver *C. mitis*)

Caryota gigas Hahn ex Hodel (ver *C. obtusa*)

Caryota mitis Lour. = *C. furfuracea* Blume ex Mart., Palmera cola de pescado con varios troncos. SE Asia.

Caryota obtusa Griff. = *C. gigas* Hahn ex Hodel, Caryota gigante de Tailandia. Tailandia.

Caryota urens L., India, Isla de Sri Lanka, Unión de Myanmar, Península de Malaca

Chamaedorea castaricana Oerst., Pacaya De México a Panamá.

Chamaedorea cataractarum Mart. = *C. atrovirens* H. Wendl., México.

Chamaedorea elegans Mart., México, Guatemala, Belice.

Chamaedorea ernesti-augusti H. Wendl., México.

Chamaedorea metallica O. F. Cook ex H. E. Moore, *Arecaceae*. México.

Chamaedorea microspadix Burret, Veracruz, Chiapas (México).

Chamaedorea seifrizii Burret = *C. erumpens* H. E. Moore, México, Guatemala, Belice, Honduras.

Chamaedorea tepejilote Liebm., México

Chamaerops humilis L. var. *argentea* André = *C. humilis* var. *cerifera* Becc., Marruecos, Sahara.

Chamaerops humilis L., Región mediterránea occidental.

Chambeyronia macrocarpa Vieill. = *Kentiopsis macrocarpa* Brongn., Nueva Caledonia (Oceanía).

Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl. = *Dypsis lutescens* (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf., Palma de frutos de oro. Madagascar.

Coccothrinax crinita (Griseb. & H. Wendl. ex C.H. Wrigth) Becc., Palmera petate. Cuba.

Copernicia alba Morong, Caradá, caranday. Brasil, Bolivia, N Argentina, Paraguay.

Dictyosperma album (Bory) Scheff. = *Linoma alba* (Bory) O. F. Cook, *Arecaceae*. Palma de huracán. Islas Mascareñas.

Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J. Dransf. = *Neodypsis decaryi* Jum., Palmera triángulo. Madagascar.

Gaussia maya (O. F. Cook) H. J. Quero & Read = *Opsiandra maya* O. F. Cook, México, Belice, Guatemala.

Howea belmoreana (C. Moore & F. Muell.) Becc. = *Kentia belmoreana* C. Moore & F. Muell., *Kentia*, *Kencia*. Isla de Lord Howe (Australia).

Howea forsteriana (F. Muell.) Becc. = *Kentia forsterana* F. Muell., *Kentia*, *Kencia*. Isla de Lord Howe (Australia).

Hyophorbe lagenicaulis (L. H. Bailey) H. E. Moore = *Mascarena lagenicaulis* L. H. Bailey, Palmera botella. Islas Mascareñas.

Hyophorbe verschaffeltii (W. Bull ex J. Dix) H. Wendl. = *Mascarena verschaffeltii* (H. Wendl.) L. H. Bailey, Palmera fusiforme. Islas Mascareñas.

Hyphaene coriacea Gaertn., S África.

Jubaea chilensis (Molina) Baill. = *J. spectabilis* Kunth, Palmera de Chile, palma de miel. C Chile.

Livistona australis (R. Br.) Mart., Livistona de Australia. E Australia.

Livistona chinensis R. Br., Livistona de China, Palmera china de abanico. E China, Islas Ryu Kyu (Japón), Islas Bonin.

Livistona decora (W. Bull) Dowe = *L. decipiens* Becc., Queensland (Australia).

Livistona muelleri F. M. Bailey, Palmera abanico enana. NE Queensland (Australia).

Livistona nitida Rodd, C Queensland (Australia).

Livistona saribus (Lour) Merr. ex A. Chev. = *L. hoogendorpii* Teijsm. et Binn. ex Miq., SE Asia.

Nannorrhops ritchieana (Griff.) Aitch. = *Chamaerops ritchieana* Griff., Palmera mazari, Palmito de Pakistán. Pakistán, Afganistán, Irán, Península de Arabia.

Phoenix canariensis Chabaud, Palmera de Canarias. Islas Canarias (España).

Phoenix dactylifera L., Palmera datilera. N África, O Asia.

Phoenix reclinata Jacq., Palmera datilera del Senegal. África tropical y subtropical.

Phoenix roebelenii O' Brien, Palmera pigmea, Palmera datilera enana. Laos, Vietnam y SO China.

Phoenix rupicola T. Anderson, Datilera de las rocas. Himalaya (India), Butan.

Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Datilera silvestre. India y Pakistán.

Phoenix theophrasti Greuter, Palmera de Creta. Creta y Turquía.

Pritchardia hillebrandii Becc., Islas Hawai (EE. UU.).

Pseudophoenix sargentii H. A. Wendl. ex Sargent., Palmera bucanera. México, Belice, Florida, Bahamas, Cuba, La Española, Dominica.

Ptychosperma elegans (R. Br.) Blume = *Seaforthia elegans* R. Br., Palmera solitaria. E Queensland (Australia).

Ravenea xerophilla Jum., S Madagascar.

Rhapidophyllum hystrix (Fraser ex Thouin) H.Wendl. & Drude = *Chamaerops hystrix* (Fraser ex Thouin) Pursh, Palmera con agujas. SE EE. UU.

Rhapis excelsa (Thunb.) A.Henry, Palmerita China. China.

Rhapis humilis Blume, China.

Rhapis multifida Burret, Palmera dedo. S China.

Roystonea regia O. F. Cook = *R. ventricosa* C. H. Wright = *R. jenmanii* (C.H. Wright) Burret, Palmera real cubana. Cuba.

Sabal bermudeana L.H. Bailey, Bermuda palmeto. Islas Bermudas (Reino Unido).

Sabal causiarum (O. F. Cook) Becc. = *S. haitensis* Becc. ex Martelli, Palma de sombrero. S Isla La Española, Puerto Rico.

Sabal domingensis Becc., Palma cana. Isla la Hispañiola (Haiti y Republica dominicana).

Sabal mauritiiformis Griseb. & H. Wendl. = *S. allenii* L. H. Bailey, C México, Belice, N Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y Trinidad.

Sabal mexicana Mart. = *S. texana* (O.F.Cook) Becc., Palma de sombrero, Palma llanera. México, S Tejas (EE. UU.).

Sabal minor (Jacq.) Pers., Palmito enano, Palmito de los pantanos. SE EE. UU.

Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult.f., Palmito de Florida. SE EE. UU., Cuba.

Saribus rotundifolius (Lam.) Blume = *L. rotundifolia* (Lam.) Mart., Islas Filipinas, Islas Célebes, Islas Molucas.

Serenoa repens (W. Bartram) Small = *S. serrulata* (Michx.) Hook.f. ex B.D.Jacks., Palmito aserrado. SE EE. UU.

Syagrus amara (Jacq.) Mart., Pequeñas Antillas.

Syagrus coronata Becc., Licuri. Brasil.

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman = *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc., Palmera reina. De Brasil a Argentina.

Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman = *Arikuryroba schizophylla* (Mart.) L. H. Bailey, Aricuriroba. Brasil.

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. = *Chamaerops fortunei* Hook., Palmito elevado, Palmito elevado chino, Palmera china de abanico. N La Unión de Myanmar, C, E China.

Trachycarpus martianus (Wall. ex Mart.) H. Wendl. = *T. khasyanus* (Griff.) H.Wendl., Palmito elevado de Martius. E Himalaya, N La Unión de Myanmar.

Trithrinax acanthocoma Drude, Carandaí. S Brasil y Paraguay.

Trithrinax campestris (Burmeister) Drude & Griseb., Saro, Caranday. Argentina, O Uruguay.

Washingtonia filifera (Linden ex André) H. Wendl. ex de Bary,
Palmera de abanico californiana, Palmera con enaguas. California,
Arizona (SO EE. UU.), Baja California (México).

Washingtonia robusta H. Wendl., Palmera de abanico mejicana.
Baja California y Sonora (NO México).

Wodyetia bifurcata A. K. Irvine, Palmera de cola de zorro. NE
Queensland (Australia)

Aristolochiaceae

Aristolochia baetica L., *Aristolochia*. S Península Ibérica, N África.

Aristolochia gigantea Mart., Brasil.

Aristolochia grandiflora Sw., *Aristolochiaceae*. Flor del pelícano.
Caribe.

Aristolochia littoralis Parodi, Brasil.

Asphodelaceae

Aloe aculeata Pole-Evans., Sudáfrica.

Aloe acutissima H. Perrier, Sudáfrica.

Aloe arborescens Mill., Áloe. De N Sudáfrica a Malaui.

Aloe ciliaris Haw., Sudáfrica.

Aloe comosa Marloth & A. Berger, Sudáfrica.

Aloe divaricata A. Berger, Madagascar.

Aloe erythrophylla Bosser, Madagascar.

Aloe ferox Mill., Sudáfrica.

Aloe glauca Mill., Sudáfrica.

Aloe harlana Reynolds, E Etiopía.



Aloe ibitiensis H.Perrier, Madagascar.

Aloe jacksonii Reynolds, Etiopía, Somalia.

Aloe jucunda Reynolds, Somalia.

Aloe juvenna Brandham & S.Carter, Sudáfrica.

Aloe karasbergensis Pillans, Sudáfrica, Namibia.

Aloe kedongensis Reynolds, Kenia.

Aloe maculata All. = *A. saponaria* (Aiton) Haw., Sudáfrica.

Aloe microstigma Salm-Dyck, Sudáfrica.

Aloe morijensis S.Carter & Brandham, Kenia.

Aloe perfoliata L. = *A. mitriformis* Mill., S África.

Aloe plicatilis (L.) Mill., Aloe abanico. Sudáfrica.

Aloe praetermissa T.A.McCoy & Lavranos, Omán.

Aloe ramossisima Pillans, S África.

Aloe rauhii Reynolds, Madagascar.

Aloe rivierei Lavranos & L.E.Newton, Yemen, Arabia Saudí.

Aloe striata Haw., Suidáfrica.

Aloe thraskii Baker, Sudáfrica

Aloe tomentosa Deflers, N Yemen.

Aloe vera (L.) Burm. f. = *A. barbadensis* Mill., SO Arabia.

Aloidendron dichotomum (Maisson) Klopper & Gideon F. Sm. =
Aloe dichotoma Masson, Sudáfrica.

Asphodelus fistulosus L., Región mediterránea.

Asphodelus ramosus L., Región mediterránea.

Bulbine frutescens Willd., E Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Dianella revoluta R.Br., Australia. Rocalla (Australia).

Dianella tasmanica C. Pynaert. 'Variegata', Tasmania (Australia).

Gasteria acinacifolia (J.Jacq.) Haw., Sudáfrica.

Gasteria carinata (Mill.) Duvall, S África.

Gasteria carinata var. ***verrucosa*** (Mill.) van Jaarsv. = *Aloe repens* Schult. & Schult.f., S África.

Gasteria obliqua (Aiton) Duval = *G. liliputana* (Poelln.) Van Jaarsv., S África.

Gasteria sp. Duval, Sudáfrica.

Haworthia angustifolia Haw., S África.

Haworthia batesiana Uitew., S África.

Haworthia chloracantha Haw., S África.

Haworthia cymbiformis (Haw.) Duval, S África.

Haworthia fasciata (Willd.) Haw., S África.

Haworthia mucronata Haw., S África.

Haworthia reticulata (Haw.) Haw., S África.

Haworthiopsis coarctata (Haw.) G.D.Rowley = *H. resendeana* Poelln., Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Haworthiopsis limifolia (Marloth) G.D.Rowley., S África.

Haworthiopsis reinwardtii (Salm-Dyck) G.D. Rowley., S África.

Hemerocallis sp., L. Hemerocallis. Asia

Kniphofia sp. Moench, África.

Kniphofia uvaria (L.) Oken, África.

Tulista pumila (L.) G.D.Rowley = *Haworthia margaritifera* (L.)
Haw., S África.

Asparagaceae

Agave americana L. 'Stricta', Origen hortícola.

Agave americana L. var. *marginata* Trel., México.

Agave americana L. var. *mediopicta* Trel. 'Alba', México.

Agave americana L. var. *mediopicta* Trel., México.

Agave americana L., México.

Agave attenuata Salm-Dyck, C México.

Agave bracteosa S. Watson ex Engelm., NE México.

Agave desmettiana Jacobi 'Marginata', Origen hortícola.

Agave desmettiana Jacobi, Sinaloa (México).

Agave fourcroydes Lem., Yucataán (México).

Agave ghiesbreghtii Lem. ex Jacobi = *A. purpusorum* A. Berger, SE
México, Guatemala.

Agave mitis Mart. var. *albidior* (Salm-Dyck) B.Ullrich, Hidalgo
(México).

Agave pumila De Smet ex baker, México.

Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck var. *ferox* (K.Koch) Gentry,
México.

Agave stricta Salm-Dyck 'Nana', Origen hortícola.

Agave stricta Salm-Dyck, México.

Agave victoria-reginae T. Moore, México.

Agave weberi J.F.Cels ex J.Poiss., México.

Asparagus albus L., O, C Región mediterránea.

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop ‘Sprengeri’, Esparraguera basta. Origen hortícola.

Asparagus falcatus L., De S, E África a India.

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop = *A. plumosus* Baker, Esparraguera fina. S África.

Beaucarnea recurvata (K.Koch & Fintelm.) Lem. = *Nolina recurvata* (Lem.) Hesml., México.

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques var. ***variegatum***, Origen hortícola.

Cordyline australis (G. Forst) Endl. ‘Pink Pasion’, Origen hortícola.

Cordyline australis (G. Forst.) Endl., Nueva Zelanda.

Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. = *C. terminalis* (L.) Kunth, Drácena, caña de la India. De E Asia tropical a Polinesia.

Cryptanthus bivittatus (Hook.) Regel., Brasil.

Dasyilirion longissimum Lem, Junquillo, varacuate. México.

Dasyilirion serratifolium (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Zucc., México.

Dracaena angolensis (Welw.) Byng & Christenh. = *Sansevieria cylindrica* Bojer ex Hook., Angola.

Dracaena cinnabari Balf.f., Arch. Socotra (Yemen).

Dracaena draco (L.) L., Drago de Canarias. Tenerife (Islas Canarias. España), Madeira (Portugal).

Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. ‘Compacta’, Origen hortícola.

Dracaena hyacinthoides (L.) Mabb. = *Sansevieria hyacinthoides* (L.) Druce, S África.

Dracaena raffillii (N.E.Br.) Byng & Christenh. = *Sansevieria raffillii* N.E.Br., África tropical.

Dracaena reflexa* var. *angustifolia Baker = *D. marginata* Hort.,
Madagascar.

Dracaena tamaranae Marrero Rodr., R.S. Almeida & Gonzales.-
Martin, Islas Canarias (España).

Dracaena trifasciata (Prain) Mabb. = *Sansevieria trifasciata* Prain
var. *laurentii* (de Willd.) N.E.Br., África.

Furcraea foetida (L.) Haw., Caribe, C América.

Furcraea selloa K. Koch, Falso ágave. México, Guatemala,
Colombia.

Hesperaloe parviflora (Torr.) J.M. Coult., Texas (EE. UU.).

Hesperoyucca whipplei (Torr.) Trel. = *Yucca whipplei* Torr., S
California, baja California.

Liriope graminifolia (L.) Baker, China, Japón.

Liriope muscari (Decne.) L. H. Bailey = *L. graminifolia* (L.) Baker
var. *densiflora* Maxin. ex Baker, China.

Liriope muscari (Decne.) L. H. Bailey var. *variegata* (Bailey) H.
Hara, China, Japón.

Muscari parviflorum Desf., Nazareno de otoño. SE de España e Islas
Baleares.

Nolina longifolia (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Hemsl. = *Dasyllirion*
longifolium (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Zucc., Norteamérica.

Ophiopogon jaburan (Siebold) Lodd. ‘Vitatus’, Origen hortícola.

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl., Hierba de las turquesas.
China, Corea, Japón.

Ophiopogon planiscapus Nakai ‘Niger’, Origen hortícola.

Ophiopogon planiscapus Nakai, Japón.

Ornithogalum narbonense L., S Europa.

Ruscus aculeatus L., Rusco, Brusco. Región mediterránea, O Europa.

Ruscus hypoglossum L., Aureolas. De Italia y República Checa a Turquía.

Sansevieria cylindrica Bojer ex Hook. (ver *Dracaena angolensis*)

Scilla peruviana L., Jacinto del Perú. Región mediterránea.

Veltheimia capensis (L.) Redouté, E Sudáfrica.

Yucca aloifolia L. ‘Variegata’, Origen hortícola.

Yucca aloifolia L., Yuca, Yuca pinchona, Bayoneta española. México.

Yucca baccata Torr., Banana yuca. SO EE. UU.

Yucca brevifolia Engelm., Árbol de Joshua. De California a Utah (EE. UU.).

Yucca carnerosana (Trel.) Mckelvey, Daga española. NO México, O Texas.

Yucca faxoniana Sarg., Bayoneta española. O Texas, N México.

Yucca filifera Chabaud, Palma chica, Izote. Centroamérica, México.

Yucca gigantea Lem. = *Y. guatemalensis* Bak., Yuca fina, Pata de elefante. México, Guatemala.

Yucca gloriosa L var. *variegata* Belg. Hort, EE. UU.

Yucca gloriosa L, Daga española. SE EE. UU.

Yucca querataroensis Piña Luján, México.

Yucca rigida (Engelm.) Trel., Yuca azul. México.

Yucca rostrata (Engelm.) Trel. = *Y. linearis* (Trel.) D.J. Ferguson, Tejas, N México.

Yucca thompsoniana Trel., SO Texas.

Yucca treculeana Carrière, Daga española, Palma pita. S,C Texas, O México.

Aspleniaceae

Asplenium antiquum Maquino ‘Chrissie’, Origen hortícola.

Asplenium bulbiferum G. Forst., Nueva Zelanda, Australia.

Asplenium nidus L. ‘Leslie’, Origen hortícola.

Asplenium nidus L. ‘Osaka’, Origen hortícola

Asplenium nidus L., Helecho nido de ave. India, Australia, Japón.

Asteraceae

Ajania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries, C, E Asia.

Andryala integrifolia L., SO Europa, Región mediterránea, macaronesia.

Anthemis arvensis L., Manzanilla bastarda. Europa.

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe = *A. pinnatifidum* (L.f.)
Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) Humphries, Madeira (Portugal).

Artemisia absinthium L., Ajenjo. Europa, Asia, N África.

Artemisia argentea L'Hér, Madeira.

Atractylis cancellata L., S Europa, N África, Macaronesia

Bartlettina sordida (Less.) R.M. King & H. Rob. = *Eupatorium sordidum* Less., Eupatorio. México.

Berkheya purpurea (DC.) Benth. & Hook.f. ex Mast., S África.

Calendula arvensis M. Bieb., Región mediterránea.

Centaurea carratracensis Lange, Ronda (Sierra de Aguas y Sierra de la Robla, Málaga).

Centaurea melitensis L., Europa, África.

Centaurea prolongoi Pau, Sierras béticas andaluzas.

Centaurea pullata L., España, Portugal.

Centaurea ragusina L., *Centaurea dalmata*. Costa de Dalmacia (S Croacia).

Centaurea solstitialis L., Abrepuño amarillo. Región mediterránea.

Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet, EE. UU.

Crepis vesicaria L., O, S, Europa.

Dittrichia viscosa (L.) Greuter = *Inula viscosa* (L.) Aiton, Región mediterránea.

Dymondia margaretae Compton, Dimondia, Alfombra del Cabo. Sudáfrica.

Eriocephalus africanus L., S África.

Euryops evansii Schltr. *Compositae*. S África.

Farfugium japonicum (L.) Kitam. 'Aureomaculatum' = *F. tussilagineum* (Burm. f.) Kitam. 'Aureomaculatum', Origen hortícola.

Farfugium japonicum (L.) Kitam. = *Ligularia tussilaginea* (Burm. f.) Makino, Boina, Ligularia. Japón, China.

Felicia amelloides (L.) Voss = *Agathea caelestis* (L.) DC., Margarita azul. S África.

Filago pyramidata L., SO Europa, NO África, S Asia, Macaronesia.

Galactites tomentosa Moench, Región mediterránea.

Gazania jurineifolia DC. = *G. nivea* Less., S África.

Gazania rigens (L.) Gaertn. = *G. splendens* Hend. & A.A.Hend., S África.

Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach = *Chrysanthemum coronarium* L., Región mediterránea, C,S Portugal.

Hedypnos rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt = *H. cretica* (L.) Dum.Cours., S Europa, N, O África, SE Asia.

Helichrysum italicum (Roth) G. Don, Región mediterránea.

Jacobaea maritima (L.) Pels & Meijden = *Senecio cineraria* DC., Región mediterránea.

Kleinia anteuphorbium (L.) Haw., África del Norte, Marruecos.

Kleinia neriifolia Haw. = *Senecio kleinia* (L.) Less., Verode. Islas Canarias (España).

Leontodon longirostris (French & P.D. Sell.) Talavera, S Europa, NO África, Macaronesia.

Leontodon tinginatus (Boiss. & Reuter) Ball, S España, NO Marruecos.

Leucophyta brownii Cass. = *Calocephalus brownii* (Cass.) F. Muell., Australia.

Matricaria chamomilla L., Europa.

Montanoa bipinnatifida (Kunth) K. Koch, Árbol margaritero, Margaritero arbóreo. México.

Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. = *Dimorphotheca ecklonis* DC., Margarita del Cabo. S África.

Pallenis spinosa (L.) Cass., S Europa.

Phagnalon rupestre (L.) DC., Región mediterránea.

Phagnalon saxatile (L.) Cass., S Europa, N África, Macaronesia.

Phonus arborescens (L.) G.López = *Carthamus arborescens* L., Cardo cuco. S España, NO África.

Reichardia intermedia (Sch. Bip) Samp., S Europa, N África, SO Asia.

Reichardia tingitana (L.) Roth, Región mediterránea.

Rhodanthemum hosmariense (Ball) B.H.Wilcox, K.Bremer & Humphries, 'Casablanca', Origen hortícola.

Roldana petasitis (Sims.) H. Rob. & Brettel = *Senecio petasitis* (Sims) DC., Senecio. México.

Rudbeckia hirta L. EE. UU.

Santolina chamaecyparissus L. = *S. incana* Lam., Santolina, Abrótano hembra. Región mediterránea.

Scorzonera angustifolia Asso, Península Ibérica, NO Marruecos.

Senecio articulatus (L. f.) Sch.Bip. = *Kleinia articulata* (L. f.) Haw., S África.

Senecio barbertonicus Klatt, S África.

Senecio citrifolius G. D. Rowley, S África.

Senecio crassissimus Humbert, Madagascar.

Senecio jacobsenii G. D. Rowley, Kenia, Tanzania.

Senecio macroglossus DC., África Austral.

Senecio scaposus DC. = *S. calamifolius* Hook., S África.

Sonchus oleraceus (L.) L., Cerrojo Euroasia, Región mediterránea.

Sonchus tenerrimus L., Región mediterránea.

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski = *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc., América tropical.

Tagetes erecta L. = *T. patula* L., México.

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray, De México a N de S América.

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, Euroasia.

Volutaria muricata (L.) Maire = *Cyanopsis muricata* (L.) Dostál, S España, NO África.

Balsaminaceae

Impatiens hawkeri W. Bull, Impatiens de Nueva Guinea. Nueva Guinea.

Begoniaceae

Begonia bowerae Ziesenh., Begonia. México.

Begonia cucullata Willd. = *B. semperflorens* Link & Otto, Begonia de flor. Brasil, Paraguay, N Argentina.

Begonia rex Putz. ‘hybrida’, Origen hortícola.

Begonia x hybrida Auct. ‘Dragon wing’, Origen hortícola.

Begonia x ricinifolia Dietr., *Begoniaceae*. Origen hortícola.

Berberidaceae

Berberis aquifolium Pursh = *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt., Uvas de Oregón. EE. UU.

Berberis thunbergii DC. ‘Atropurpurea’, Agracejo púrpura. Origen hortícola.

Berberis vulgaris L., Agracejo común. De Europa al O Asia.

Nandina domestica Thunb., Japón, C China.

Bignoniaceae

Bignonia capreolata L. = *Doxantha capreolata* (L.) Miers, Bignonia. S Ontario (Canadá), E EE. UU.

Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum., Trompeta china. China.

Campsis radicans (L.) Seem = *Bignonia radicans* L., Bignonia roja, Trompeta trepadora. C América, SE Iowa, Tejas (EE. UU.).

Campsis x tagliabuana (Vis.) Rehder, Trompeta trepadora. Origen hortícola.

Catalpa bignonioides Walter, Catalpa. SE EE. UU.

Chilopsis linearis (Cav.) Sweet, Sauce del desierto. California a Texas y México.

Clytostoma callistegioides (Cham.) Baill., Dama del monte. Argentina, S Brasil.

Delostoma integrifolium D. Don = *D. speciosum* (H. Karst. et Triana) K. Schum. ex B.D. Jacks., Perú.

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann = *Macfadyena unguis-cati* (L.) A. H. Gentry, e México a Argentina.

Jacaranda mimosifolia D. Don = *J. ovalifolia* R. Br., Jacaranda, Palo santo. NO Argentina.

Kigelia africana (Lam.) Benth. = *K. pinnata* (Jacq.) DC., Árbol de las salchichas. África.

Markhamia lutea (Benth.) K. Schum., Tulipero amarillo. África.

Pandorea jasminoides (Lindl.) K. Schum. = *Tecoma jasminoides* Lindl., Bignonia blanca. Australia.

Pandorea pandorana (Andrews) Steenis = *Bignonia australis* (R. Br.) Aiton, Arbusto de Pandora. Malaysia, Australia.

Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague, Bignonia rosa. S África.

Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers = *P. ignea* (Vell.) C. Presl, Brasil, Paraguay.

Spathodea campanulata P. Beauv., Tulipero del Gabón. C África.

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A. DC., Apamate, Roble negro. De México a Venezuela, Ecuador.

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, De Florida a México.

Tecomaria capensis (Thunb.) Spach, = *Tecoma capensis* (Thunb.) Lindl., Bignonia roja. S África.

Bixaceae

Bixa orellana L., Achiote. América subtropical y tropical.

Blechnaceae

Woodwardia prolifera Hook. & Arn., China, Japón y el Himalaya.

Boraginaceae

Anchusa azurea Mill., Región mediterránea.

Cynoglossum creticum Mill., S Europa.

Echium aculeatum Poir., Tenerife; Gomera, Hierro (Islas Canarias. España).

Echium callithyrsum Webb & Bolle, Taginaste azul. Gran Canaria (Islas Canarias. España).

Echium candicans L. f. = *E. fastuosum* Jacq., Plumero azul. Madeira (Portugal).

Echium plantagineum L., S, O Europa.

Echium wildpretii H. Pearson ex Hook. f., Tajinaste rojo. Región mediterránea, Islas Canarias (España), Madeira (Portugal).

Heliotropium arborescens L. = *H. peruvianum* L., Heliotropo, Vainilla de jardín. Perú.

Heliotropium europaeum L., S, C Europa, O Asia, N África.

Brassicaceae

Biscutella auriculata L., Península Ibérica, Marruecos, Argelia.

Biscutella baetica Boiss & Reut., SO España, NO África

Capsella bursa-pastori (L.) Medik., Europa.

Coronopus didymus (L.) Sm., Europa.

Crambe filiformis Jacq., S España, N África.

Diplotaxis eruroides (L.) DC., Región mediterránea, C Europa, W Asia.

Diplotaxis virgata (Cav.) DC., Península Ibérica.

Iberis sempervirens L., Región mediterránea.

Lobularia maritima (L.) Desv. = *Alyssum maritimum* (L.) Lam., S Europa.

Sinapis alba L. = *Brassica hirta* Moench, Europa, N África, O Asia.

Sisymbrium officinale (L.) Scop., Europa, N África, oriente próximo.

Bromeliaceae

Acanthostachys strobilacea (Link) Klotzsch & Otto, Brasil, N Argentina.

Aechmea blanchetiana (Baker) L.B.Sm. ‘Orange’, Origen hortícola.

Aechmea blanchetiana (Baker) L.B.Sm., Brasil.

Aechmea brazil Witt. ‘Brazil’, Origen hortícola.

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker, America tropical.

Aechmea caudata Lindm. = *A. caudata* f. *albiflora* W. Weber & Roeth, Brasil.

Aechmea coelestis (K.Koch) E.Morren = *A. coelestis* var. *coelestis*, Brasil.

Aechmea cylindrata Lindm.,. Brasil.

Aechmea distichantha Lem., N Argentina, Paraguay, Uruguay.

Aechmea fasciata (Lindl.) Baker ‘Morgana’, Origen hortícola.

Aechmea fasciata (Lindl.) Baker = *Billbergia fasciata* Lindl. = *B. rhodocyanea* Lem., Brasil.

Aechmea gamosepala Wittm., Brasil.

Aechmea mcvanghii L. B. Sm. = *Ursalaea mcvanghii* (L.B. Sm.) Read & Baensch, México.

Aechmea Ruiz & Pav. 'Blue rain', Origen hortícola.

Aechmea weberbaueri Harms, América tropical.

Aechmea werdermannii Harms, Brasil.

Ananas comosus (L.) Merr., Piña. América del Sur.

Araeococcus flagelifolius Harms, N Sudamérica.

Billbergia nutans H.Wendl. ex Regel, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina.

Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl., N Sudamérica, Caribe.

Billbergia sp. Thunb.

Billbergia zebrina (Herb.) Lindl., Brasil.

Catopsis paniculata E. Morren, Costa Rica, México.

Cryptanthus bivittatus (Hook.) Regel., Brasil.

Cryptanthus praetextus E.Morren ex Baker, Brasil.

Dyckia brevifolia Baker, Brasil.

Fosterella penduliflora (C.H. Wright) L.B. Sm., Argentina, Bolivia, Perú.

Guzmania dissitiflora (André) L. B. Sm., América tropical.

Guzmania donnellsmithii Mez ex Donn.Sm., Costa Rica, Panamá; Nicaragua, Ecuador.

Guzmania lingulata (L.) Mez, C América, Perú, Brasil.

Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez, México, S América.

***Guzmania* sp.** Ruíz & Pav. 'Pasion', Origen hortícola.

***Guzmania* sp.** Ruíz & Pav. 'Torch', Origen hortícola.

***Guzmania* sp.** Ruíz & Pav. De Florida a América tropical.

Neoregelia carolinae (Beer) L. B. Sm., Brasil.

***Neoregelia* sp.** L.B. Sm. 'Fireball', Origen hortícola.

***Neoregelia* sp.** L.B. Sm. 'Jill', Origen hortícola.

Orthophytum sanctum L.B. Sm., Brasil.

Pitcairnia altensteinii (Link, Klotzsch & Otto) Lem., Venezuela.

Pitcairnia heterophylla (Lindl.) Beer, Costa Rica, México,
Venezuela, Ecuador.

Puya venusta (Baker) Phil, Chile.

Quesnelia quesneliana (Brongn.) L.B.Sm., SE Brasil.

Tillandsia aeranthos (Loisel.) L. B. Sm., Brasil. Argentina.

Tillandsia albertiana Verv., Argentina.

Tillandsia andreana E. Morren ex André, Colombia.

Tillandsia argentea Griseb., Cuba.

Tillandsia baileyi Rose ex Small, S. Texas (EE. UU.), Tamaulipas
(México).

Tillandsia balbisiana Schult. & Schult. f., Florida (EE. UU.).

Tillandsia bergeri Mez, Argentina.

Tillandsia brachycaulos Schltdl. var. ***abdida***, México, Venezuela,
Panamá.

Tillandsia bulbosa Hook., México. Colombia. Brasil.

Tillandsia butzii Mez, Costa Rica, México.

Tillandsia capitata Griseb 'Peach', República Dominicana, Cuba,
México.

- Tillandsia cyanea* Linden ex K. Koch., Ecuador.
- Tillandsia disticha* Kunth, Colombia, Ecuador, Perú.
- Tillandsia fasciculata* Sw., México, Brasil.
- Tillandsia filifolia* Schltdl. & Cham., México, Costa Rica.
- Tillandsia fuchsii* W. Till var. *argentea*, México.
- Tillandsia fuchsii* W. Till, Oaxaca (México).
- Tillandsia gardneri* Lindl., Brasil, Venezuela.
- Tillandsia harrisii* Ehlers, Guatemala.
- Tillandsia kolbii* W. Hill & Schatzl, México.
- Tillandsia magnusiana* Wittm., México, Guatemala, Honduras.
- Tillandsia mallemontii* Glaz. ex Mez, Brasil.
- Tillandsia mauryana* L.B. Sm., México.
- Tillandsia montana* Reitz, Brasil.
- Tillandsia neglecta* E. Pereira, Brasil.
- Tillandsia oaxacana* L.B. Sm., México.
- Tillandsia pohliana* Mez, Brasil.
- Tillandsia reichenbachii* Baker, Bolivia, Argentina.
- Tillandsia schiedeana* Steud., Costa Rica, México, Venezuela.
- Tillandsia seleriana* Mez = *T. ehlersiana* Rauh, Chiapas (México).
- Tillandsia seleriana* Mez, México.
- Tillandsia sp.* L., Sudamérica.
- Tillandsia streptophylla* Scheidw. ex E.Morren, México.
- Tillandsia stricta* Sol. ex Ker Gawl., Sudamérica.
- Tillandsia tricolor* Schltdl. & Cham. = *T. melanocrater* L. B. Sm., Guatemala, Costa Rica, Panamá.

Tillandsia usneoides (L.) L., Musgo español. De EE. UU. a Argentina.

Tillandsia velutina Ehlers, México.

Tillandsia xerographica Rohweder, Guatemala.

Vriesea hieroglyphica (Carrière.) E. Morr., Brasil.

Vriesea procera (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm., Brasil, Venezuela.

Vriesea splendens (Brongn.) Lem. = *Tillandsia splendens* Brongn., Venezuela, Guayana, Trinidad y Tobago.

Vriesea x poelmanii Leon Duval, Origen hortícola.

Buxaceae

Buxus balearica Lam., Boj. Cerdeña, Islas Baleares, N África, S España, S Turquía.

Buxus sempervirens L. = *B. colchica* Pojark. = *B. hyrcana* Pojark., Boj común. C, S Europa, N África, SO Asia.

Cactaceae

Astrophytum myriostigma Lem., Bonete de obispo. México.

Astrophytum ornatum (DC.) Britton. & Rose, México.

Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb., S Perú.

Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A.Berger = *Opuntia brasiliensis* (Willd.) Haw., Brasil.

Cereus jamacaru DC., Brasil.

Cereus peruvianus (L.) Mill., = *C. repandus* (L.) Mill., Brasil, Argentina.

Cereus repandus (L.) Mill. ‘Monstruosus’, Origen hortícola.

Cleistocactus hildegardiae F. Ritter, Bolivia.

***Cleistocactus* sp.** Lem., Perú, Uruguay, Bolivia, Argentina.

Cleistocactus straussii (Heese) Backeb. = *Borzicactus strausii* (Heese) A. Berger, Bolivia, Argentina.

Cochemiea maritima G.E. Linds. = *Mammillaria pondii* subsp. *maritima* (G.E. Linds.) D.R. Hunt, Costa del Pacífico de Baja California (México).

Consolea moniliformis (L.) A. Berger, Islas del Caribe, Florida.

Cryptocereus antiridaceaeonianus Alexander, México.

Cylindropuntia bigelovii (Engelm.) F.M. Knuth = *Opuntia bigelovii* Engelm., México, California y Arizona.

Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M. Knuth = *Opuntia imbricata* (Haw.) DC., México.

Cylindropuntia imbricata subsp. ***rosea*** (DC.) M.A. Baker. = *O. pallida* Rose, Cactus rosa. México.

Cylindropuntia leptocaulis (DC.) F.M. Knuth = *Opuntia leptocaulis* DC., De Oklahoma a Arizona, S México.

Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb. = *Opuntia pallida* Rose, México.

Cylindropuntia spinosior (Engelm.) F.M.Knuth = *Opuntia spinosior* (Engelm.) Toumey, Arizona, Nuevo México, N México.

Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F.M.Knuth = *Opuntia tunicata* (Lehm.) Pfeiff., Desierto Arizona (México).

Echinocactus grusonii Hildm. 'Brevispinus', Origen hortícola.

Echinocactus grusonii Hildm. var. ***albispina***, México.

Echinocactus platyacanthus Link & Otto = *E. ingens* Zucc. ex Pfeiff., México.

Echinocereus knippelianus Liebner = *E. inermis* Haager Jr., México.

Echinocereus pentalophus (DC.) Lem., México.

Echinocereus sp. Engelm., SE EE. UU., México.

Echinocereus triglochidiatus Englm., Nuevo México.

Echinopsis huascha (Web.) Friedrich & G.D.Rowley =
Trichocereus huascha (F.A.C. Weber) Britton & Rose, Argentina.

Echinopsis multiplex (Pfeiff.) Zucc., S Brasil.

Echinopsis schickendantzii F.A.C.Weber, Tucumán (Argentina).

Echinopsis scopulicola (F. Ritter) Mottram, Bolivia.

Echinopsis sp. Zucc, Sudamérica.

Echinopsis subdenudata Cárdenas, Bolivia, Paraguay.

Echinopsis terscheckii (Parm.) Friedrich & G.D.Rowley, Argentina, Bolivia.

Epiphyllum anguliger (Lem.) G.Don, México.

Epiphyllum crenatum (Lindl.) G. Don, De México a Honduras.

Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw., México y Guatemala.

Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose, N Perú.

Espostoa sp. Britton & Rose, Desde los Andes hasta el S Ecuador, Perú.

Ferocactus chrysacanthus (Orcutt) Britton & Rose, México.

Ferocactus emoryi subsp. *rectispinus* (Engelm.) N.P. Taylor = *F. rectispinus* (Engelm.) Britton & Rose, Baja California (México).

Ferocactus glaucescens (DC) Britton & Rose var. *nudum*, Origen hortícola.

Ferocactus glaucescens (DC.) Britton & Rose, Cactus de barril azul. México.

Ferocactus gracilis H.E.Gates, México.

Ferocactus gracilis subsp. *coloratus* (H.E.Gates) N.P.Taylor = *F. coloratus* H.E. Gates, Baja California (México).

Ferocactus gracilis subsp. *gatesii* (G.E. Linds) N.P. Taylor = *Ferocactus gatesii* G.E. Linds., Baja California (México).

Ferocactus herrerae J.G. Ortega, México.

Ferocactus macrodiscus (Mart.) Britton & Rose, San Luis de Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Oaxaca (México).

Ferocactus peninsulae (F.A.C.Weber) Britton & Rose = *F. horridus* Britton & Rose, Baja California (México).

Ferocactus piliferus (Lem.) G.Unger = *F. pilosus* (Galeotti) Werderm., San Luis de Potosí, Zacatecas, Coahuila (México).

Ferocactus recurvus (Mill.) Borg = *F. latispinus* (Haw.) Britton & Rose, Lengua del demonio. E,C México.

Ferocactus schwarzii G.E. Linds., Sinaloa (México).

Gymnocalycium baldianum (Speg.) Speg., Argentina.

Gymnocalycium horstii Buining, Uruguay, E Paraguay, S Brasil, N Argentina.

Gymnocalycium saglionis (Cels) Britton & Rose, Argentina.

Hylocereus esculentensis Kimmach, Guatemala.

Hylocereus sp (A. Berger) Britton & Rose, América tropical.

Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose, Dama de la noche. C América.

Kroenleinia grusonii (Hildm.) Lodé., = *Echinocactus grusonii* Hildm., Asiento de suegra. México.

Lophocereus marginatus (DC.) S.Arias & Terrazas = *Marginatocereus marginatus* (DC.) Backeb., Organo, Jarritos. México central.

Mammillaria albescens Tiegel subsp. *maritimus*, México.

Mammillaria albicans (Britton & Rose) Berger., Baja California.

Mammillaria albicans subsp. *fraileana* (Britton & Rose) D.R. Hunt.
= *M. fraileana* (Britton & Rose) Boed., México.

Mammillaria albilanata Backeb subsp. *oaxacana* D.R. Hunt,
Oaxaca (México).

Mammillaria apozolensis Repp. var. *saltensis* Repp, México,
Zacatecas.

Mammillaria bachmannii Boed. ex Berger, México.

Mammillaria backebergiana F.G. Buchenau subsp. *ernestii*
(Fittkan) Hunt, Guerrero (México).

Mammillaria backebergiana F.G. Buchenau, México.

Mammillaria blossfeldiana Boed., Baja California , México.

Mammillaria bocasana Poselg. = *M. bocasana* subsp. *bocasana*, San
Luis de Potosi (México).

Mammillaria bocasana Poselg., San Luis de Potosi (México).

Mammillaria bocasana subsp. *eschauzieri* (J.M. Coult.) Fitz
Maurice & B. Fitz Maurice = *M. hirsuta* Boed., San Luis de Potosi,
Zacatecas (México).

Mammillaria boelderliana Wohlschl., México, Zacatecas.

Mammillaria bombycina Quehl, México.

Mammillaria boolii G.E. Linds., México

Mammillaria bravoae R.T. Craig subsp. *maritimus*, México.

Mammillaria carnea Zucc. ex Pfeiff., Puebla (México).

Mammillaria chica Repp., Durango (México).

Mammillaria columbiana (Werd.) Dugand var. *bogotensis*,
Colombia, Venezuela.

Mammillaria compressa DC., México.

Mammillaria confusa Orcutt, México.

Mammillaria crinita DC., México.

Mammillaria crinita subsp. *wildii* (A. Dietr.) D.R. Hunt = *M. wildii* Dietr., Hidalgo (México).

Mammillaria diacentra Jacobi, México.

Mammillaria dixanthocentron Backeb., México: Puebla, Oaxaca.

Mammillaria duoformis R.T. Craig & E.Y. Dawson, Puebla, Oaxaca, Morelos (México).

Mammillaria erythrosperma Boed. var. *robusta*, México.

Mammillaria evermanniana (Britton & Rose) Orcutt, Isla Cerralvo (México).

Mammillaria flavicentra f. *hamata*, Puebla (México).

Mammillaria geminispina Haw. ex Steud., México.

Mammillaria glassii R.A. Foster, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas (México).

Mammillaria gracilis Pfeiff. = *M. vetula* subsp. *gracilis* (Pfeiff.) D.R. Hunt, Hidalgo, Queretaro, Guanajuato (México).

Mammillaria grahamii Engelm. = *M. oliviae* Orcutt, México, Arizona, Nuevo México, Texas, California (EE. UU.).

Mammillaria gueldemanniana Bakeb., Sierra de Álamos, Sonora (México).

Mammillaria guelzowiana Werderm., Durango (México).

Mammillaria guerreronis (Bravo) Boed., México.

Mammillaria haageana Pfeiff. subsp. *conspicua* (J.A. Purpus) D.R. Hunt = *M. albidula* Backeb., Puebla, Morelos, Oaxaca (México).

Mammillaria hahniana Werderm. subsp. *mendeliana* (Bravo) D.R. Hunt *Neomammillaria mendeliana* Bravo, Guanajuato (México).

Mammillaria hahniana Werderm. subsp. *woodsii* (R.T. Craig) D.R. Hunt, México.

Mammillaria halhingeri Boed., Oaxaca (México).

Mammillaria heyderi Muehlenpf., México.

Mammillaria icamolensis Boed., Nuevo León (México).

Mammillaria karwinskiana subsp. *beiselii* (Diers) D.R. Hunt = *M. beiselii* Diers, México.

Mammillaria knippeliana Quehl, México, Morelos.

Mammillaria lloydii (Britton & Rose) Orcutt, México, Zacatecas, San Luis de Potosí.

Mammillaria longimamma DC., México, EE. UU.

Mammillaria magnimamma Haw. = *M. centricirrha* Lem. = *M. phymatothele* A. Berger, México.

Mammillaria mammillaris (L.) H. Karst., México, S EE. UU., Antillas holandesas, Venezuela.

Mammillaria marksiana Krainz, C México.

Mammillaria matudae Bravo, Michoacan (México).

Mammillaria mazatlanensis K. Schum. = *M. mazatlanensis* subsp. *mazatlanensis* = *M. occidentalis* Boed., Sinaloa, Sonora, Jalisco, Colima., Michoacan (México).

Mammillaria meyranii Bravo, México.

Mammillaria microhelix Werderm., Queretaro (México).

Mammillaria miegiana W. Earle, México.

Mammillaria multihamata Boed., Guanajuato (México).

Mammillaria mystax Mart., C México.

Mammillaria nana Backeb. subsp. *nana* = *M. monancistracantha* Backeb., Santa M^a del Rio, San Luis del Potosi (México).

Mammillaria nana Backeb., Guanajuato (México).

Mammillaria napina J.A. Purpus, México.

Mammillaria neocoronaria F.M. Knuth, México.

Mammillaria nivosa Link ex Pfeiff., *Cactaceae*. Cactus Pezón Lanudo. Caribe y Puerto Rico.

Mammillaria nunezii subsp. *bella* (Backeb.) D.R. Hunt = *M. bella* Backeb., México, Guerrero.

Mammillaria nunezii subsp. *bella* (Backeb.) D.R. Hunt = *M. bella* Backeb. . México, Guerrero.

Mammillaria ortegae (Britton & Rose) Orcutt, México.

Mammillaria pacifica (H.E. Gates) Boed., S Baja California (México).

Mammillaria pennispinosa subsp. *nazasensis* (Glass & R. Foster) D.R. Hunt = *M. pennispinosa* var. *nazasensis* Glass & R. Foster, Coahuila, Durango (México).

Mammillaria petterssonii Hildm., México.

Mammillaria polythele Mart. = *M. hidalgensis* Purpus, Hidalgo, Queretaro, Guanajuato (México).

Mammillaria prolifera (Mill.) Haw. subsp. *haitiensis* (K. Schum.) D.R. Hunt, México.

Mammillaria prolifera (Mill.) Haw., México, Texas (EE. UU.).

Mammillaria rectispina (E.Y. Dawson) Repp., Baja California, México.

Mammillaria rekoi Vaupel subsp. *leptocantha* (Lau) Hunt. var. *aurespina*, Oaxaca (México).

Mammillaria rhodantha Link & Otto = *M. rhodantha* Link & Otto subsp. *rhodantha*, Hidalgo, Michoacan, Queretano, Guanajuato (México).

Mammillaria rhodantha Link & Otto subsp. *mccartenii* Repp.,
Michoacan, Zacatecas (México).

Mammillaria roseoalba Boed., México.

Mammillaria schiedeana Ehrenberg. subsp. *giselae* Lüthy,
Tamaulipas (México).

Mammillaria scrippsiana (Britton & Rose) Orcutt var. *autlanensis*,
México.

Mammillaria setispina Englm. ex J.M. Copult., Baja California.

Mammillaria sheldonii (Britton & Rose) Boed., Sonora, Chihuahua
(México).

Mammillaria sphacelata Mart., Puebla, Oaxaca.

Mammillaria spinosissima Lem. subsp. *pilcayensis* (Bravo) D.R.
Hunt, México.

Mammillaria spinosissima Lem. subsp. *spinossisima* = *M.*
gasterantha Repp., Morelos, Guerrero (México).

Mammillaria spinosissima Lem., var. *auricoma* (A.Dietr.) Gürke,
Morelos (México).

Mammillaria spinosissima Lem., var. *auricoma* 'Cristata', México.

Mammillaria varieaculeata Bucheanu, Puebla (México).

Mammillaria verhaertiana Boed. = *M. phitauiana* (E.M. Baxter)
Werderm., México.

Mammillaria wagneriana Boed., México.

Mammillaria winterae Boed., México.

Mammillaria winterae subsp. *aramberri* Hunt, Nuevo León
(México).

Mammillaria zeilmanniana Boed. var. *alba*, Guanajuato (México).

Melocactus conoideus Biuning & Brederoo, Brasil.

Myrtillocactus geometrizzans (Mart. ex Pfeiff.) Console, México.

Neomammillaria graessneriana (Boed.) Britton & Rose =
Mammillaria graessneriana Boed., Coahuila (México).

Neoporteria napina (Phil.) Backeb., Chile.

Opuntia articulata (Pfeiff.) D.R. Hunt var. *inermis* Tephrocactus
articulatus (Pfeiff.) Backeb., Argentina.

Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., México, Arizona (EE.
UU.).

Opuntia engelmannii var. *linguiformis* (Griffiths) B.D.Parfitt &
Pinkava = *O. linguiformis* Griffiths, S de Tejas a San Antonio (EE.
UU.).

Opuntia ficus-indica (L.) Mill., Chumbera, Tuna. México.

Opuntia galapageia Hemsl., Islas Galapagos (Ecuador).

Opuntia macrocentra Engelm. = *O. violacea* Engelm., México.

Opuntia microdasys subsp. *rufida* (Engelm.) U. Guzmán &
Mandujano = *O. rufida* Engelm., Texas, N México.

Opuntia monacantha (Willd.) Haw., S Brasil, Paraguay.

Opuntia picardoi Marn.-Lap., N Argentina.

Opuntia robusta J.C. Wendl., Cholla. México central.

Opuntia salmiana Parm. ex Pfeiff., Brasil, Paraguay, Argentina.

Opuntia tomentosa Salm-Dyck, México central.

Oreocereus celsianus (Lem. ex Salm-Dyck) A.Berger ex Riccob.,
Bolivia, Bolivia, NE Chile, SE Perú.

Oreocereus fossulatus (Labour.) Backeb., Chile, Perú, Argentina y
Bolivia.

Oreocereus leucotrichus (Phil.) Wagenkn., Chile.

Oreocereus trollii (Kupper) Backeb., Viejo hombre de los Andes. S
Bolivia, N Argentina.

Pachycereus pringlei (S. Watson) Britton & Rose, México, Baja California.

Parodia leninghausii (F.Haage) F.H.Brandt ex Eggli & Hofacker, Balón dorado. Brasil, Argentina.

Parodia magnifica (F.Ritter) F.H. Brandt, Brasil

Pereskia humboldtii Britton & Rose var. ***humboldtii***, O de S América.

Pereskia sacharosa Griseb., América tropical.

Pilosocereus azulensis N.P.Taylor & Zappi, Brasil.

Polaskia chende Gibson & Horak, Oaxaca (México).

Polaskia chichipe (Grosselin) Backeb., México.

Selenicereus anthonyanum (Alexander) D.R. Hunt., Reina de la noche. México.

Selenicereus chrysocardium (Alexander) Kimnach, América Central, América del Sur, Caribe.

Selenicereus grandiflorus Britt. & Rose subsp. ***lautner*** Ralf Bauer, México.

Selenicereus macdonaldiae (Hook.) Britton. & Rose, Honduras.

Selenicereus pteranthus (Link ex A. Dietr.) Britton & Rose, Princesa de la Noche. México.

Stenocactus crispatus (DC.) A. Berger ex A.W. Hill, México.

Stenocereus pruinosus (Otto ex Pfeiff.) Buxb., México.

Stenocereus sp. (A.Berger) Riccob, Baja California, Arizona (EE. UU.), México, Colombia, Costa Rica.

Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose, Palillo de dientes. Bolivia, Argentina.

Tunilla erectoclada (Backeb.) D. R. Hunt & J. Iliff, Argentina.

Weberbauerocereus winterianus F. Ritter, Perú.

Weberocereus glaber (Eichlam) G.D. Rowley, Costa Rica,
Guatemala, México.

Weberocereus sp. Britton. & Rose, Costa Rica, Guatemala, México.

Campanulaceae

Jasione montana L., Europa, NO África, Turquía.

Cannabaceae

Celtis australis L., Almez, Almencino. S Europa, N África, O Asia.

Celtis julianae C.K. Schneid., China.

Celtis occidentalis L., Almez americano. SE Canadá, EE. UU.

Cannaceae

Canna x generalis L.H. Bailey & E.Z. Bailey, Origen hortícola.

Capparaceae

Capparis spinosa L. subsp. *spinosa*, Alcaparra. Región
mediterránea.

Caprifoliaceae

Abelia chinensis R. Br. = *A. rupestris* Lindl., Abelia. China.

Abelia x grandiflora (Ravelli ex André) Rehder. Abelia. Origen
hortícola.

Lonicera biflora Desf., Madreselva litoral. Región mediterránea.

Lonicera etrusca Santi, Madreselva etrusca. S Europa.

Lonicera fragrantissima Lindl. & J. Paxton, China.

Lonicera implexa Aiton, Zapatillas, Calza. S Europa.

Lonicera japonica Thunb., Madreselva. E Asia.

Lonicera periclymenum L., Madreselva de los bosques. Europa.

Scabiosa stellata L., SO Europa.

Caryophyllaceae

Dianthus caryophyllus L., Clavel común. Región mediterránea.

Dianthus deltoide L., Clavellina. Europa.

Paronychia argentea Lam., Paroniquia. Región mediterránea.

Polycarpon tetraphyllum (L.) L., O, C Europa, Región mediterránea, S, O Asia, África.

Silene colorata Poir, Región mediterránea, N Irán, Arabia, Lanzarote (Islas Canarias. España).

Casuarinaceae

Casuarina cunninghamiana Miq., Nueva Gales del Sur (Australia).

Casuarina equisetifolia L., Australia, Malasia, Polinesia.

Celastraceae

Brexia madagascarensis (Lam.) Thouars ex Ker Gawl., E África.

Catha edulis (Vahl.) Endl., Té de Abisinia. De SO Arabia a S África.

Euonymus indicus B.Heyne ex Wall. = *Euonymus alatus* Elmer, *Celastraceae*. E Asia.

Euonymus japonicus L. f., Evónimo. Japón, Corea, y China.

Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes. = *Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell subsp. *europaeus* (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes et M.B. Crespo, Arto, Espino cambrón. SE Península Ibérica, N África (Marruecos y Argelia).

Matthiola incana (L.) R. Br., *Brassicaceae*. S W Europa.

Matthiola maderensis Lowe, *Brassicaceae*. Madeira (Portugal).

Maytenus canariensis (Loes) G. Kunkel & Sunding, Peralillo Islas Canarias (España).

Chenopodiaceae

Beta vulgaris L. = *B. vulgaris* subsp. *maritima* (L.) Arcang., Región mediterránea.

Chenopodium murale L., Zona meridional de Euroasia.

Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz, Región mediterránea, C Europa, C Asia, África tropical.

Cichorioideae

Carlina corymbosa L., Región mediterránea.

Cistaceae

Cistus albidus L., Jara blanca. Región mediterránea occidental.

Cistus crispus L., Región mediterránea occidental.

Cistus ladanifer L., Región mediterránea occidental.

Cistus monspeliensis L., Región mediterránea, Madeira, Tenerife (Islas Canarias. España).

Cistus x corbariensis Pourr., Origen hortícola.

Cistus x purpureus Lam., Origen hortícola.

Fumana thymifolia (L.) Spach, Región mediterránea.

Clusiaceae

Mammea americana L., Jamaica, Is. La Española, Puerto Rico, Las Antillas.

Combretaceae

Combretum indicum (L.) DeFilipps = *Quisqualis indica* L.,
Cuscualis. De La Unión de Myanmar a Nueva Guinea.

Commelinaceae

Callisia fragrans (Lindl.) Woodson = *Spironema fragrans* Lindl.,
México.

Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt ‘Purple Heart’ = *Setcreasea
purpurea* Boom, Origen hortícola.

Tradescantia x andersoniana W.Ludw. & Rohweder ‘Blue & Gold’,
Origen hortícola.

Tradescantia zebrina Bosse, México.

Convallariaceae

Aspidistra elatior Blume, S. Japón.

Convolvulaceae

Calystegia soldanella (L.) R.Br., Corregüela marina. De N Europa a
la Región mediterránea.

Convolvulus althaeoides L., S Europa.

Convolvulus arvensis L., Europa.

Convolvulus floridus L. f., Islas Canarias (España).

Convolvulus lanuginosus Desr., S, E España, S Francia.

Convolvulus sabatius Viv, Campanilla azul. Región mediterránea, N África.

Convolvulus siculus L., Región mediterránea, Macaronesia.

Dichondra repens J. R. Forst. & G. Forst., C América, O India, China, S Japón, Islas Ryu kyu.

Ipomoea alba L., Entre México y Florida hasta N Argentina.

Ipomoea cairica (L.) Sweet, África tropical, Asia.

Crassulaceae

Aeonium arboreum L. ‘Atropurpureum’, Origen hortícola.

Aeonium ciliatum (Willd.) Webb & Berth., Islas Canarias (España).

Aeonium glandulosum Webb & Berthel., Madeira (Portugal).

Aeonium glutinosum Webb & Berthel., Madeira (Portugal).

Aeonium gomerense (Praeger) Praeger, La Gomera (Islas Canaria. España).

Aeonium lancerottense (Praeger) Praeger, Lanzarote (Islas Canarias. España).

Aeonium manriqueorum Bolle, Hierba puntera. Islas Canarias (España).

Aeonium nobile (Praeger) Praeger, Islas Canarias (España).

Aeonium percarneum (R.P. Murray) Pit. & Proust., Bejeque rosado. Gran Canaria (Islas Canarias. España).

Bryophyllum delagoense (Eckl. & Zeyh.) Druce = *Kalanchoe tubiflora* (Harv.) Raym.-Hamet, S África, Madagascar.

Crassula arborescens (Mill.) Willd. 'Gollum', Sudáfrica.

Crassula arborescens (Mill.) Willd., Sudáfrica.

Crassula ausensis Hutch. subsp. *titanopsis* Pavelka, S Namibia.

Crassula ausensis Hutch., Namibia.

Crassula capitella (Thunb.) Toelken subsp. *thyrsiflora*, S África.

Crassula columnella Marloth & Schönland, De Costa Oeste de S África a Namibia.

Crassula conmutata Friedr., Namibia.

Crassula corymbulosa Link and Otto, S África.

Crassula dejecta Jacq. = *C. albiflora* Sims, Sudáfrica.

Crassula falcata J. C. Wendl., S África.

Crassula lactea Sol., S África.

Crassula mesembryanthemoides (Haw.) Dietr., Namibia.

Crassula muscosa L. = *C. lycopodioides* Lam., Sudáfrica, Namibia.

Crassula nudicaulis L. = *C. obvallata* L., S África.

Crassula orbicularis L. = *C. rosularis* Haw., S África.

Crassula ovata Druce 'Minor', Origen hortícola.

Crassula pellucida L. subsp. *marginalis* (Dryand.) Toelken, S África.

Crassula perforata Thunb., S África.

Crassula rupestris Thunb., S África.

Crassula socialis Schönland, S África.

Crassula spathulata Thunb., Sudáfrica.

Crassula tetragona L., África del Sur.

Echeveria elegans Rose, México.

Echeveria gibbiflora DC., México.

Echeveria pilosa J. Purpus, México.

Echeveria setosa Rose & Purpus, México.

Echeveria sp. DC. América

Echeveria sp. DC., 'Afterglow', Origen hortícola.

Echeveria tolimanensis Matuda, Toliman (México).

Echeveria x undulata De Smet ex E.Morren, Origen hortícola.

Graptoveria sp. G.D. Rowley 'Demie Lune', Origen hortícola.

Kalanchoe beharensis Drake var. *subnuda* H. Jacobsen,
Madagascar.

Kalanchoe beharensis Drake, Madagascar.

Kalanchoe blossfeldiana Poelln., Madagascar.

Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier,
Madagascar.

Kalanchoe longiflora Schltr ex J.M. Wood, Natal (Sudáfrica).

Kalanchoe luciae Raym.-Hamet 'Oricula', Origen hortícola.

Kalanchoe tetraphylla H. Perrier, Sudáfrica.

Kalanchoe thyrsifolia Harv., S África.

Pachyphytum compactum Rose, México.

Pachyphytum oviferum Purpus, México.

Pachyveria roseana H.Jabcosen,

Sedum morganianum E.Walther, S México.

Sedum mucizonia (Ortega) Raym.-Hamet = *Mucizonia hispida* A:
Berger, C y S de la Península Ibérica y el NW de África.

Sedum nussbaumerianum Bitter, México.

Sedum nussbaumerianum Bitter, México.

Sedum pachyphyllum Rose, Platanitos. México.

Sedum palmeri S. Watson, México.

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, Uña de gato. Región mediterránea, Europa meridional.

Sempervivum sp. L., Siempreviva. N África, Oriente medio, Europa.

Umbilicus horizontalis (Guss.) DC., Is. Canarias, S y E España, Is. Baleares.

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, Región mediterránea, Macaronesia.

Villadia batesii (Hemsl.) Baehni & Macbride, México.

Cupressaceae

Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl., Madagascar.

Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. ‘Nana Gracilis’, Origen hortícola.

Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.) D.Don., Cedro japonés. China, Japón.

Cupressus lusitanica Mill. Bartel = *C. coulteri* J. Forbes, Ciprés de México. C América.

Cupressus sempervirens L. var. ***horizontalis*** (Mill.) Loudon, Ciprés. Región mediterránea.

Cupressus sempervirens L., ‘Stricta’, Origen hortícola.

Cupressus sempervirens L., Ciprés mediterráneo, ciprés común. Región mediterránea, S Europa.

Hesperocyparis arizonica (Greene) Bartel, = *Cupressus arizonica* Greene, Ciprés de Arizona. SE EE. UU., México.

Juniperus canariensis Guyot = *J. turbinata* subsp. *canariensis* (Guyot) Rivas Mart., Wildpret & P.Pérez. Sabina canaria. La Gomera, El Hierro, Tenerife, La Palma (Islas Canarias. España).

Juniperus communis L., Enebro común. Zona templada del hemisferio norte.

Juniperus conferta Parl. ‘Blue Pacific’, Origen hortícola.

Juniperus horizontalis Moench ‘Blue Chip’, Origen hortícola.

Juniperus horizontalis Moench, Enebro rastrero. N EE. UU.

Juniperus macrocarpa Sm. = *J. oxycedrus* subsp. *macrocarpa* (Sm.) Neilr, Enebro de dunas. Región mediterránea, W Asia.

Juniperus oxycedrus L., Enebro de la miera. Región mediterránea, Caúcaso e Irán.

Juniperus phoenicea L., Región mediterránea, Macaronesia.

Juniperus phoenicea var. *turbinata* (Guss.) Parl., *Cupressaceae*. Sabina. Región mediterránea Occidental.

Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D. Don, ‘Blue carpet’, *Cupressaceae*. Enebro escamoso. Origen hortícola.

Juniperus turbinata Guss., Sabina costera. Región mediterránea.

Juniperus* x *pfitzeriana (Späth) P.A.Schmidt, *Cupressaceae*. Enebro de Pfitzer. Hemisferio Norte.

Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng, Sichuan-Hubei (China).

Platycladus orientalis (L.) Franco = *Thuja orientalis* L., Tuya, Árbol de la vida. China, Corea.

Sequoia sempervirens (D, Don.) Endl., Secuoya. California (EE. UU.).

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J. Buchholz, Secuoya gigante. N California (EE. UU.).

Taxodium distichum (L.) Rich., Ciprés de los pantanos. SE EE. UU.

Taxodium mucronatum Ten. = *T. huegelii* C.Lawson,
Cupressaceae. México.

Taxus x media (*T. Baccata* x *T. cuspidata*) Hillii, Origen hortícola.

Tetraclinis articulata (Vahl) Mast., SE España, N África.

Widdringtonia whytei Rendle, Cedro de Mulanje. Malawi.

Cyatheaceae

Sphaeropteris cooperi (F. Muell.) R.M. Tryon = *Cyathea cooperi*
(F. Muell.) Domin, Árbol helecho australiano. Australia.

Cycadaceae

Cycas circinalis L., Cica, Palmera helecho, Palma del sagú, Sagú de Nueva Holanda. India, La Unión de Myanmar, Sri Lanka, Islas del Pacífico sur.

Cycas revoluta Thunb., Cica, Palma Sagú, Sagú del Japón. Islas Ryu Kyu, S Isla Kyushu (Japón).

Cycas riuminiana Porte ex Regel = *C. circinalis* subsp. *riuminiana*
(Porte ex Regel) J.Schust., Islas Palawan.

Cycas rumphii Miq., India, Sri Lanka, Islas del Pacífico sur.

Cycas taiwaniana Carruth., Isla de Taiwan, Isla de Hainan, SE China.

Cyperaceae

Cyperus alternifolius subsp. *flabelliformis* Kük. = *C. involucratus* Rottb., Sombrillita, paraguaita. Madagascar, Islas Reunión, Islas Mauricio.

Cyperus haspan L., México.

Cyperus papyrus L., Papiro. C África y Valle del Nilo (Egipto).

Isolepis fluitans (L.) R.Br., C,S Europa y NOÁfrica.

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla = *Scirpus lacustris* L.,
Cosmopolita.

Davalliaceae

Davallia canariensis (L.) Sm., Islas Canarias (España), N África.

Dicksoniaceae

Dicksonia antarctica Labill = *Balantium antarticum* (Labill.) C
Presl., Helecho arborescente. S, E Australia, Tasmania.

Didiereaceae

Alluaudia procera (Drake) Drake, Madagascar.

Portulacaria afra Jacq. var. *foliis-variegatis* H. Jacobsen ,
Mozambique, S África.

Portulacaria afra Jacq., S África.

Dioscoreaceae

Dioscorea elephantipes (L'Hert) Engl., S África.

Doryanthaceae

Doryanthes palmeri W. Hill ex Benth., E Austrtalia.

Droseraceae

Drosera capensis L. 'Rubra', Origen hortícola.

Drosera nitidula subsp. *omissa* (Diels) N.G.Marchant & Lowrie
'Pink Flower', Origen hortícola.

Drosera spatulata Labill., Asia, Australia.

Dryopteridaceae

Cyrtomium falcatum (L.) C. Presl = *Polystichum falcatum* (L. f.)
Diels, De S África a Hawai.

Cyrtomium yamamotoi var. *intermedium* (Diels) Ching & K.H.
Shing = *C. fortunei* J. Sm var. *clivicolum* (Makino) Tagawa, Japón,
Korea, China.

Ebenaceae

Diospyros kaki L. var. *sharon*, Origen hortícola.

Diospyros kaki L., Caqui, Kaki, Palo santo China, Japón.

Diospyros nigra (J.F.Gmel.) Perrier = *D. digyna* Jacq., Zapote negro
C America.

Diospyros virginiana L., Caqui de Virginia De Connecticut a
Florida, Iowa, Kansas (E EE. UU.).

Elaeagnaceae

Elaeagnus angustifolia L., Árbol del paraíso. Del E de Europa al E
de Asia.

Elaeagnus × *submacrophylla* Servett. ‘Compacta’ = *Elaeagnus*
× *ebbingei* J.Door., Origen hortícola.

Ephedraceae

Ephedra fragilis Desf. = *E. fragilis* Desf. subsp. *fragilis*, Efedra,
hierba de las coyunturas. O región mediterránea, Macaronesia.

Equisetaceae

Equisetum hyemale L., Cola de caballo. Hemisferio norte.

Ericaceae

Arbutus unedo L., *Ericaceae*. Madroño. S Europa, Irlanda, W de Asia, Macaronesia, N África.

Escacalloniaceae

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers., Escalonia. Chile.

Euphorbiaceae

Breynia disticha J.R. Forst. & G. Forst., Polinesia.

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. ‘Aucubifolia’, Croton. Origen hortícola.

Euphorbia abyssinica J.F. Gmel. = *E. acruensis* N.E.Br., Etiopía.

Euphorbia aeruginosa Schweick., S África.

Euphorbia alluaudii Drake = *E. leucodendron* Drake, S Madagascar.

Euphorbia aphylla Brouss. ex Willd., Tolda. Gran Canaria, Tenerife, La Gomera (Islas Canarias. España).

Euphorbia baioensis S. Carter, Kenia.

Euphorbia balsamifera Aiton, Tabaiba dulce. África, Islas Canarias (España).

Euphorbia bcompacta Bruyns = *Synadenium compactum* N.E.Br., Kenia, Ruanda.

Euphorbia bravoana Svent., La Gomera (Islas Canarias. España).

Euphorbia canariensis L., Cardón. Islas Canarias (España).

- Euphorbia caput-medusae* L. ‘Cristata’, Origen hortícola.
- Euphorbia cotinifolia* L., Lechero rojo. México.
- Euphorbia cylindrifolia* Marn.-Lap. & Rauh, Madagascar.
- Euphorbia deightonii* Croizat, Sierra Leona.
- Euphorbia densiflora* (Klotzsch) Klotzsch, México, Guatemala.
- Euphorbia densiflora* (Klotzsch) Klotzsch, México.
- Euphorbia desmondii* Keay & Milne-Redh., Nigeria, Camerún.
- Euphorbia exigua* L., Europa, O Asia, N África, Macaronesia.
- Euphorbia franckiana* A. Berger, S África.
- Euphorbia fruticosa* Forssk. ‘Blue’, Origen hortícola.
- Euphorbia grandicornis* subsp. *grandicornis* = *E. grandialata* R.A. Dyer, Transval (S África).
- Euphorbia grandidens* Haw., S África.
- Euphorbia helioscopia* L., Europa, Asia, N África, Macaronesia.
- Euphorbia inermis* Mill., S África.
- Euphorbia ledienii* A. Berger, Sudáfrica.
- Euphorbia mammillaris* L., S África.
- Euphorbia medicaginea* Boiss., S Península Ibérica, O África.
- Euphorbia milii* Des Moul. ‘Lutea’, Origen hortícola.
- Euphorbia milii* Des Moul. ‘Rosea’, Origen hortícola.
- Euphorbia milii* Des Moul., Madagascar.
- Euphorbia monteiroi* Hook., África tropical.
- Euphorbia murielli* N.E. Br. = *E. candelabrum* Tremant ex Kotschy, África tropical.
- Euphorbia neriifolia* L., India.

Euphorbia nyikae Pax ex Engl., África tropical.

Euphorbia officinarum subsp. *echinus* (Hook.f. & Coss.) Vindt = *E. echinus* Hook.f. & Coss., N África, Macaronesia.

Euphorbia pentagona Haw., Sudáfrica.

Euphorbia peplus L., Europa, O Asia, N África, Macaronesia.

Euphorbia polygona Haw. = *Euphorbia horrida* Boiss., S África.

Euphorbia procumbens Mill. = *E. gorgonis* A. Berger, Sudáfrica.

Euphorbia pteroneura A. Berger, México.

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch = *Poinsettia pulcherrima* (Willd. ex Klotzsch) Graham, Pascuero, Flor de Pascua, Poinsetia. C México.

Euphorbia pulvinata Marloth, S. África.

Euphorbia resinifera O. Berg., Marruecos.

Euphorbia segetalis L., Europa, N África, Macaronesia.

Euphorbia stenoclada Baill., Madagascar.

Euphorbia tirucalli L., De África tropical a Sudáfrica.

Euphorbia trigona Mill. ‘Rubra’, Origen hortícola.

Euphorbia trigona Mill., O África tropical.

Euphorbia umbellata (Pax) Bruyns ‘Rubra’, Origen hortícola.

Euphorbia umbellata (Pax) Bruyns = *Synadenium grantii* Hook. f., Lechero africano. Mozambique, Uganda, Zimbawe.

Euphorbia xyllophylloides Brongn. ex Lem., Madagascar.

Jatropha integerrima Jacq., Peregrina. Cuba.

Jatropha multifida L., América central.

Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit ‘Variegatus’, Origen hortícola.

Pilosocereus odilensis, Sudamérica.

Ricinus communis L. var. *sanguineus*. Ricino rojo. Eritrea, Somalia, Etiopía.

Ricinus communis L., Ricino. E, NE África y Europa.

Fabaceae

Acacia dealbata Link, Mimosa plateada. Nueva Gales del Sur, Victoria, Tasmania (Australia).

Acacia sp. Mill., Australia.

Adenocarpus telonensis (Loisel) DC., S Francia, España, Portugal, N África.

Albizia julibrissin Durazz. = *Acacia julibrissin* (Durazz.) Willd., Árbol de la seda, Acacia de Constantinopla. De Irán a Japón.

Amorpha californica Torr. & A.Gray, C, S California (EE. UU.).

Anthyllis cytisoides L., Albaida. Región mediterránea.

Astragalus echinatus Murray, S Europa, Turquía, NO África.

Astragalus hamosus L., Región mediterránea, Macaronesia.

Bauhinia variegata L., Árbol de las orquídeas. Himalaya, China.

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. = *Psoralea bituminosa* L., S Europa, N África, SO Asia.

Bolusanthus speciosus (Bolus) Harms, S África.

Ceratonia siliqua L., Región mediterránea.

Cercis siliquastrum L., Región mediterránea.

Colvillea racemosa Bojer, Madagascar.

Coronilla juncea L., S Europa, NO África.

Coronilla valentina subsp. *glauca* (L.) Batt., = *C. glauca*, Coronilla. Región mediterránea.

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC., O, S Península Ibérica, NO Marruecos.

Cytisus proliferus L.f. = *Chamaecytisus proliferus* (L. f.) Link, Escobón. Islas Canarias (España).

Cytisus racemosus Hort. Cf. Marcock, Europa, Oriente medio, N África.

Cytisus scoparius (L.) Link. = *Sarothamnus scoparius* (L.) W.D.J. Koch, Retama negra. O, SE y C Europa, Macaronesia.

Delonix decaryi (R. Vig.) Capuron = *Poinciana decaryi* R. Vig., S, SO Madagascar.

Delonix elata (L.) Gamble, África tropical oriental.

Delonix floribunda (Baill.) Capuron, Madagascar.

Delonix pumila Du Puy, Phillipson & R. Rabev, Madagascar.

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf., Flamboyán. Madagascar.

Dorycnium pentaphyllum Scop., Región mediterránea occidental.

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong, S América.

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb., De México hasta Brasil.

Erophaca baetica (L.) Boiss. = *Astragalus lusitanicus* Lam., S Península Ibérica, NO África.

Erythrina caffra Thunb., Árbol del coral. E y S África.

Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson = *Teline monspessulana* (L.) K. Koch., SO Península Ibérica, NO Marruecos.

Genista spartioides Spach, Retama basta. Europa, Oriente medio, N África.

Genista umbellata (L'Hér) Poir. subsp. *equisetiformis* (Spach) Rivas Goday & Rivas Mart. = *Spartium umbellatum* L'Hér., Bolina. S Península Ibérica.

Gleditsia triacanthos L. = *Gleditsia triacanthos* f. *inermis* Willd.,
Acacia negra sin espinas. E EE. UU.

Hardenbergia comptoniana (Andrews) Benth. = *Glycine*
comptoniana Andrews, Australia.

Hardenbergia violacea (Schneev.) Stearn = *Glycine violacea*
Schneev., Australia.

Hedysarum glomeratum F. Dietr., Región mediterránea.

Hippocrepis biflora Spreng., Región mediterránea.

Hippocrepis ciliata Wild, Región mediterránea.

Inga edulis Mart., Brasil

Lathyrus clymenum L., S Europa, Asia menor, N África,
Macaronesia.

Lathyrus tingitanus L., Península Ibérica, S Francia, Cerdeña, NO
África, Macaronesia.

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit = *L. glauca* Benth., Desde
México hasta Honduras.

Lotus edulis L., S Europa, SO Asia, N África.

Lotus ornithopodioides L., S, E Europa, N África, SO Asia.

Medicago arborea L, SE Europa, Asia menor.

Medicago orbicularis (L.) Bartal., Región mediterránea,
Macaronesia, O Asia.

Medicago polymorpha L., Europa, Región mediterránea,
Macaronesia, SO Asia.

Medicago rigidula (L.) All., S Europa, N África, SO Asia.

Melilotus albus Medik., Europa, Asia, N África.

Melilotus elegans Salzm. ex Ser. in DC., Región mediterránea,
Macaronesia, Etiopía.

Melilotus indicus (L.) All., Europa, SO y C Asia, N África.

Melilotus sulcatus Desf., Región mediterránea, Macaronesia.

Ononis natrix L., Europa, N África, Macaronesia.

Ononis speciosa Lag., Gatuña. S España, NO África.

Peltophorum dubium (Urb.) Barneby var. ***berteroarum*** = *P. berteroarum* Urb., Abey. República Dominicana.

Phanera yunnanensis (Franch.) Wunderlin = *Bauhinia yunnanensis* Franch., S África.

Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., Retama. Península Ibérica, NO África.

Robinia pseudoacacia L. ‘Casque Rouge’. Origen hortícola.

Robinia pseudoacacia L. var. ***fresia***, C,E EE. UU.

Robinia pseudoacacia L., Falsa acacia. E EE. UU.

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake, Gallinazo. De México a Brasil.

Schotia afra (L.) Thunb., Provincia del Cabo (Sudáfrica), Namibia.

Schotia brachypetala Sond., Rhodesia, Mozambique, NE, S África.

Schotia latifolia Jacq., S África.

Scorpiurus vermiculatus L., O Región mediterránea, Macaronesia.

Senna bicapsularis (L.) Roxb., Cadecillo. SAmérica.

Spartium junceum L., Retama de olor, Gayomba. Región mediterránea, Macaronesia.

Teline canariensis (L.) Webb & Berthel., Tenerife, Gran Canaria (Islas Canarias. España).

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze, Palo rosa. De S Brasil a Bolivia.

Trifolium angustifolium L., Región mediterránea, Macaronesia.

Trifolium campestre Schreb., SO Asia, NO África, Europa.

Trifolium tomentosum L., Región mediterránea.

Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. = *Anthyllis tetraphylla* L. f.,
Región mediterránea.

Vicia sativa L., Península Ibérica, Baleares.

Wisteria floribunda (Willd.) DC., Glicinia japonesa. Japón.

Wisteria sinensis (Sims) DC.= *W. chinensis* DC., Glicinia. China.

Fagaceae

Quercus berberidifolia Liebm., California (EE. UU.).

Quercus coccifera L., Coscoja. Región mediterránea.

Quercus ilex L., Encina. Región mediterránea, De SO Francia a
Portugal.

Quercus john-tuckeri Nixon & C.H. Müll., California (EE. UU.).

Quercus pubescens Willd., Quejigo, roble enciniego. Asia templada,
Europa.

Quercus rotundifolia Lam., Encina. S Península Ibérica, N.África.

Quercus suber L., Alcornoque. N África, S Europa.

Quercus x acutidens Torr., Origen hortícola.

Fouquieriaceae

Fouquieria macdougalii Nash, N México.

Geraniaceae

Erodium chium (Burm. f.) Willd., África.

Erodium malacoides (L.) L'Hér., S Europa.

Erodium moschatum (L.) L'Hér., S, O Europa.

Geranium purpureum Vill., Región mediterránea, Macaronesia.

Pelargonium crispum (P.J. Bergius) L'Hér., Sudáfrica.

Pelargonium ferulaceum Willd., *Geraniaceae*. Sudáfrica, Namibia.

Pelargonium laxum Steud, Sudáfrica.

Pelargonium mutans Voster = *P. grandiflorum* Willd. = *P. alchemilloides* (L.) Aiton Geranio de pensamiento. Natal (Sudáfrica).

Pelargonium peltatum (L.) L'Hér., Gitanilla. S África.

Pelargonium tomentosum Jacq., Sudáfrica.

Pelargonium zonale (L.) L'Hér., Geranio. S África.

Ginkgoaceae

Ginkgo biloba L., Árbol sagrado, Árbol de los cuarenta escudos.
China, Japón.

Haemodoraceae

Anigozanthos flavidus DC. = *A. coccineus* Paxton, SO Australia.

Hamamelidaceae

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv., China, Japón.

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv. 'Fire Dance', Origen hortícola.

Helioconiaceae

Heliconia pseudoaemygdiana Emygdio & E. Santos, Brasil.

Hemionitidaceae

Cosentinia vellea (Aiton) Tod., Región macaronésica, región mediterránea.

Hyacinthaceae

Leopoldia comosa (L.) Parl. = *Muscari comosum* (L.) Mill., Región mediterránea.

Hydrangeaceae

Deutzia scabra Thunb., Celinda de espigas. China, Japón.

Philadelphus coronarius L., Celindo, Filadelfo. S Europa, SO Asia.

Hydrocharitaceae

Elodea canadensis Michx., EE. UU.

Stratiotes aloides L., Euroasia.

Vallisneria spiralis L., SE Asia, N África, S Europa.

Hypericaceae

Hypericum calycinum L., Hierba de San Juan. SE Bulgaria, N Turquía.

Hypericum canariense L., Islas Canarias (España).

Hypericum hircinum L., Hierba de San Juan. Región mediterránea.

Hypoxidaceae

Molineria capitulata (Lou.) Herb. = *Curculigo capitulata* (Lour.) Kuntze. Indochina.

Iridaceae

Aristea ecklonii Baker, C, S África.

Aristea ensifolia J.Muir, S África, Madagascar.

Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E.Br., Sudáfrica.

Coprosmia sp. (Pappe ex Hook.) Planch., Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Dietes bicolor Sweet & G. Don, Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Dietes grandiflora N.E.Br., S África.

Freesia sp Klatt., África.

Iris orientalis Mill., Lirio blanco. Mediterráneo oriental, Asia menor.

Iris pseudoacorus L., De Europa y N África a Siberia Occidental.

Iris x germanica L., Iris. Origen hortícola.

Iris xiphium L., S Europa, Región mediterránea.

Neomarica gracilis (Herb.) Sprague, Centroamérica

Juglandaceae

Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch, S EE. UU.

Juncaceae

Juncus acutus L., Junco silvestre. Región mediterránea.

Juncus maritimus Lam., C, W Europa, Región mediterránea, W Asia, N África.

Lamiaceae

Ajuga reptans L., Europa, N África hasta Iran.

Coleus neochilus (Schltr.) Codd, África Austral.

Lamium amplexicaule L., Europa.

Lavandula angustifolia Mill., Espliego. Región mediterránea.

Lavandula dentata L., Lavanda. S y E España, Islas Baleares.

Lavandula latifolia Medik., Espliego. Región mediterránea-septentrional.

Lavandula multifida L., Lavanda. O Región mediterránea.

Lavandula pinnata L., Madeira (Portugal).

Lavandula stoechas L., Cantueso. Región mediterránea, Macaronesia.

Lavandula x heterophylla Viv., Origen hortícola

Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Origen hortícola.

Marrubium vulgare L., Euroasia, Región mediterránea, Macaronesia.

Mentha suaveolens Ehrh., Mastranzo. Región mediterránea.

Micromeria graeca (L.) Benth.ex Rchb., Región mediterránea, C, S Portugal.

Origanum vulgare L., Orégano. Europa.

Perovskia atriplicifolia Benth., Salvia Rusa. Afganistán, Rusia.

Phlomis fruticosa L., Flomis, Oreja de liebre. Región mediterránea.

Phlomis purpurea L., Matagallo. Península Ibérica, N Marruecos.

Plectranthus parviflorus Willd. = *P. australis* R. Br., Flor de Cockspur. Hawái, Polinesia francesa, Australia.

Plectranthus socotranus A.B. Sm., Menta de Socotra. Isla de Socotra (Yemen).

***Plectranthus* sp.** L'Hér, 'Mona Lavende', *Lamiaceae*. Origen hortícola.

Plectranthus verticillatus (L.f.) Drude, Planta del dinero. S África, Mozambique.

Rosmarinus officinalis L., Romero. Región mediterránea.

Rosmarinus officinalis L.'Postratus', Romero rastrero. Origen hortícola.

Rotheca myricoides (Hochst.) Steane-Mabb. = *Clerodendrum ugandense* Prain, África.

Salvia canariensis L., Islas Canarias (España).

Salvia farinacea Benth., Nuevo México, Texas (EE. UU.).

Salvia leucantha Cav., Salvia. México.

Salvia microphylla Kunth.= *S.grahamii* Benth., México.

Salvia nemorosa L., De Europa a W Asia.

Salvia x sylvestris L.= *Salvia x superba* (Silva Tar.& C.K.Schneid.) Stapf, Salvia híbrida. Origen hortícola.

Stachys ocymastrum (L.) Briq., SO Europa.

Teucrium fruticans L., Olivilla. Región mediterránea occidental.

Teucrium lusitanicum Schreb., O, S Península Ibérica, NO África.

Teucrium pseudochamaepitys L., SO Europa.

Teucrium rotundifolium Schreb., E, S España, NW África (Marruecos).

Thymbra capitata (L.) Cav.= *Coridothymus capitatus* (L.) Rchb.f., Tomillo blanco, Carrasqueño. España.

Thymus mastichina (L.) L., Mejorana, Tomillo blanco. Península Ibérica, N África.

Thymus vulgaris L., Tomillo. O región mediterránea.

Vitex agnus-castus L., Sauzgatillo. De Región mediterránea a C Asia.

Lauraceae

Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, China, Taiwan, Japón.

Laurus azorica (Seub.) Franco. Macaronesia.

Laurus nobilis L., Región mediterránea.

Persea americana Mill. ‘Fuerte Nachan’, Aguacate Fuerte Nachan.
Origen hortícola.

Persea americana Mill. ‘Hass Nachan’, Aguacate Hass Nachan.
Origen hortícola.

Persea americana Mill. = *P. gratissima* C. F. Gaertn. f., Aguacate. C América.

Lemnaceae

Lemna minor L., Lenteja de agua. Cosmopolita.

Lentibulariaceae

Pinguicula esseriana B. Kirchn., México.

Pinguicula sp. L. C,S América

Utricularia bisquamata Schrank., S África.

Utricularia calycifida Benj., N Sudamérica.

Utricularia lateriflora R. Br., Australia.

Utricularia livida E. Mey., Trópico, S África.

Utricularia parthenopipes P. Taylor., Brasil.

Utricularia praelonga A.St.-Hil. & Girard., Sudamérica.

Utricularia sandersonii Oliv., África tropical.

Utricularia tricolor A. St.-Hil., S América.

Utricularia vulgaris L., Europa, Asia, América Boreal.

Liliaceae

Drimia maritima (L.) Stearn = *Urginea maritima* (L.) Baker, Región mediterránea.

Linaceae

Linum strictum L., De Europa, Región mediterránea a Afganistán.

Lythraceae

Lagerstroemia indica L. = *L. elegans* Wall. ex Paxton, Árbol de Júpiter. China.

Punica granatum L. ‘Motrileño’, Granado motrileño. Origen hortícola.

Punica granatum L. ‘Nana’, Granado enano. Origen hortícola.

Punica granatum L., Granado. Desde Iran al Himalaya

Magnoliaceae

Magnolia grandiflora L., zona costera del SE EE. UU.

Malvaceae

Abutilon sp. Miller, Zona tropicales y subtropicales de América sel Sur.

Adansonia digitata L., África central.

Adansonia fony (Jum. & H.Perrier) H.Perrier var. *rubrostipa* = *A. rubrostipa* Jum. & H.Perrier, Madagascar.

Adansonia grandidieri Baill., Madagascar.

Adansonia madagascariensis Baill. = *A. bernieri* Baillon. ex Poiss., Madagascar.

Adansonia perrieri Capuron, N Madagascar.

Adansonia suarezensis H. Perrier, Madagascar.

Adansonia za Baill., Baobab. Madagascar.

Alyogyne cuneiformis Lewton, O Australia.

Alyogyne hakeifolia (Giord.) Alef. 'Melissa Anne', Origen hortícola.

Alyogyne hakeifolia x *A. huegelli* (Giord.) Alef. 'Montburg purple', *Malvaceae*. Origen hortícola.

Alyogyne huegelii (Endl.) Fryxell, SO Australia.

Anisodonteia capensis (L.) D.M.Bates, Sudáfrica.

Bombax ceiba L. *Malvaceae*. Algodonero rojo. India.

Brachychiton × *incarnatus* Guymer, Australia.

Brachychiton acerifolius (A. Cunn. ex G. Don) F. Muell. = *Sterculia acerifolia* A. Cunn., Árbol de las llamas. De Queensland a Nueva Gales del Sur (Australia).

Brachychiton bidwillii Hook., Australia.

Brachychiton discolor F. Muell. = *B. luridus* C. Moore ex F. Muell., Árbol sombrero. De Queensland a Nueva Gales del Sur.

Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R. Br., Queensland, Nueva Gales Del Sur, Victoria (Australia).

Brachychiton rupestris (T.Mitch. ex Lindl.) K.Schum = *Sterculia rupestris* (T.Mitch. ex Lindl.) Benth., Quensland (Australia).

Callianthe megapotamica (A. Spreng.) Dorr, = *Abutilon megapotamicum* (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin, Abutilón. Brasil.

Callianthe picta (Gillies ex Hook. & Arm.) Donnell = *Abutilon pictum* (Gillies ex Hook.) Walp., Abutilón. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir = *Chorisia insignis* Kunth, Palo borracho amarillo, Barrilito, Yuchán, Árbol botella. Perú.

Ceiba pubiflora (A.St.-Hil.) K.Schum., Barrigudo, Árbol botella. Sudamérica.

Ceiba speciosa (A.St.-Hil., A.Juss. Cambess.) Ravenna = *Chorisia speciosa* A. St.-Hil., Palo borracho rosado, Somohú, Árbol de los pájaros. Brasil, Argentina.

Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. = *D. mastersii* Hook. f., S, E África.

Dombeya natalensis Sond. = *D. tiliacea* (Endl.) Planch., S África.

Dombeya x cayeuxii André, Árbol de las hortensias. Origen hortícola.

Firmiana simplex (L.) W. Wight = *F. platanifolia* (L. f.) Marsili = *Sterculia platanifolia* L. f., Parasol de China. De Islas Ryu Kyu (Japón) a Vietnam.

Guazuma ulmifolia Lam., Guácima. América Tropical.

Hibiscus arnottianus A. Gray, Hawaii (EE. UU.).

Hibiscus coccineus Walter ‘Alba’, Origen hortícola.

Hibiscus coccineus Walter, Florida, Georgia (EE. UU.).

Hibiscus elatus Sw., *Malvaceae*. Jamaica, Cuba.

Hibiscus ludwigii Eckl. & Zeyh., África tropical occidental y oriental, Sudáfrica.

Hibiscus mutabilis L., China.

Hibiscus ovalifolium Vahl, África.

Hibiscus rosa-sinensis L. ‘White Swan’, Cisne blanco. Origen hortícola

Hibiscus rosa-sinensis L., Pacífico, rosa de China. Asia Tropical, China.

Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook. f., Cayena péndula. África tropical.

Hibiscus syriacus L. ‘Woodbridge’, Rosa de Siria. Origen hortícola.

Hibiscus syriacus L., Altea, Rosa de Siria. E Asia

Hibiscus tilliaceous L., ‘Tricolor’. Origen hortícola.

Hibiscus tilliaceous L., Oceanía y Sureste de Asia

Lagunaria patersonia (Andrews) G. Don, Lagunaria. Islas de Lord Howe, Isla de Norkfolk (Australia).

Malva multiflora (Cav.) Soldado, Banfi & Galasso = *Lavatera cretica* L., SO Europa, N África, SO Asia.

Malva sylvestre L., Europa, N África, SO Asia.

Malvaviscus penduliflorus Moc. & Sessé ex DC, Malvavisco. México.

Pachira aquatica Aubl., De C a N de S America.

Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand, América Tropical (México y Guatemala).

Tilia cordata Mill., Tilo de hojas pequeñas. Europa.

Tilia platyphyllos Scop., Tilo, Tilo de hojas grandes. C, S Europa.

Tilia tomentosa Moench = *T. argentea* Desf., Tilo plateado. Europa oriental, N Anatolia.

Marantaceae

Ctenanthe oppenheimiana (E. Morren) K. Schum. = *Calathea oppenheimiana* E. Morren, Maranthaceae. E Brasil.

Ctenanthe setosa (Roscoe) Eichler, SE Brasil.

Marsileaceae

Marsilea batardae Launer, Península Ibérica.

Marsilea strigosa Willd., Región mediterránea.

Meliaceae

Azadirachta indica A. Juss., Myanmar.

Melia azedarach L., Melio. India, De China a Australia.

Martyniaceae

Proboscidea louisianica (Mill.) Thell., SO EE. UU., Garra del diablo México.

Menispermaceae

Pachygone laurifolia (DC.) L.Lian & Wei Wang = *Cocculus laurifolius* DC., Cóculo. De India e Himalaya a China y Japón, Islas de Java (Indonesia).

Moraceae

Artocarpus heterophyllus Lam. 'Black Gold', Origen hortícola.

Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. = *Morus papyrifera* L., China, Japón, Corea, Polinesia.

Ficus auriculata Lour. 'Everest', *Moraceae*. Origen hortícola.

Ficus americana Aubl. 'Tresor', *Moraceae*. Origen hortícola.

Ficus benghalensis L., Higuera de Bengala. Bangladés, India, Sri Lanka.

Ficus benghalensis L. 'Audrey', *Moraceae*. Origen hortícola.

Ficus benjamina L. = *F. nitida* Thunb., Ficus. India, S China, SE Asia, N Australia.

Ficus binnendijkii (Miq.) Miq. 'Amstel King', *Moraceae*. Origen hortícola.

Ficus binnendijkii Miq., De SE Asia a Filipinas.

Ficus bussei Warb. ex Mildbr. & Burret 'Floris', *Moraceae*. Origen hortícola.

Ficus carica L., S Península Ibérica.

Ficus cyathistipula Warb., África Tropical.

Ficus lutea Vahl, Higuera gigante. Desde el Cabo Oriental de Sudáfrica hasta el África tropical.

Ficus elastica Roxb. ex Hornem 'Decora', Origen hortícola.

Ficus elastica Roxb. ex Hornem, Ficus, Higuera del caucho. De E Himalaya y sur de China a Sumatra.

Ficus elástica Roxb. ex Hornem. 'Adbijan', *Moraceae*. Origen hortícola.

Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 'Belize', *Moraceae*. Origen hortícola.

Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 'Tineke', *Moraceae*. Origen hortícola.

Ficus elastica Roxb. ex Hornem., *Moraceae*. Origen hortícola.

Ficus lyrata Warb., África Tropical.

Ficus macrophylla Pers. = *F. magnolioides* Borzì, Ficus hoja de magnolio. Australia.

Ficus microcarpa L. f., India, Sri Lanka y China, de SE Asia a E Australia.

Ficus petiolaris Kunth, *Moraceae*. México.

Ficus pumila L. ‘Variegata’, Origen hortícola.

Ficus pumila L. = *F. stipulata* Thunb. = *F. scandens* Lam., Ficus tapizante. China, Japón, Vietnam.

Ficus religiosa L., Higueras de las pagodas. De India a SE Asia.

Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. = *F. australis* Willd., Higo oxidado. E Australia.

Ficus sycomorus L., Sicomoro. S África.

Ficus umbellata Vahl, *Moraceae*. África tropical.

Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid., De Arkansas a Texas (EE. UU.).

Morus alba L. ‘Pendula’, Morera llorona. Origen hortícola.

Morus alba L., ‘Fruitless’, Origen hortícola

Morus alba L., Morera. C y E China.

Morus nigra L., Morera negra. O Asia.

Moringaceae

Moringa borziana Mattei, África tropical.

Moringa oleifera Lam., NO India.

Moringa ovalifolia Dinter & A. Berger, Namibia Central, SO Angola.

Moringa rivae Chiov., Kenia, SE Etiopía.

Moringa ruspoliana Engl., Árbol fantasma. Somalia, Etiopía Kenia.

Moringa stenopetala (Baker f.) Cufod., Kenia, Etiopía.

Musaceae

Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman, Plátano etíope, plátano rojo. Etiopía.

Musa acuminata Colla 'Dwarf Cavendish', *Musaceae*. Platanera canaria. Origen hortícola (Paretales asiáticos).

Musa basjoo Siebold & Zucc. Ex Linuma, *Musaceae*. S China.

Musa sp. L Nono Pink Variegated ', *Musaceae*. Origen hortícola.

Musa velutina H. Wendl & Drude, Regiones tropicales se Asia.

Musa x paradisiaca L. Platanera. Origen hortícola.

Musella lasiocarpa (Franch) H.W.Li, *Musaceae*. Platanera china. Yunnan (China).

Myrtaceae

Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson., Eucalipto limón. E Australia.

Eucalyptus camaldulensis Dehnh., Australia.

Eucalyptus deglupta Blume, Eucalipto arcoíris. Indonesia, Mindanao (Filipinas).

Eucalyptus diversifolia F. Muell., Karri. SO Australia.

Eucalyptus globulus Labill., Eucalipto común, eucalipto de Tasmania. SE Australia.

Eugenia uniflora L 'Etna fire', Origen hortícola.

Eugenia uniflora L., = *E. myrtifolia* Salisb., Pitanga. América del Sur tropical.

Feijoa sellowiana (O. Berg.) O. Berg. = *Acca sellowiana* (O. Berg.) Burret Berg., Guayabo piña. Paraguay, N Argentina, S Brasil, Uruguay.

Leptospermum scoparium J.R. Forst. & G. Forst., Australia, Nueva Zelanda.

Lophostemom confertus (R.Br.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh., Nueva Gales del Sur, Queensland.

Melaleuca citrina (Curtis) Dum.Cours. 'Splendens' = *Callistemon citrinus* 'Splendens'. Origen hortícola.

Melaleuca linearis Schrad. & J.C.Wendl. var. *linearis* = *Callistemon rigidus* R. Br., Limpiatubos. Nueva Gales del Sur (Australia).

Melaleuca styphelioides Sm., Nueva Gales del Sur (Australia).

Melaleuca viminalis (Sol. ex Gaertn.) Byrnes = *Callistemon viminalis* (Sol ex Gaertn.) G. Don , Limpiatubos. Nueva Gales Del Sur, Queensland (Australia).

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn., Árbol de navidad. Nueva Zelanda.

Myrtus communis L., Mirto, Arrayán. S Europa, NO África, Asia Menor, Oriente próximo.

Psidium cattleianum Sabine = *P. littorale* Raddi, Guayabo rosa. Brasil.

Psidium guajava L., 'Guayabo. América Tropical.

Psidium guayava L. 'Guayabito limón', Guayabito limón. Origen hortícola.

Psidium guayava L. 'Guayabito rojo', Guayabito rojo. Origen hortícola.

Psidium guayava L. 'Guayabo rojo', Guayabo rojo. Origen hortícola.

Syzygium jambos (L.) Alston, Pomarroja. Asia tropical, África.

Nelumbonaceae

Nelumbo nucifera Gaertn. ‘Heilongjiang Lian’, Loto. Origen hortícola.

Nelumbo nucifera Gaertn. ‘Xiangshan Lian’, Loto. Origen hortícola.

Nelumbo nucifera Gaertn. = *N. speciosa* Willd., Flor de loto. Egipto, India, China, Japón, Filipinas.

Nelumbo nucifera Gaertn. var. *rosea*, Loto rosa. China, Japón.

Nepenthaceae

Nepenthes L. ‘Bloody Mary’, Origen hortícola.

Nepenthes L. ‘Miranda’, Origen hortícola.

Nepenthes L. ‘Alata’ Blanco, tropical.

Nyctaginaceae

Bougainvillea glabra Choisy, Brasil.

Bougainvillea spectabilis Willd., Baganvilla. Brasil.

Mirabilis jalapa L., Don Diego de noche, Don Pedro. América Tropical.

Nymphaeaceae

Euryale ferox Salisb., Nenufar gigante. De india a Japón.

Nuphar lutea (L.) Sm., Europa, N África y N Asia.

Nymphaea Dreer ‘James Brydon’, Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea Lat.-Marl. ‘Attraction’, Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea Lat.-Marl. ‘Madama Wilfron Gonner’, Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea Perry D. Slocum ‘King of Blues’, Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea Perry D. Slocum ‘Yellow Sensation’, Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea sp. L. ‘Mayla’, Origen hortícola.

Nymphaea sp. L. ‘Tanzanite’, *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea x marliacea Lat.-Marl. ‘Albida’, Nenúfar. Origen hortícola.

Victoria cruziana A.D. Orb., Victoria. Argentina, Brasil, Paraguay

Oleaceae

Chrysojasminum humile (L.) Banfi = *Jasminum humile* L., *Oleaceae*. Jazmín italiano. De Afganistán a SO China.

Forsythia x intermedia Zabel, Campanita china. Origen hortícola.

Fraxinus americana L., Fresno. De Florida a Tejas (E EE. UU.).

Fraxinus angustifolia Vahl = *F. rotundifolia* Mill., Fresno. S Europa, So Asia.

Fraxinus excelsior L., Europa, Asia menor.

Fraxinus griffithii C. B. Clarke = *F. formosana* Hayata, De China y Birmania a Filipinas, Archipiélago malayo.

Jasminum beesianum Forrest & Diels, Jazmín rosa. Asia.

Jasminum officinale L., Jazmín común, Jazmin real. Himalaya, SO China.

Jasminum polyanthum Franch., Jazmín de invierno, Jazmín de china. Yunnan (SO China).

Jasminum sambac (L.) Aiton, Jazmín de Arabia. S Asia.

Jasminum simplicifolium G. Forst., Jazmín mandarino. Australia, Islas del Pacífico.

Jasminun multipartitum Hochst, Sudáfrica.

Ligustrum japonicum Thunb. 'Variegatum', Aligustre matizado. rigen hortícola.

Ligustrum japonicum Thunb., Aligustre. Hong Kong (China), Japón, Corea.

Ligustrum ovalifolium Hassk., Japón.

Olea europaea L. subsp ***guanchica*** P.Vargas et al. = *O. cerasiformis* Rivas Mart. & del Arco, Acebuche. Islas Canarias (España), Madeira (Portugal).

Olea europaea L. subsp. ***cuspidata*** (Wall. & G.Don) Cif., De África a India.

Olea europaea L. var. ***sylvestris*** (Mill.) Rouy ex hegi, Acebuche. Región mediterránea.

Olea europaea L., Olivo. Región mediterránea.

Olea exasperata Jacq., Provincia del cabo (Sudáfrica).

Olea paniculata R. Br., E Australia, SE Asia

Phillyrea angustifolia L., Labiérnago, Ladierna. Región mediterránea occidental.

Phillyrea latifolia L., Labiernago negro. Región mediterránea.

Syringa oblata Lindl., Lilo temprano. China, Corea.

Oleandraceae

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott, Tropical, Subtropical.

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl, Pantropical.

Nephrolepis exaltata (L.) Schott, Helecho. América Tropical, África, Polinesia.

Onagraceae

Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch
= *Gaura lindheimeri* Engelm. & A. Gray., México.

Orchidaceae

Cattleya amethystoglossa Linden & Rchb. f. ex R. Warner, Brasil.

Cattleya aurantiaca (Bateman ex Lindl.) P.N.Don, México. C
América.

Cattleya fidelensis (Pabst) Van der Berg = *Laelia fidelensis* Pabst,
Río de Janeiro (Brasil).

Cattleya maxima Lindl., Colombia, Ecuador, Perú.

Epidendrum radicans Pav. ex Lindl., C América, N Sudamérica, O
India.

Epidendrum sp. L., América tropical.

Ophrys fusca Link., Abejera. Región mediterránea occidental.

Paphiopedium sp. Pfitzer, SE Asia Tropical.

Phalaenopsis sp. Blume,

Vanda Jones ex R. Br. 'Blue magic', Origen hortícola.

Vanda Jones ex R. Br. 'Cerise Purple', Origen hortícola.

Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews, México.

Vanilla sp. Mill., Regiones tropicales y subtropicales

Orobanchaceae

Orobanche gracilis Sm., Jopo. S, C, E Europa.

Oxalidaceae

Averrhoa carambola L. 'B-10', Carambola B-10. Origen hortícola.

Averrhoa carambola L. 'Fwang Tung', Carambola Fwang Tung.
Origen hortícola.

Averrhoa carambola L., Carambola. Malasia.

Oxalis corniculata L., S Europa.

Oxalis debilis Kunth var. *corymbosa* (DC.) Lourteig = *Oxalis corymbosa* DC., S América.

Oxalis pes-caprae L., Región mediterránea, O Europa.

Pandanaceae

Pandanus utilis Bory, Madagascar.

Papaveraceae

Fumaria officinalis L., Europa, de Región mediterránea a Irak.

Fumaria parviflora Lam., S, C Europa.

Papaver dubium L., Europa, Asia, N África, Macaronesia.

Papaver hybridum L., Europa, SO Asia, N África, Macaronesia.

Papaver rhoeas L., Europa, Asia, N África, Macaronesia.

Passifloraceae

Passiflora caerulea L., Pasionaria. De Brasil a Argentina.

Paulowniaceae

Paulownia tomentosa Steud., Paulonia. China.

Phyllanthaceae

Breynia disticha J.R. Forst. & G. Forst., Polinesia.

Phormiaceae

Phormium tenax J.R. Forst & G. Forst, Formio, Lino de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda'

Phormium tenax J. R. Forst. & G. Forst. 'Nana', Formio. Origen hortícola.

Phormium tenax J.R. Forst & G. Forst 'Jack spratt', Australia.

Pinaceae

Abies nordmanniana (Steven) Spach, Abeto del Cáucaso. Cáucaso, N Asia Menor.

Abies pinsapo Boiss. = *A. hispanica* Chambray, Abeto español, Pinsapo. España, N África.

Cedrus deodara (Roxb ex D. Don) G. Don = *C. Indica* Chambray, Cedro del Himalaya. Himalaya.

Cedrus libani A. Rich. = *C. libanotica* Link, Cedro del Líbano. Asia Menor.

Picea pungens Engelm. 'Glauca Globosa' Origen hortícola.

Pinus canariensis C.Sm. ex DC., Pino canario. Islas Canarias occidentales (España).

Pinus halepensis Mill., Pino carrasco, Pino de Alepo. Región mediterránea.

Pinus mugo subsp. *media* (Haenke) A.E.Murray, SO Europa Central, SE Europa.

Pinus mugo Turra = *Pinus muga* Turra, Pino enano. Origen hortícola.

Pinus pinea L. = *P. maderensis* Ten., Pino piñonero. S Europa, O Asia.

Piperaceae

Piper auritum Kunth, Hoja Santa. C América.

Pittosporaceae

Hymenosporum flavum F.Muell., Plumaria australiana. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Pittosporum bicolor Hook., Pitosporo. E Australia.

Pittosporum tenuifolium Banks & Sol. ex Gaertn., Nueva Zelanda.

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton ‘Nana’, Azahar de China. Origen hortícola.

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, Pitosporo, Azahar de China. China, Japón, Corea.

Pittosporum undulatum Vent., Pitosporo. E Australia.

Plantaginaceae

Gambelia speciosa Nutt. = *Galvezia speciosa* (Nutt.) A. Gray, Boca de dragón. California (EE. UU.).

Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham. = *R. juncea* Zucc., Lagrimas de amor, Planta del coral. México.

Plantaginaceae

Plantago afra L., S Europa.

Plantago albicans L., Región mediterránea.

Plantago coronopus L., Europa, Macaronesia, SO Asia, N África.

Plantago lagopus L., S Europa.

Platanaceae

Platanus orientalis L. var. *acerifolia* Aiton = *P. acerifolia*
(Dryand.) Willd., Plátano de sombra. Mediterráneo oriental.

Plumbaginaceae

Armeria hirta Willd., Región mediterránea.

Armeria maritima (Mill.) Willd., Armeria, clavelina de mar. Zonas
costeras de Europa.

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss., Salado. Región
mediterránea.

Limonium malacitanum B. Díez, Litoral Andaluz (Málaga y
Granada. (S España).

Plumbago auriculata Lam. = *P. capensis* Thunb., Jazmín azul,
Celestina. S África.

Poaceae

Aegilops geniculata Roth, S Europa.

Ammophila arenaria (L.) Link subsp. *arundinacea* H. Lindb. f.,
Costas Mediterráneas y atlántica (desde Francia a Marruecos).

Aristida adscensionis L., EE. UU.

Arundo donax L., Cañavera, Región mediterránea.

Avena sterilis L., S Europa.

Bambusa textilis McClure, S China.

Bambusa tuldoidea Munro = *B. ventricosa* McClure, China.

Bambusa ventricosa McClure, China.

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl., Bambú común. Tropical.

Briza maxima L., S Europa.

Bromus rigidus Roth = *B. matritensis* Cav., Región mediterránea.

Bromus rubens L., SO Europa, N África, SO Asia, Macaronesia.

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. = *Desmazeria rigida* (L.)
Tutin, S, O Europa.

Chasmanthium latifolia (Michx.) H.O. Yates, C, E EE. UU., NE
México.

Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty, Vetiver. India.

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. =
Gynerium argenteum Ness. Plumerio. S América.

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, Lemongrass. Ceilan, Malasia.

Cymbopogon nardus (L.) Rendle, Citronela. Ceilan, Malabar.

Cynodon dactylon (L.) Pers., Hierba de las Bermudas. Región
templada hemisferio sur.

Dactylis glomerata L., Caracolillo. Europa.

Hordeum murinum L. subsp *leporinum* (Link.) Arcang. = *H.*
leporinum Link., Región mediterránea.

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf = *H. sinaica* (Delile) G. López,
Cerrillo. Región mediterránea, Portugal.

Indocalamus tessellatus (Munro) Keng f. = *Sasa tessellata*
(Munro) Makino & Shibata, China.

Lagurus ovatus L., O Europa, Región mediterránea, Macaronesia.

Lamarckia aurea (L.) Moench, Región mediterránea, Portugal.

Lolium rigidum Gaudin, Euroasia.



Muhlenbergia capillaris (Lam.) Trin., SE EE. UU.

Phalaris minor Retz., Región mediterránea, O Asia.

Phyllosasa tranquillans (Koidz.) Demoly ‘Shiroshima’ =
Hibanobambusa tranquillans (Koidz.) Maruy. & H.Okamura,
Origen hortícola.

Phyllostachis edulis (Carrière) J.Houz., Bambú Moso. China.

Phyllostachys aurea (Andrè) Rivière & C. Rivière, Bambú caña de
pescar. SE China.

Phyllostachys aureosulcata McClure, Bambú acanalado amarillo.
NE China.

Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc., Bambú. China.

Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro, Bambú negro. E
China.

Phyllostachys sulphurea (Carrière) Rivière & C.Rivière = *P.*
viridis (R.A.Young) McClure, China.

Piptatherum miliaceum (L.) Coss., Región mediterránea,
Macaronesia, N África, SO Asia.

Pleioblastus argenteostriatus (Regel) Nakai = *Arundinaria pumila*
Mitford, Japón.

Pleioblastus fortunei (Van Houtte) Nakai = *Pleioblastus variegatus*
(Siebold ex Miq.) Makino, Japón.

Pleioblastus gramineus (Bean) Nakai, Nueva Zelanda.

Pleioblastus linearis (Hack.) Nakai, S. Japón.

Poa annua L., Europa.

Poa infirma Kunth, Inglaterra, Región mediterránea, Irano-
Turanica, Macaronesia.

Polypogon monspeliensis (L.) Desf., Europa.



Pseudosasa disticha (Mitford) Nakai = *Pleioblastus distichus* (Mitford) Nakai, Japón.

Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai = *Arundinaria japonica* Siebold & Zucc. ex Steud., Bambú flecha. Japón, Corea.

Rostraria cristata (L.) Tzvelev, Región mediterránea.

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L. var. 70/3370, Caña de azúcar. Origen hortícola.

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L. var. 71/6180, Caña de azúcar. Origen hortícola

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L. var. 71/799, Caña de azúcar. Origen hortícola

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L. var. 78/1233, Caña de azúcar. Origen hortícola

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L. var. CO 11-48, Caña de azúcar. Origen hortícola

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L., Caña de azúcar. Origen hortícola.

Sasa veitchii (Carrière) Rehder, Japón.

Semiarundinaria fastuosa (Mitford) Makino = *Bambusa fastuosa* Lat.-Marl. ex Mitford, Japón.

Shibataea kumasasa Makino, S Japón.

Stipa bromoides (L.) DRaörf., N África.

Podocarpaceae

Afrocarpus gracilior (Pilg.) C.N.Page, Madagascar.

Podocarpus neriifolius D. Don = *P. discolor* Blume, Podocarpo. De Himalaya a China, La Unión de Myanmar, Laos, Malasia.

Polygalaceae

Polygala myrtifolia L., Poligala. E del Cabo, Natal (Sudáfrica).

Polygala rupestris Pourr., Región mediterránea.

Polygonaceae

Emex spinosa (L.) Compd., Región mediterránea, Macaronesia.

Muehlenbeckia complexa Meisn., Nueva Zelanda.

Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross = *Polygonum capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don , Himalaya, E Asia.

Phlebodium sp. (R.Br.) J.Sm. Regiones tropicales y subtropicales de América.

Polygonum aviculare L., Euroasia.

Rumex aculeatus subsp. *induratus* (Boiss & Reuter) Maire & Weiller in Mare, Acedera redonda. C, S Península Ibérica, NO África.

Rumex bucephalophorus L., Región mediterránea, SO Asia, Macaronesia.

Rumex crispus L., Península Ibérica, Baleares.

Polypodiaceae

Lecanopteris celebica Hennipman, Célebes (Indonesia).

Lecanopteris pumila Blume, Indonesia, Malasia, Islas Filipinas.

Lecanopteris pumila x celebica (Baker) Jessop, Origen hortícola

Microsorium musifolium Copel., Helecho cocodrilo. Malasia, Indonesia, Filipinas, Nueva guinea, Polinesia.

Myrmecophila sinuosa (Hook.) T. Nakai ex H. Itô, Malasia a Isla Salomón .

Myrmecopteris lomarioides (Kunze ex Mett.) Pic. Serm., Célebes (Indonesia).

Phlebodium aureum (L.) J. Sm., C, S América, O India.

Phymatosorus diversifolius (Willd.) Pic. Serm., Australia, Nueva Zelanda.

Phymatosorus scolopendria (Burm. f.) Pic. Serm., Tropical.

Platyserium stemaria (P. Beauv.) Desv., África tropical, Madagascar.

Pontederiaceae

Pontederia cordata L., De EE. UU. a Caribe.

Portulacaceae

Portulaca oleracea L., Verdolaga común. África, Asia, Europa, S América.

Potamogetonaceae

Potamogeton foliosus Raf., EEUU, Caribe, E Canadá.

Primulaceae

Anagallis arvensis L., N, C, S Europa, W Asia, N África.

Cyclamen persicum Mill., SE Europa.

Proteaceae

Grevillea lanigera A. Cunn., Victoria, Nueva Gales del sur (Australia).

Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br., Arbol del fuego, Roble australiano, Zosle plateado australiano. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Hakea salicifolia (Vent.) B.L. Burt, Australia.

Macadamia ternifolia F. Muell., Nuez de Macadamia. Queensland (Australia).

Stenocarpus sinuatus (A. Cunn.) Endl., Australia.

Pteridaceae

Pteris cretica L. ‘Albolineata’, Origen hortícola.

Pteris cretica L. ‘Parkeri’, Origen hortícola.

Pteris cretica L. ‘Wimsettii’, Origen hortícola.

Pteris cretica L., Trópical y Subtropical.

Pteris sp., L.

Pteris vittata L., S África, Madagascar, Asia, Malasia, Nueva Guinea, Australia. ’

Ranunculaceae

Aquilegia vulgaris L., Aguiluña. Europa, Asia.

Clematis cirrhosa L., Clemátide. Región mediterránea.

Clematis flammula L., Vidriera, gata rabiosa. Euroasia.

Clematis vitalba L., Clemátide. Europa.

Resedaceae

Reseda alba L., Región mediterránea.

Reseda lutea L., Europa, N África, SO Asia, Macaronesia

Restionaceae

Elegia tectorum (L.f.) Moline & H.P.Linder, Ciudad del Cabo
(Sudáfrica).

Rhamnaceae

Rhamnus alaternus L., Aladierno, Sanguino. Región mediterránea.

Rhamnus lycioides L. subsp. ***oleoides*** (L.) Jahand. & Maire,
Región mediterránea.

Rhamnus lycioides L., Espino negro. Región mediterránea,
Portugal.

Ziziphus lotus (L.) Lam., Región mediterránea.

Rosaceae

Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai = *C. lagenaria* (Loisel.)
Koidz., China, La Unión de Myanmar.

Cotoneaster coriaceus Franch. = *C. lacteus* W.W.Sm., Cotoneaster.
Yunnan (China).

Cotoneaster horizontalis Decne., Cotoneaster. O China.

Crataegus azarolus L., Región mediterránea, Oriente próximo.

Crataegus monogyna Jacq., Majuelo, Espino albar. O, C Europa,
Caucaso, Anatolia, Oriente Próximo, NO África.

Cydonia oblonga Mill. ‘Coinos’, Membrillos coínos. Origen
hortícola.

Cydonia oblonga Mill., Membrillero. SO y C Asia.

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Níspero. Japón, China.

Geum magellanicum Comm. ex Pers. = *G. chilense* auct., Hierba del clavo. Chile.

Malus domestica L. ‘Sevillano’, Origen hortícola.

Malus domestica L., var. ***coino***, Origen hortícola.

Malus domestica L., var. ***ronda***, Origen hortícola.

Mespilus germanica L., Níspero de invierno. Europa Asia Menor.

Photinia x fraseri Dress, ‘Red Robin’, Origen hortícola.

Potentilla sp. L., Hemisferio norte.

Prunus cerasifera Ehrh. ‘Nigra’, Ciruelo rojo. SO Asia, Cáucaso.

Prunus domestica L. ‘Abrehueso’, Ciruela abrehueso. Origen hortícola.

Prunus domestica L. ‘Safranera’, Ciruela safranera. Origen hortícola.

Prunus domestica L., Ciruelo púrpura. SE Europa, SO Asia.

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb. = *P. amygdalus* Batsch = *P. communis* (L.) Arcangeli, Almendro. Balcanes, SO Asia, N África.

Prunus persica (L.) Batsch Stark ‘Red Gold’, Nectarina Stark Red Gold. Origen hortícola.

Prunus spinosa L., Endrino. Europa Central y Meridional.

Pyracantha coccinea M. Roem., Espino de fuego. SE Europa.

Pyrus communis L. ‘Franco’, Peral. Origen hortícola.

Pyrus communis L., Peral. Caucaso, E Europa.

Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. ‘Springtime’, Origen hortícola.

Rhaphiolepis indica Schott ‘Springtime’, Origen hortícola.

Rhaphiolepis x delacourii André, Origen hortícola.

Rosa banksiae R.Br., Rosal de Banks. O y C China.

Rosa canina L., Europa, NE África y Asia occidental.

Rosa sempervirens L., Mosqueta. S Europa, NO África, Turquía.

***Rosa* sp.** L., ‘Pitimini’, Origen hortícola.

Rubus ulmifolius Schott, Zarzamora. Europa, NO África, Macaronesia.

Sorbus domestica L., Serbal común. C, S Europa, NW África, Chipre, Anatolia, Cáucaso.

Spiraea cantoniensis Lour. = *S. reeversiana* Lindl., Espírea, Escoba. China, Japón.

Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, *Rosaceae*. China, Japón.

Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel, Origen hortícola.

Rubiaceae

Asperula hirsuta Desf., S Península Ibérica, NO África.

Coffea arabica L., África tropical.

Coprosma repens A. Rich. ‘Marple Queen’, Origen hortícola.

Coprosma repens A. Rich., Nueva Zelanda.

Crucianella maritima L., Región mediterránea.

Galium aparine L., Euroasia, Sudamérica.

Galium tricornutum Dandy, S, O, C Europa.

Galium viridiflorum Boiss & Reut., S de España: Serranía de Ronda, Sierra Bermeja, Sierra Tejeda y valle del río Guadalfeo.

Myrmecodia beccarii Hook.f., Australia.

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. var. ***kikuyu***. E África.

Rogiera amoena Planch. = *Rondeletia amoena* (Planch) Hemsl., México, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Rondeletia odorata Jacq. = *R. speciosa* Lodd., Cuba, Panamá.

Rubia peregrina L., S, O Europa.

Sherardia arvensis L., Europa.

Valantia hispida L., Región mediterránea, S Portugal.

Rutaceae

Calodendrum capense Thunb., Castaño del Cabo. S África.

Casimiroa edulis La Llave, México, C América.

Casimiroa tetrameria Millsp., Matasano. C América.

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Lima. Indonesia y Malasia.

Citrus australasica F.Muell, Lima dedo, caviar cítrico. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Citrus hystrix DC., Combava. SE Asia.

Citrus japonica Thunb. = *Fortunella margarita* (Lour.) Swingle, Kumquat. SE China.

Citrus limon (L.) Osbeck, Limonero. SE Asia.

Citrus maxima (Burm.) Merr. = *C. grandis* (L.) Osbeck, Pomelo. Malasia, Polinesia.

Citrus medica L. = *C. medica* var. *digitata* Risso ex Guillaumin. cidro, citrón. SE Asia

Citrus medica L. var. *sarcodactylis* (Siebold ex Hoola van Nooten) Swingle, Mano de Buda. NE India, China.

Citrus reticulata Blanco, *Rutaceae*. Mandarino. Filipinas, SE Asia.

Citrus sinensis (L.) Osbeck, Naranja dulce. China.

Citrus trifoliata L. = *Poncirus trifoliata* (L.) Raf., Naranjo espinoso. N China.

Citrus x aurantium L., Naranjo amargo. Origen hortícola.

Citrus x bergamia Risso & Poit., Bergamota. Origen hortícola.

Diosma hirsuta L. = *D. ericoide* L., Sudáfrica.

Murraya paniculata Kaneh. = *M. exotica* (L.) Millsp., Jazmín de la India. SE Asia, Malasia.

Ruta graveolens L., Ruda. S Europa.

Salicaceae

Populus alba L., Álamo blanco. C, S Europa, O Asia, N África.

Populus nigra L., Chopo, Álamo negro. Europa oriental, O Asia.

Salix atrocinerea Brot., Europa occidental, N África.

Salix pedicellata Desf., Sauce. Región mediterránea.

Salviniaceae

Salvinia natans (L.) All., Euroasia, N África.

Santalaceae

Osyris alba L., Retama loca, Guardalobo. S Europa, N África, SO Asia.

Sapindaceae

Acer negundo L. f. *variegatum*, América del Norte.

Acer negundo L., América del Norte y América Central.

Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk, Cupania de hojas de anacardo. E, N Australia.

Dimocarpus longan Lour. = *Euphoria longan* (Lour.) Steud., Longan. India, Sri Lanka.

Dodonaea viscosa Jacq. 'Purpurea', Origen hortícola.

Koelreuteria bipinnata Franch., Árbol de la lluvia chino. China.

Koelreuteria elegans (Seem.) A. C. Sm., Árbol de la lluvia de oro. Taiwan, Fiji.

Koelreuteria paniculata Laxm. = *K. apiculata* Rehder & E.H. Wilson, Jabonero de China, Árbol de los farolillos. China.

Litchi chinensis Sonn. 'B-10', Lichi B-10. Origen hortícola.

Litchi chinensis Sonn. 'Kawai-Mai-Pink', Litchi Kawai-Mai-Pink. Origen hortícola.

Litchi chinensis Sonn., Lichi. China.

Ungnadia speciosa Endl., Castaño de México. S EE. UU. , México.

Sapotaceae

Argania spinosa Skeels, Argán. Marruecos, Sahara.

Manilkara zapota (L.) P. Royen, Chicozapote, Sapodilla. México, C América.

Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 'Canistel Bruce', Canistel Bruce. Origen hortícola.

Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 'Canistel Fes', Canistel Fes. Origen hortícola.

Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze 'La Molina', Lucumo La Molina. Origen hortícola.

Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze, Lucumo. Perú, Bolivia.

Sarraceniaceae

Sarracenia alata (Alph. Wood.) Alph. Wood., S Alabama, E texas (EE. UU.).

Sarracenia minor subsp. *minor* Walter, SE EE. UU.

Sarracenia minor Walter, SE EE. UU.

Sarracenia purpurea L., N América.

Saururaceae

Houttuynia cordata Thunb., China, Japón.

Saxifragaceae

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch = *B. cordifolia* (Haw.) Sternb., Siberia, Mongolia.

Saxifraga stolonifera Curtis, China, Japón.

Sciadopityaceae

Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold & Zucc., Pino Parasol. Japón.

Scrophulariaceae

Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze, Chile.

Misopates orontium (L.) Raf., S Europa, N África.

Myoporum laetum G.Forst, Mioporo. Nueva Zelanda.

Scrophularia peregrina L., Región mediterránea, SO Asia.

Simaroubaceae

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle = *A. glandulosa* Desf., China.

Smilacaceae

Smilax aspera L., S Europa, O Asia, Macaronesia, N África.

Solanaceae

Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J. Presl, SE Brasil.

Brugmansia x candida Pers. = *Datura x candida* (Pers.) Voigt, Origen hortícola.

Brugmansia x insignis (Barb.Rodr.) Lockwood ex R.E.Schult, Origen hortícola.

Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. = *B. calycina* Benth., Brasil.

Cestrum aurantiacum Lindl, Galán anaranjado. C América.

Cestrum elegans (Brongn. ex Neumann) Schltdl. = *C. purpureum* (Lindl.) Standl, México.

Cestrum nocturnum L, Sudamérica.

Cestrum x cultum Francey, Galán rosado. Origen hortícola.

Lycianthes rantonnetii (Carrière) Bitter, = *Solanum rantonnetii* Carrière, Argentina, Paraguay.

Lycium barbarum L., Goji. China.

Lycium chilense Bertero, Chile.

Lycium shawii Roem. & Schult., S Europa, N África.

Physalis peruviana L., Uchuva. América del Sur.

Solandra maxima (Moc. & Sessé ex Dunal) P.S.Green = *S. hartwegii* C.F. Ball, Trompetas. México.

Solanum americanum Mill. = *S. nigrum* L, N Europa.

Solanum jasminoides J. Paxton, Solano de flor blanca. Brasil.

Streptosolen jamesonii (Benth) Miers, Estreptosolen. Andes colombianos, Ecuador, Perú.

Whitania frutescens (L.) Pauquy, Oroval. Región mediterránea.

Strelitziaceae

Ravenala madagascariensis Sonn., Árbol del viajero, palma del viajero. Madagascar.

Strelitzia juncea (Ker Gawl.) Link, Sudáfrica.

Strelitzia nicolai Regel & Körn., Ave gigante del paraíso. Regiones costera Del S De Natal y NE Provincia Del Cabo (Sudáfrica).

Strelitzia reginae Banks = *S. parvifolia* W.T. Aiton, Ave del paraíso. S África.

Stylidiaceae

Stylidium adnatum R. Br., Australia.

Tamaricaceae

Tamarix canariensis Willd., Taray de canarias. Mediterráneo occidental e Islas Canarias.

Tamarix gallica L., Taray, Taraje Región mediterránea.

Tamarix parviflora DC., Taraje. NE región mediterránea.

Thelypteridaceae

Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy, Tropical, subtropical.

Thymelaeaceae

Thymelaea hirsuta (L.) Endl., Bolaga, Matapollo. Región mediterránea.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L, Capuchina Perú.

Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav, Andes centrales.

Typhaceae

Typha angustifolia L., Totorá. Hemisferio norte

Ulmaceae

Ulmus minor Mill. = *U. angustifolia* (Weston) Weston, Olmo. Europa, NO Asia, N África.

Urticaceae

Parietaria judaica L. = *P. diffusa* Merlet & W.D.J.Koch, O, S Europa.

Pilea depressa (Sw.) Blume, SO EE. UU.

Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy, España, Francia, Italia.

Urtica dioica L., Euroasia.

Viburnaceae

Sabucus nigra L., Sauco negro. Europa, NW África, SO Asia.

Viburnum odoratissimum Ker Gawl., Viburnum dulce. Asia.

Viburnum suspensum Lindl., Viburno de las islas Ryukyu (Japón).
E Asia.

Viburnum tinus L., Durillo. Región mediterránea.

Verbenaceae

Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) Tronc., Cedrón de monte. De
México a Argentina.

Citharexylum spinosum L. = *C. quadrangulare* Jacq., Antillas, N
América del Sur.

Duranta erecta L. ‘Geisha girl’, Duranta. Origen hortícola.

Duranta erecta L. = *D. repens* L., Duranta. Brasil.

Glandularia canadensis (L.) Small = *Verbena canadensis* (L.)
Britton, Verbena rosa. América del Norte.

Lantana camara L. ‘Flava’, Origen hortícola.

Lantana camara L. ‘Nana’, Origen hortícola.

Lantana camara L. ‘Victoria’, Origen hortícola.

Lantana camara L., Banderita española. América Tropical.

Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. = *L. sellowiana* Link et
Otto = *Lippia montevidensis* Spreng., Lantana rastrera. S América.

Petrea volubilis L., América tropical.

Phyla nodiflora (L.) Greene var. ***rosea*** (D. Don) Moldenke =
Lippia repens Spreng., Tropical y subtropical.

Violaceae

Viola hederacea Labill., Violeta australiana. Australia.

Viola odorata L., Violeta. Asia occidental, Región mediterránea, Macaronesia.

Viola x wittrockiana Gams ex Nauenb. & Buttler, Violaceae. Pensamiento. Origen hortícola.

Vitaceae

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, Antillas, Panamá, Colombia y Venezuela.

Cyphostemma juttae (Dinter & Gilg) Desc., Parra del desierto Namibia.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. = *Ampelopsis quinquefolia* Michx. = *Vitis quinquefolia* (L.) Lam., Viña virgen. NE EE. UU. a México.

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., Parra virgen. De China a Japón.

Tetrastigma voinierianum (Baltet) Gagnep., SE Asia.

Vites herlandieri x Vitis rupestris F. Richter 110R, Origen hortícola.

Vitis vinifera L., ‘Airén’. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., ‘Alicante’. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., ‘Beba’. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., ‘Ciutí’. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., ‘Cojonata’. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., ‘Doradilla’. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., ‘Jaén blanco’. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Jaén tinto'. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Mollar negro'. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Moscatel fino'. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Pedro Ximenez'. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Perruna blanca'. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Perruna negra'. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Perruno'. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Piñuela'. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Plateado'. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Rome blanco'. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Rome tinto'. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Santa Paula'. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Uva del rey'. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Vijiriega'. Vid común. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., Vid común. Región mediterránea.

Zamiaceae

Dioon califanoi De Luca & Sabato, Oaxaca (México).

Dioon edule Lindl., México.

Dioon mejiae Staudl. & L. O. Willians, Honduras.

Dioon rzedowskii De Luca, A. Moretti, Sabato & Vázquez-Torres, Oaxaca (México).

Dioon spinulosum Dyer, México.

Encephalartos ferox G.Bertol., Cica de Zululand. SE África.

Encephalartos laurentianus De Wild., Encefalarto. Sudáfrica.

Encephalartos sp. Lehm., África.

Encephalartos villosus Lem., Cica espina, Encefalarto. S África.

Macrozamia communis L. A. S. Johnson, E Nueva Gales del Sur (Australia).

Macrozamia johnsonii D.L. Jones & K. D. Hill, Nueva Gales del Sur (Australia).

Macrozamia moorei F. Muell., Queensland (Australia).

Zamia furfuracea L. f. ex Aiton, Veracruz (México).

Zingiberaceae

Alpinia caerulea (R.Br.) Benth., Origen hortícola.

Alpinia galanga (L.) Willd., Galanga mayor. S Asia, Indonesia.

Alpinia malaccensis (Burm. f.) Roscoe, Indonesia, Malasia.

Alpinia nutans (L.) Roscoe, SE Asia.

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. = *A. speciosa* (Wendl.) Schum., Asia Tropical y subtropical.

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 'Variegata', Origen hortícola.

Hedychium coronarium J. Koenig, Asia Tropical.

Hedychium flavescens Carey ex Roscoe, China, India, Nepal.

Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl., Jengibre blanco. Himalaya.

Hedychium horsfieldii R.Br. ex Wall., Isla de Java (Indonesia).